



2016 年 中華民國 國家溫室氣體排放清冊報告



前言

行政院環境保護署依循聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）及京都議定書（Kyoto Protocol）相關規範，呼應各界對於瞭解我國溫室氣體排放及移除統計情形與變化趨勢之殷切期望，業於 103 年（西元 2014 年）起彙編「中華民國國家溫室氣體清冊報告」，主動對外揭露我國自西元 1990 起之國家溫室氣體排放及移除趨勢，復於 105 年（西元 2016 年）更新彙編「2016 年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」（以下簡稱本報告）。

根據西元 2011 年在南非德班召開 UNFCCC 第 17 次締約方大會及京都議定書第 7 次締約方會議（COP17/CMP7），通過第 24/CP.17 號決議文，要求已開發國家遵循 2006 年版聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）國家溫室氣體排放清冊指南的統計方法（2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories，以下簡稱 2006 IPCC 指南），於 2015 年起，按照新統計方法遞交年度國家溫室氣體排放清冊及其報告（Annual National Inventory Report）；本報告同步依循 2006 年 IPCC 指南進行統計與彙編，積極展現我國積極遵約之努力與決心。

隨著氣候變遷及溫室氣體排放議題備受國內各界重視，對於國家溫室氣體排放清冊的期望日切；104 年（西元 2015 年）召開「第四次全國能源會議」環境低碳永續核心議題的結論之一，即要求「依循國際規範及跨部會審議運作機制，辦理我國溫室氣體排放清冊統計作業」。104 年（西元 2015 年）7 月 1 日公布施行「溫室氣體減量及管理法」（以下簡稱溫管法），其中第 13 條規範中央主管機關應定期統計全國排放量，建立國家溫室氣體排放清冊。

行政院環境保護署擔任編撰彙整國家溫室氣體排放清冊之中央主管機關，於 101 年（西元 2012 年）10 月即籌組「國家溫室氣體排放清冊審議會」（以下簡稱審議會），邀集來自專家學者、產業及相關部會等 18 位代表擔任審議委員；103 年第 2 屆審議會由審議委員推舉行政院環境保護署簡慧貞參事兼執行秘書及成功大學資源工程系陳家榮教授擔任共同召集人。部會代表包括：經

濟部能源局陳炯曉科長、經濟部工業局潘建成科長、交通部運輸研究所朱珮芸副組長、行政院農業委員會新竹林區管理處黃群修副處長、行政院農業委員會畜產試驗所程梅萍組長、行政院環境保護署溫室氣體減量管理辦公室吳奕霖組長，專家學者代表包括：淡江大學經濟系廖惠珠教授、臺灣科技大學化學工程系顧洋教授、臺北大學自然資源與環境管理所張四立教授、臺北科技大學環境工程與管理研究所張添晉教授、臺灣大學森林環境資源學系邱祈榮副教授、中央研究院環境變遷研究中心龍世俊研究員、台達電子文教基金會張楊乾副執行長，產業代表包括：中華民國全國工業總會環境及安全衛生委員會許芳銘副召集人、中華民國企業永續發展協會莫冬立副秘書長、臺灣半導體產業協會呂慶慧顧問。

參與本報告編輯的相關部會包括行政院環境保護署、經濟部、交通部、行政院農業委員會等，相關協助的智庫團隊包括：財團法人工業技術研究院、財團法人臺灣綜合研究院、財團法人臺灣綠色生產力基金會、環興科技股份有限公司。

本報告內容參照京都議定書年度國家清冊報告規範及其架構，總共分成八大章節，其中第一、二章主要說明臺灣溫室氣體排放清冊統計的範圍、概況、及整體溫室氣體排放趨勢之說明，第三至七章主要是按照修訂版 UNFCCC 附件一國家年度清冊報告指南（第 24/CP.19 決議文）之部門分類，分別陳述各部門不同溫室氣體排放源與吸收匯的統計方法、數據、結果、各部門排放趨勢等；其中，因為 IPCC 國家溫室氣體排放清冊指南新舊版統計及分類有差異的關係，在土地利用、土地利用變化及林業章節，仍有部分土地利用類型尚須規劃溫室氣體調查統計。第八章改善規劃主要陳述臺灣溫室氣體排放清冊統計工作尚須持續改善的內容與規劃，俾利未來對國家溫室氣體排放清冊品質做持續性的改善。

未來臺灣將逐年發布國家溫室氣體排放清冊報告，在具備法源依據的基礎上，不斷充實並提升數據品質與完整性。



目錄

前言	1
目錄	3
表目錄	6
圖目錄	12
執行摘要	
ES.1 國家溫室氣體排放清冊背景資訊	ES-1
ES.2 國家排放量與移除量趨勢摘要	ES-1
ES.3 排放源及吸收匯分類之排放估算與趨勢總覽	ES-2
ES.4 其他資訊	ES-12
第一章 簡介	
1.1 國家溫室氣體排放清冊背景資訊	1-1
1.2 清冊準備之組織制度安排	1-1
1.3 清冊準備流程	1-1
1.4 方法與資料來源	1-2
1.5 主要排放源	1-3
1.6 品質保證及品質控制計畫資訊	1-3
1.7 一般不確定性	1-4
1.8 完整性概要評估	1-4
第二章 溫室氣體排放趨勢	
2.1 總溫室氣體排放趨勢的描述與解釋	2-1
2.1.1 溫室氣體排放及移除	2-1
2.1.2 人均二氧化碳排放	2-1
2.1.3 二氧化碳密度	2-3
2.2 各種溫室氣體排放趨勢的描述與解釋	2-4
2.2.1 二氧化碳	2-4
2.2.2 甲烷	2-4
2.2.3 氧化亞氮	2-4
2.2.4 氫氟碳化物	2-4
2.2.5 全氟碳化物	2-10
2.2.6 六氟化硫	2-10
2.2.7 三氟化氮	2-10
2.3 各排放源溫室氣體排放趨勢的描述與解釋	2-10
2.3.1 能源部門	2-10
2.3.2 工業製程及產品使用部門	2-15
2.3.3 農業部門	2-15
2.3.4 土地利用、土地利用變化及林業部門	2-15
2.3.5 廢棄物部門	2-17
第三章 能源部門 (CRF SECTOR 1)	
3.1 部門概述	3-1
3.2 燃料燃燒	3-1
3.2.1 能源產業 (1.A.1)	3-18
3.2.2 製造業與營造業 (1.A.2)	3-19
3.2.3 運輸 (1.A.3)	3-31
3.2.4 其他部門 (服務業、住宅、農林漁牧) (1.A.4)	3-37
3.2.5 其他	3-40

3.2.6 部門方法與參考方法的比較	3-40
3.2.7 國際運輸燃料.....	3-42
3.2.8 燃料的原料與非能源使用.....	3-46
3.3 燃料逸散性排放	3-47
第四章 工業製程及產品使用部門 (CRF SECTOR 2)	
4.1 部門概述	4-1
4.2 礦業 (非金屬製程) (2.A)	4-1
4.2.1 水泥生產 (2.A.1).....	4-3
4.2.2 生石灰 (氧化鈣) 生產 (2.A.2).....	4-7
4.2.3 玻璃生產 (2.A.3).....	4-9
4.2.4 其他使用碳酸鹽製程 (2.A.4).....	4-10
4.2.5 其他 (2.A.5).....	4-14
4.3 化學工業 (2.B)	4-15
4.3.1 氨生產 (2.B.1).....	4-15
4.3.2 硝酸生產 (2.B.2).....	4-15
4.3.3 己二酸生產 (2.B.3).....	4-18
4.3.4 己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產 (2.B.4).....	4-18
4.3.5 電石生產 (2.B.5).....	4-19
4.3.6 二氧化鈦生產 (2.B.6).....	4-21
4.3.7 碳酸鈉 (純鹼 / 蘇打) 生產 (2.B.7).....	4-22
4.3.8 石化及碳黑生產 (2.B.8).....	4-23
4.3.9 含氟化物生產 (2.B.9).....	4-31
4.3.10 其他 (2.B.10).....	4-33
4.4 金屬製程 (2.C)	4-34
4.4.1 鋼鐵生產 (2.C.1).....	4-34
4.4.2 鐵合金生產 (2.C.2).....	4-38
4.4.3 原鋁生產 (2.C.3).....	4-39
4.4.4 鎂生產 (2.C.4).....	4-40
4.4.5 鉛生產 (2.C.5).....	4-41
4.4.6 鋅生產 (2.C.6).....	4-42
4.5 非能源產物燃料溶劑使用 (2.D)	4-44
4.6 電子工業 (2.E)	4-44
4.6.1 積體電路或半導體 (2.E.1).....	4-44
4.6.2 TFT 平面顯示器 (2.E.2).....	4-48
4.7 破壞臭氧層物質之替代品使用 (2.F)	4-49
4.7.1 冷凍及空調 (2.F.1).....	4-50
4.7.2 發泡劑 (2.F.2).....	4-52
4.7.3 滅火藥劑 (2.F.3).....	4-52
4.7.4 氣膠產品 (推進劑及溶劑) (2.F.4).....	4-53
4.7.5 溶劑 (非氣膠) (2.F.5).....	4-53
4.7.6 其他應用 (2.F.6).....	4-53
4.8 其他產品之製造與使用 (2.G)	4-53
4.8.1 電子設備 (2.G.1).....	4-54
4.8.2 電力設備中的六氟化硫及全氟碳化物 (2.G.2).....	4-54
4.8.3 其他產品使用六氟化硫及全氟碳化物 (2.G.3).....	4-55
4.8.4 使用氧化亞氮產品 (2.G.4).....	4-55
4.9 其他 (2.H)	4-55
4.9.1 食品及飲料工業 (2.H.1).....	4-55



第五章 農業部門 (CRF SECTOR 3)

5.1 部門概述	5-1
5.2 畜禽腸胃發酵 (3.A)	5-1
5.3 畜禽糞尿處理 (3.B)	5-6
5.3.1 畜禽糞尿處理甲烷	5-6
5.3.2 畜禽糞尿處理氧化亞氮	5-9
5.4 水稻種植 (3.C)	5-11
5.5 農業土壤 (3.D)	5-15
5.5.1 農業土壤的氧化亞氮直接排放	5-15
5.5.2 農業土壤的氧化亞氮間接排放	5-25
5.5.3 農業土壤的氧化亞氮排放量	5-29
5.6 草原的焚燒 (3.E)	5-30
5.7 農作物殘渣燃燒 (3.F)	5-30
5.8 石灰處理 (3.G)	5-31
5.9 尿素使用 (3.H)	5-32
5.10 其他含碳肥料 (3.I)	5-34
5.11 其他 (3.J)	5-34

第六章 土地利用、土地利用變化及林業部門 (CRF SECTOR 4)

6.1 部門概述	6-1
6.2 森林土地 (4.A)	6-1
6.2.1 林地維持林地 (4.A.1)	6-1
6.2.2 其他土地轉變為森林 (4.A.2)	6-11

第七章 廢棄物部門 (CRF SECTOR 5)

7.1 部門概述	7-1
7.2 固體廢棄物處理 (5.A)	7-3
7.2.1 妥善管理之廢棄物掩埋場 (5.A.1)	7-3
7.2.2 無管理之廢棄物掩埋場 (5.A.2)	7-9
7.2.3 未分類之廢棄物處理廠址 (5.A.3)	7-13
7.3 固體廢棄物之生物處理 (5.B)	7-13
7.4 廢棄物之焚化與露天燃燒 (5.C)	7-17
7.4.1 廢棄物焚化 (5.C.1)	7-17
7.4.2 廢棄物露天燃燒 (5.C.2)	7-21
7.5 廢水處理與放流 (5.D)	7-21
7.5.1 生活污水處理與放流 (5.D.1)	7-22
7.5.2 事業廢水處理與放流 (5.D.2)	7-28
7.6 廢棄物部門溫室氣體排放不確定性分析	7-31

第八章 改善規劃

名詞、縮寫與單位索引

- 附件一、IPCC 第四次評估報告溫暖化潛勢值
- 附件二、2014 年能源平衡表 - OECD 能源統計格式 (熱值單位)
- 附件三、能源部門燃料燃燒二氧化碳排放指標
- 附件四、能源部門燃料燃燒 CO₂ 排放量 (電力消費排放)
- 附件五、廢棄物部門排放清冊活動數據彙整表
- 附件六、廢棄物部門溫室氣體排放清冊統計彙整表

表目錄

表 ES2.1 臺灣 1990 至 2014 年各類溫室氣體排放量和移除量.....	ES-3
表 ES2.2 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放量和移除量.....	ES-4
表 ES2.3 臺灣 1990 至 2014 年甲烷排放量.....	ES-5
表 ES2.4 臺灣 1990 至 2014 年氧化亞氮排放量.....	ES-6
表 ES2.5 臺灣 1993 至 2014 年含氟氣體排放量.....	ES-7
表 ES3.1 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量.....	ES-8
表 ES3.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門溫室氣體排放量.....	ES-9
表 ES3.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量.....	ES-10
表 ES3.4 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量.....	ES-11
表 ES3.5 臺灣 1990 至 2014 年林業部門年移除量變化.....	ES-12
表 ES3.6 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量.....	ES-13
表 1.6.1 臺灣國家溫室氣體排放清冊現行 QA/QC 作法.....	1-4
表 1.8.1 臺灣國家溫室氣體排放清冊完整性概要.....	1-5
表 2.1.1 臺灣 1990 至 2014 年各類溫室氣體排放量和移除量.....	2-2
表 2.2.1 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放量和移除量.....	2-5
表 2.2.2 臺灣 1990 至 2014 年甲烷排放量.....	2-7
表 2.2.3 臺灣 1990 至 2014 年氧化亞氮排放量.....	2-8
表 2.2.4 臺灣 1990 至 2014 年氫氟碳化物生產排放量.....	2-10
表 2.2.5 臺灣 1990 至 2014 年全氟碳化物排放量.....	2-11
表 2.2.6 臺灣 1990 至 2014 年六氟化硫排放量.....	2-12
表 2.2.7 臺灣 1990 至 2014 年三氟化氮排放量.....	2-13
表 2.3.1 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量和移除量.....	2-14
表 2.3.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門溫室氣體排放量.....	2-16
表 2.3.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量.....	2-18
表 2.3.4 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量.....	2-19
表 2.3.5 臺灣 1990 至 2014 年林業部門整體年移除量變化.....	2-20
表 2.3.6 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量.....	2-21
表 3.2.1 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 能源部門.....	3-2
表 3.2.2 2006 IPCC 指南版本燃料燃燒二氧化碳、甲烷與氧化亞氮排放係數.....	3-4
表 3.2.3 一般廢棄物各分類之二氧化碳排放係數.....	3-9
表 3.2.4 能源熱值表.....	3-9
表 3.2.5 一般廢棄物歷年熱值.....	3-10
表 3.2.6 各類能源之溫室氣體溫暖化潛勢.....	3-10
表 3.2.7 臺灣 1990 至 2014 年能源部門二氧化碳排放量.....	3-12
表 3.2.8 臺灣 1990 至 2014 年能源部門甲烷排放量.....	3-14
表 3.2.9 臺灣 1990 至 2014 年能源部門氧化亞氮排放量.....	3-16
表 3.2.10 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 能源產業.....	3-20
表 3.2.11 臺灣 1990 至 2014 年能源產業二氧化碳排放量.....	3-21
表 3.2.12 臺灣 1990 至 2014 年能源產業甲烷排放量.....	3-23
表 3.2.13 臺灣 1990 至 2014 年能源產業氧化亞氮排放量.....	3-25
表 3.2.14 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 製造業與營造業.....	3-26
表 3.2.15 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業二氧化碳排放趨勢.....	3-28
表 3.2.16 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業甲烷排放量.....	3-29
表 3.2.17 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業氧化亞氮排放量.....	3-31
表 3.2.18 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 運輸.....	3-31
表 3.2.19 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門二氧化碳排放量.....	3-33
表 3.2.20 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門甲烷排放量.....	3-35
表 3.2.21 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門氧化亞氮排放量.....	3-36



表目錄

表 3.2.22 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 服務業、住宅、農林漁牧.....	3-37
表 3.2.23 臺灣 1990 至 2014 年服務業、住宅、農林漁牧部門二氧化碳排放量.....	3-38
表 3.2.24 臺灣 1990 至 2014 年服務業、住宅、農林漁牧部門甲烷排放量.....	3-39
表 3.2.25 臺灣 1990 至 2014 年服務業、住宅、農林漁牧部門氧化亞氮排放量.....	3-41
表 3.2.26 燃料燃燒二氧化碳排放量計算結果比較.....	3-41
表 3.2.27 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 國際運輸.....	3-42
表 3.2.28 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料二氧化碳排放量.....	3-43
表 3.2.29 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料甲烷排放量.....	3-44
表 3.2.30 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料氧化亞氮排放量.....	3-45
表 3.2.31 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用二氧化碳扣減量.....	3-47
表 3.2.32 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用甲烷扣減量.....	3-48
表 3.2.33 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用氧化亞氮扣減量.....	3-49
表 4.1.1 工業製程及產品使用部門次分類.....	4-1
表 4.1.2 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量.....	4-4
表 4.2.1 臺灣 1990 至 2014 年礦業（非金屬製程）排放量.....	4-5
表 4.2.2 臺灣 1990 至 2014 年水泥熟料產量.....	4-6
表 4.2.3 臺灣 1990 至 2014 年水泥生產排放量.....	4-6
表 4.2.4 臺灣 1990 至 2014 年生石灰產量.....	4-8
表 4.2.5 臺灣 1990 至 2014 年石灰生產排放量.....	4-8
表 4.2.6 臺灣 1990 至 2014 年平板玻璃產量.....	4-10
表 4.2.7 臺灣 1990 至 2014 年玻璃生產排放量.....	4-10
表 4.2.8 臺灣 1990 至 2014 年純鹼使用量.....	4-11
表 4.2.9 臺灣 1990 至 2014 年純鹼使用排放量.....	4-11
表 4.2.10 臺灣 1990 至 2014 年石灰石與白雲石使用量.....	4-13
表 4.2.11 臺灣 1990 至 2014 年石灰石與白雲石使用排放量.....	4-13
表 4.2.12 臺灣 1990 至 2014 年玻璃纖維製品生產量.....	4-14
表 4.2.13 臺灣 1990 至 2014 年玻璃纖維製品生產排放量.....	4-14
表 4.3.1 臺灣 1990 至 2014 年化學工業排放量.....	4-16
表 4.3.2 臺灣 1990 至 2014 年硝酸產量.....	4-17
表 4.3.3 臺灣 1990 至 2014 年硝酸生產排放量.....	4-17
表 4.3.4 臺灣 1990 至 2014 年己內醯胺生產排放量.....	4-19
表 4.3.5 臺灣 1990 至 2014 年碳化鈣產量.....	4-20
表 4.3.6 臺灣 1990 至 2014 年碳化鈣使用排放量.....	4-20
表 4.3.7 臺灣 1990 至 2014 年二氧化鈦產量.....	4-21
表 4.3.8 臺灣 1990 至 2014 年二氧化鈦生產排放量.....	4-21
表 4.3.9 臺灣 1990 至 2014 年純鹼產量.....	4-22
表 4.3.10 臺灣 1990 至 2014 年純鹼生產排放量.....	4-23
表 4.3.11 臺灣 1990 至 2014 年甲醇產量.....	4-24
表 4.3.12 臺灣 1990 至 2014 年甲醇生產排放量.....	4-24
表 4.3.13 臺灣 1990 至 2014 年乙烯產量.....	4-25
表 4.3.14 臺灣 1990 至 2014 年乙烯生產排放量.....	4-25
表 4.3.15 臺灣 1990 至 2014 年氯乙烯產量.....	4-27
表 4.3.16 臺灣 1990 至 2014 年氯乙烯生產排放量.....	4-27
表 4.3.17 臺灣 1990 至 2014 年環氧乙烷產量.....	4-28
表 4.3.18 臺灣 1990 至 2014 年環氧乙烷生產排放量.....	4-28
表 4.3.19 臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈產量.....	4-29
表 4.3.20 臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈生產排放量.....	4-29
表 4.3.21 臺灣 1990 至 2014 年碳煙產量.....	4-30

表目錄

表 4.3.22 臺灣 1990 至 2014 年碳煙生產排放量	4-31
表 4.3.23 臺灣 1990 至 2014 年 HCFC-22 產量	4-32
表 4.3.24 臺灣 1990 至 2014 年 HCFC-22 副產品 (HFC-23) 排放量	4-32
表 4.3.25 臺灣 1990 至 2014 年苯乙烯產量	4-33
表 4.3.26 臺灣 1990 至 2014 年苯乙烯生產排放量	4-33
表 4.4.1 臺灣 1990 至 2014 年金屬製程排放量	4-35
表 4.4.2 臺灣 1990 至 2000 年高爐鋼胚產量	4-36
表 4.4.3 臺灣 1990 至 2014 年高爐鋼胚生產排放量	4-36
表 4.4.4 臺灣 1990 至 2014 年高爐鋼胚生產排放量不確定性	4-36
表 4.4.5 臺灣 1990 至 2014 年電弧爐鋼胚產量	4-37
表 4.4.6 臺灣 1990 至 2014 年電弧爐鋼胚生產排放量	4-37
表 4.4.7 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金產量	4-39
表 4.4.8 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金生產排放量	4-39
表 4.4.9 臺灣 1990 至 2014 年鎂生產排放量	4-40
表 4.4.10 臺灣 2003 至 2014 年鉛錠產量	4-42
表 4.4.11 臺灣 2003 至 2014 年鉛生產排放量	4-42
表 4.4.12 臺灣 2003 至 2014 年鋅錠產量	4-43
表 4.4.13 臺灣 2003 至 2014 年鋅生產排放量	4-43
表 4.5.1 臺灣 1990 至 2014 年燃料及溶劑使用的非能源產品排放量	4-44
表 4.6.1 臺灣 1998 至 2014 年電子工業排放量	4-45
表 4.6.2 臺灣 2001 至 2014 年積體電路或半導體排放量	4-46
表 4.6.3 臺灣 1999 至 2014 年 TFT 平面顯示器排放量	4-48
表 4.7.1 臺灣 2003 至 2014 年破壞臭氧層物質之替代品使用排放量	4-50
表 4.7.2 臺灣 2003 至 2014 年冷凍空調使用氫氟碳化物使用量	4-51
表 4.7.3 臺灣 2003 至 2014 年冷凍空調使用排放量	4-51
表 4.7.4 臺灣 2003 至 2013 年滅火劑使用排放量	4-52
表 4.8.1 臺灣 2002 至 2014 年其他產品之製造與使用排放量	4-53
表 4.8.2 臺灣 1990 至 2014 年高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放量	4-54
表 4.9.1 臺灣 1990 至 2014 年其他製程排放量	4-56
表 4.9.2 臺灣 1990 至 2014 年啤酒產量	4-56
表 4.9.3 臺灣 1990 至 2014 年啤酒生產排放量	4-57
表 5.1.1 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量	5-2
表 5.2.1 臺灣畜禽腸胃發酵排放甲烷之係數表	5-4
表 5.2.2 國產牧草飼糧對荷蘭乳牛乾物採食量與瘤胃發酵甲烷排放量之影響	5-4
表 5.2.3 臺灣荷蘭乳牛瘤胃發酵甲烷排放量推估	5-4
表 5.2.4 臺灣畜禽腸胃發酵排放甲烷係數引用說明表	5-4
表 5.2.5 臺灣 1990 年至 2014 年畜禽活動數據	5-5
表 5.2.6 臺灣 1990 年至 2014 年畜禽腸胃發酵之甲烷排放量	5-5
表 5.3.1 臺灣畜牧部門糞尿處理排放甲烷之係數表	5-7
表 5.3.2 臺灣畜禽糞尿處理排放甲烷係數引用說明表	5-8
表 5.3.3 臺灣 1990 年至 2014 年畜禽糞尿處理之甲烷排放量	5-8
表 5.3.4 臺灣畜牧部門糞尿處理排放氧化亞氮之係數表	5-9
表 5.3.5 臺灣畜禽糞尿處理排放氧化亞氮係數引用說明表	5-9
表 5.3.6 臺灣 1990 年至 2014 年臺灣畜禽糞尿處理之氧化亞氮排放量	5-10
表 5.4.1 臺灣水稻種植各期作甲烷排放係數	5-11
表 5.4.2 歷年各區水稻耕作面積	5-12
表 5.4.3 歷年各區水稻田甲烷排放量	5-12
表 5.4.4 各區水稻田甲烷排放係數參數與蒙地卡羅法之不確定性結果	5-14



表目錄

表 5.4.5 甲烷通量與排放量比較	5-15
表 5.5.1 農業土壤氧化亞氮直接排放相關係數	5-17
表 5.5.2 歷年化學肥料施用量與施氮量	5-18
表 5.5.3 歷年水稻田單位面積氮肥施用量	5-18
表 5.5.4 歷年水稻田耕作面積與施肥量估算	5-19
表 5.5.5 歷年禽畜糞肥料施用量與施氮量	5-19
表 5.5.6 估算作物殘體投入土壤的氮量的設定係數	5-20
表 5.5.7 各作物產量	5-21
表 5.5.8 各類作物殘餘量	5-22
表 5.5.9 各類作物殘餘氮量	5-22
表 5.5.10 歷年農業土壤的氧化亞氮直接排放	5-23
表 5.5.11 農地直接氧化亞氮排放係數、活動數據及不確定性	5-24
表 5.5.12 農地直接氧化亞氮排放本土與預設係數	5-25
表 5.5.13 土壤 N ₂ O 間接排放的預設排放、揮發和淋洗係數	5-26
表 5.5.14 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 揮發之排放量	5-26
表 5.5.15 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 淋洗 / 逕流之排放量	5-27
表 5.5.16 農地土壤間接氧化亞氮排放 - 揮發之揮發係數、排放係數、活動數據及不確定性	5-28
表 5.5.17 農地土壤間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流之排放係數、活動數據及不確定性	5-28
表 5.5.18 歷年農業土壤氧化亞氮排放總量	5-29
表 5.5.19 農業土壤氧化亞氮排放量不確性	5-30
表 5.7.1 植被類型焚燒相關的焚燒係數值（焚燒量與原生質量比例）	5-31
表 5.7.2 農業殘體排放係數（公斤 / 公噸乾物質焚燒量）	5-31
表 5.7.3 作物殘渣焚燒量	5-31
表 5.7.4 作物殘體焚燒產生之甲烷與氧化亞氮排放量	5-32
表 5.9.1 歷年尿素施用量與施用產生之二氧化碳排放	5-33
表 6.1.1 1990 至 2014 年臺灣地區森林資源整體之年移除量變化	6-2
表 6.2.1 碳庫定義	6-3
表 6.2.2 各排放係數值	6-6
表 6.2.3 2010 至 2014 年森林崩塌面積	6-6
表 6.2.4 1990 至 2014 年林地維持林地面積	6-7
表 6.2.5 臺灣地區森林主產物採伐量	6-7
表 6.2.6 受干擾影響的森林面積與損失材積	6-8
表 6.2.7 臺灣 1990 至 2014 年林地維持林地之年移除量變化	6-9
表 6.2.8 碳轉換係數不確定性分析結果	6-9
表 6.2.9 1990 至 2014 年林地維持林地不確定性	6-10
表 6.2.10 IPCC 查證方法比較	6-11
表 6.2.11 1990 至 2014 年土地轉變為林地面積	6-12
表 6.2.12 1990 至 2014 年土地轉變為森林之年移除量變化	6-13
表 6.2.13 1990 至 2014 年土地轉變為林地年移除量變化不確定性	6-13
表 6.2.14 1990 至 2014 年森林資源整體年除移量變化不確定性	6-13
表 7.1.1 IPCC 指南廢棄物部門排放源分類	7-1
表 7.1.2 廢棄物部門 1990 至 2014 年溫室氣體排放量	7-2
表 7.1.3 IPCC 評估報告溫暖化潛勢值	7-2
表 7.2.1 IPCC 指南掩埋場型式與對應之甲烷修正係數（MCF）	7-4
表 7.2.2 IPCC 指南廢棄物之可分解有機碳含量（DOC）	7-5
表 7.2.3 IPCC 指南掩埋場之氧化係數	7-5
表 7.2.4 IPCC 指南掩埋場甲烷生成率（k）值	7-6
表 7.2.5 IPCC 指南掩埋處理甲烷排放計算一覽表	7-6

表目錄

表 7.2.6 臺灣 1990 至 2014 年妥善管理掩埋場活動數據統計	7-7
表 7.2.7 臺灣 1990 至 2014 年妥善管理掩埋場甲烷排放量	7-8
表 7.2.8 妥善管理掩埋場一般清單品質控制程序檢核表	7-9
表 7.2.9 臺灣 1990 至 2014 年未妥善管理掩埋場活動數據統計	7-11
表 7.2.10 臺灣 1990 至 2014 年未妥善管理掩埋場甲烷排放量	7-12
表 7.2.11 未妥善管理掩埋場一般清單品質控制程序檢核表	7-13
表 7.3.1 廢棄物生物處理甲烷和氧化亞氮排放係數預設值	7-14
表 7.3.2 IPCC 估算生物處理溫室氣體排放計算一覽表	7-14
表 7.3.3 臺灣 1990 至 2014 年生物處理各類溫室氣體排放量	7-15
表 7.3.4 堆肥一般清單品質控制程序檢核表	7-16
表 7.4.1 2006 IPCC 指南焚化處理氧化亞氮排放係數	7-18
表 7.4.2 IPCC 焚化處理二氧化碳排放計算一覽表	7-18
表 7.4.3 2006 IPCC 指南焚化處理氧化亞氮排放計算一覽表	7-19
表 7.4.4 2006 IPCC 指南焚化處理之各類溫室氣體活動數據及與排放量	7-19
表 7.4.5 廢棄物焚化一般清單品質控制程序檢核表	7-21
表 7.5.1 廢水處理系統甲烷及氧化亞氮排放潛勢	7-22
表 7.5.2 生活污水處理系統預設之 MCF 值	7-23
表 7.5.3 IPCC 生活污水處理甲烷排放計算一覽表	7-24
表 7.5.4 IPCC 生活污水放流氧化亞氮排放計算一覽表	7-24
表 7.5.5 臺灣 1990 至 2014 年生活污水甲烷排放之活動數據與排放量	7-25
表 7.5.6 臺灣 1990 至 2014 年生活污水放流氧化亞氮之活動數據與排放量	7-26
表 7.5.7 生活污水一般清單品質控制程序檢核表	7-27
表 7.5.8 事業廢水甲烷排放 MCF 預設值	7-28
表 7.5.9 事業廢水處理甲烷排放參數採用一覽表	7-29
表 7.5.10 臺灣 1990 至 2014 年事業廢水處理甲烷活動數據及排放量	7-30
表 7.5.11 事業廢水一般清單品質控制程序檢核表	7-31
表 7.6.1 2006 IPCC 指南掩埋場甲烷排放估算之不確定性	7-34
表 7.6.2 臺灣 2014 年廢棄物部門掩埋場甲烷排放之不確定性率定及率定說明	7-34
表 7.6.3 臺灣 2014 年廢棄物部門廢棄物生物處理之排放不確定性	7-34
表 7.6.4 臺灣 2014 年廢棄物部門廢棄物焚化處理之二氧化碳排放不確定性	7-35
表 7.6.5 臺灣 2014 年廢棄物部門廢棄物焚化處理之氧化亞氮排放不確定性	7-35
表 7.6.6 生活污水相關參數預設值之不確定範圍	7-35
表 7.6.7 臺灣 2014 年廢棄物部門生活污水甲烷排放之不確定性	7-36
表 7.6.8 臺灣 2014 年廢棄物部門生活污水氧化亞氮排放之不確定性	7-36
表 7.6.9 IPCC 指南事業廢水相關參數預設值之不確定範圍	7-36
表 7.6.10 臺灣 2014 年廢棄物部門事業廢水甲烷排放之不確定性	7-37
表 7.6.11 臺灣 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量不確定性	7-37
表 7.6.12 生活污水甲烷排放歷年計算參數與排放量	7-38
表 7.6.13 生活污水甲烷計算參數機率密度函數及不確定值	7-38
表 7.6.14 生活污水氧化亞氮排放歷年計算參數與排放量	7-39
表 7.6.15 生活污水氧化亞氮計算參數機率密度函數及不確定值	7-39
表 7.6.16 事業廢水甲烷排放歷年計算參數與排放量	7-39
表 7.6.17 事業廢水甲烷計算參數機率密度函數及不確定值	7-40
表 8.1.1 各部門排放源之改善計畫	8-2



圖目錄

圖 ES2.1 臺灣 1990 至 2014 年總溫室氣體排放量和移除量趨勢	ES-2
圖 ES2.2 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量趨勢	ES-7
圖 1.3.1 臺灣國家溫室氣體排放清冊準備程序	1-2
圖 2.1.1 臺灣 1990 至 2014 年總溫室氣體排放量和移除量趨勢	2-1
圖 2.1.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒二氧化碳和人均排放趨勢	2-3
圖 2.1.3 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放密集度趨勢	2-3
圖 2.2.1 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放量趨勢	2-6
圖 2.2.2 臺灣 1990 至 2014 年甲烷排放量趨勢	2-6
圖 2.2.3 臺灣 1990 至 2014 年氧化亞氮排放量趨勢	2-9
圖 2.2.4 臺灣 1993 至 2014 年氫氟碳化物排放量趨勢	2-9
圖 2.2.5 臺灣 1999 至 2014 年全氟碳化物排放量趨勢	2-11
圖 2.2.6 臺灣 1999 至 2014 年六氟化硫排放量趨勢	2-12
圖 2.2.7 臺灣 1999 至 2014 年三氟化氮排放量趨勢	2-13
圖 2.3.1 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量和移除量趨勢	2-14
圖 2.3.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門溫室氣體排放量趨勢	2-15
圖 2.3.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量趨勢	2-17
圖 2.3.4 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量趨勢	2-19
圖 2.3.5 臺灣 1990 至 2014 年土地利用、土地利用變化及林業部門二氧化碳移除量趨勢	2-20
圖 2.3.6 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量趨勢	2-21
圖 3.2.1 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢	3-11
圖 3.2.2 臺灣 2014 年能源部門燃料燃燒二氧化碳排放部門占比	3-11
圖 3.2.3 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒甲烷排放量趨勢	3-15
圖 3.2.4 臺灣 2014 年能源部門燃料燃燒甲烷排放部門占比	3-15
圖 3.2.5 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢	3-17
圖 3.2.6 臺灣 2014 年能源部門燃料燃燒氧化亞氮排放部門占比	3-17
圖 3.2.7 燃料燃燒溫室氣體排放統計活動數據品質管理程序	3-18
圖 3.2.8 臺灣 1990 至 2014 年能源產業燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢	3-20
圖 3.2.9 臺灣 2014 年能源產業燃料燃燒二氧化碳排放占比	3-20
圖 3.2.10 臺灣 1990 至 2014 年能源產業燃料燃燒甲烷排放量趨勢	3-22
圖 3.2.11 臺灣 2014 年能源產業燃料燃燒甲烷排放占比	3-22
圖 3.2.12 臺灣 1990 至 2014 年能源產業燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢	3-24
圖 3.2.13 臺灣 2014 年能源產業燃料燃燒甲烷排放占比	3-24
圖 3.2.14 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業燃料燃燒二氧化碳排放趨勢	3-27
圖 3.2.15 臺灣 2014 年製造業與營造業燃料燃燒二氧化碳排放占比	3-27
圖 3.2.16 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業燃料燃燒甲烷排放量趨勢	3-28
圖 3.2.17 臺灣 2014 年製造業與營造業燃料燃燒甲烷排放占比	3-29
圖 3.2.18 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢	3-30
圖 3.2.19 臺灣 2014 年製造業與營造業燃料燃燒氧化亞氮排放占比	3-30
圖 3.2.20 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢	3-32
圖 3.2.21 臺灣 2014 年運輸部門燃料燃燒二氧化碳排放占比	3-32
圖 3.2.22 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門燃料燃燒甲烷排放量趨勢	3-34
圖 3.2.23 臺灣 2014 年運輸部門燃料燃燒甲烷排放占比	3-34
圖 3.2.24 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢	3-35
圖 3.2.25 臺灣 2014 年運輸部門燃料燃燒氧化亞氮排放占比	3-36
圖 3.2.26 臺灣 1990 至 2014 年服務業、住宅、農林漁牧部門燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢	3-37
圖 3.2.27 臺灣 2014 年服務業、住宅、農林漁牧部門燃料燃燒二氧化碳排放占比	3-38
圖 3.2.28 臺灣 1990 至 2014 年服務業、住宅、農林漁牧部門燃料燃燒甲烷排放量趨勢	3-39
圖 3.2.29 臺灣 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒甲烷排放占比	3-39

圖目錄

圖 3.2.30 臺灣 1990 至 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢	3-40
圖 3.2.31 臺灣 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒氧化亞氮排放占比	3-40
圖 3.2.32 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢	3-42
圖 3.2.33 臺灣 2014 年國際運輸燃料燃燒二氧化碳排放占比	3-43
圖 3.2.34 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料燃燒甲烷排放量趨勢	3-43
圖 3.2.35 臺灣 2014 年國際運輸燃料燃燒甲烷排放占比	3-44
圖 3.2.36 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢	3-45
圖 3.2.37 臺灣 2014 年國際運輸燃料燃燒氧化亞氮排放占比	3-45
圖 3.2.38 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用燃料燃燒二氧化碳扣減量趨勢	3-46
圖 3.2.39 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用燃料燃燒甲烷扣減量趨勢	3-47
圖 3.2.40 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用燃料燃燒氧化亞氮扣減量趨勢	3-48
圖 4.1.1 臺灣 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體種類排放占比	4-3
圖 4.1.2 臺灣 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放占比	4-3
圖 4.1.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門排放量趨勢	4-4
圖 4.2.1 臺灣 1990 至 2014 年礦業（非金屬製程）排放量趨勢	4-5
圖 4.2.2 臺灣 1990 至 2014 年水泥生產排放量趨勢	4-6
圖 4.2.3 工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計 QA/QC 流程（活動數據 - 民間來源）	4-7
圖 4.2.4 臺灣 1990 至 2014 年石灰生產排放量趨勢	4-8
圖 4.2.5 工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計 QA/QC 流程（活動數據 - 官方數據）	4-9
圖 4.2.6 臺灣 1990 至 2014 年玻璃生產排放量趨勢	4-10
圖 4.2.7 臺灣 1990 至 2014 年純鹼使用排放量趨勢	4-11
圖 4.2.8 臺灣 1990 至 2014 年石灰石與白雲石使用排放量趨勢	4-13
圖 4.2.9 臺灣 1990 至 2014 年玻璃纖維製品生產排放量趨勢	4-15
圖 4.3.1 臺灣 1990 至 2014 年化學工業排放量趨勢	4-16
圖 4.3.2 臺灣 1990 至 2014 年硝酸生產排放量趨勢	4-17
圖 4.3.3 工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計 QA/QC 流程（活動數據 - 官方數據、民間來源）	4-18
圖 4.3.4 臺灣 1990 至 2014 年己內醯胺生產排放量趨勢	4-19
圖 4.3.5 臺灣 1990 至 2000 年碳化鈣使用排放量趨勢	4-20
圖 4.3.6 臺灣 1990 至 2014 年二氧化鈦生產排放量趨勢	4-22
圖 4.3.7 臺灣 1990 至 2000 年純鹼生產排放量	4-23
圖 4.3.8 臺灣 1990 至 1998 年甲醇生產排放量趨勢	4-24
圖 4.3.9 臺灣 1990 至 2014 年乙烯生產排放量趨勢	4-26
圖 4.3.10 臺灣 1990 至 2014 年氯乙烯生產排放量趨勢	4-27
圖 4.3.11 臺灣 1990 至 2014 年環氧乙烷生產排放量趨勢	4-28
圖 4.3.12 臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈生產排放量趨勢	4-30
圖 4.3.13 臺灣 1990 至 2014 年碳煙生產排放量趨勢	4-31
圖 4.3.14 臺灣 1993 至 2004 年 HCFC-22 副產品（HFC-23）排放量趨勢	4-32
圖 4.3.15 臺灣 1990 至 2014 年苯乙烯生產排放量趨勢	4-34
圖 4.4.1 臺灣 1990 至 2014 年金屬製程排放量趨勢	4-35
圖 4.4.2 臺灣 1990 至 2014 年高爐鋼胚生產排放量趨勢	4-36
圖 4.4.3 臺灣 1990 至 2014 年電弧爐鋼胚生產排放量趨勢	4-38
圖 4.4.4 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金生產排放量趨勢	4-39
圖 4.4.5 臺灣 2002 至 2014 年鎂生產排放量趨勢	4-40
圖 4.4.6 鎂生產排放統計 QA/QC 流程	4-41
圖 4.4.7 臺灣 2003 至 2014 年鉛生產排放量趨勢	4-42
圖 4.4.8 臺灣 2003 至 2014 年鋅生產排放量趨勢	4-43
圖 4.5.1 臺灣 1990 至 2014 年燃料及溶劑使用的非能源產品排放量趨勢	4-45
圖 4.6.1 臺灣 1999 至 2014 年電子工業排放量趨勢	4-45



圖目錄

圖 4.6.2 臺灣 2001 至 2014 年積體電路或半導體排放量趨勢	4-47
圖 4.6.3 積體電路或半導體排放統計 QA/QC 流程	4-47
圖 4.6.4 臺灣 1999 至 2014 年 TFT 平面顯示器排放量趨勢	4-49
圖 4.6.5 TFT 平面顯示器排放統計 QA/QC 流程	4-49
圖 4.7.1 臺灣 2003 至 2014 年破壞臭氧層物質之替代品使用排放量趨勢	4-50
圖 4.7.2 臺灣 2003 至 2014 年冷凍空調使用排放量趨勢	4-51
圖 4.7.3 臺灣 2003 至 2014 年滅火劑使用排放量趨勢	4-52
圖 4.8.1 臺灣 1990 至 2014 年高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放量趨勢	4-54
圖 4.8.2 高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放統計 QA/QC 流程	4-55
圖 4.9.1 臺灣 1990 至 2014 年啤酒生產排放量趨勢	4-57
圖 5.1.1 臺灣 1990 至 2014 年農業部門排放量趨勢	5-2
圖 5.1.2 臺灣 2014 年農業部門溫室氣體各排放源占比	5-3
圖 5.4.1 歷年水稻田甲烷排放量	5-13
圖 5.5.1 歷年農業土壤直接氧化亞氮排放總量	5-23
圖 5.5.2 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 揮發之排放量	5-27
圖 5.5.3 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 淋洗 / 逕流之排放量	5-27
圖 5.5.4 歷年農業土壤氧化亞氮排放量	5-29
圖 5.7.1 歷年作物殘體焚燒之甲烷與氧化亞氮排放量	5-32
圖 5.9.1 歷年尿素施用產生二氧化碳排放	5-33
圖 6.1.1 1990 至 2014 年林業部門森林資源整體移除量變化趨勢圖	6-2
圖 6.1.2 2014 年森林碳匯各項目占比	6-3
圖 7.1.1 臺灣廢棄物部門 1990 至 2014 年溫室氣體排放量趨勢	7-2
圖 7.1.2 臺灣廢棄物部門 1990 至 2014 年各類溫室氣體排放量趨勢	7-3
圖 7.2.1 臺灣 1990 至 2014 年妥善管理廢棄物掩埋場甲烷排放量趨勢	7-8
圖 7.2.2 臺灣 1990 至 2014 年未妥善管理廢棄物掩埋場甲烷排放量趨勢	7-12
圖 7.3.1 臺灣 1990 至 2014 年生物處理甲烷排放量趨勢	7-15
圖 7.3.2 臺灣 1990 至 2014 年生物處理氧化亞氮排放量趨勢	7-15
圖 7.4.1 臺灣 1990 至 2014 年發電焚化量近年變化趨勢	7-17
圖 7.4.2 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物焚化二氧化碳排放量趨勢	7-20
圖 7.4.3 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物焚化氧化亞氮排放趨勢	7-20
圖 7.5.1 臺灣 1990 至 2014 年生活污水處理甲烷排放趨勢	7-25
圖 7.5.2 臺灣 1990 至 2014 年生活污水放流氧化亞氮排放趨勢	7-26
圖 7.5.3 臺灣 1990 至 2014 年事業廢水處理甲烷排放量趨勢	7-30
圖 7.6.1 機率密度函數 (PDF) 與信賴區間	7-32
圖 7.6.2 其他型態機率密度函數 (PDF)	7-32

執行摘要

ES.1 國家溫室氣體排放清冊背景資訊

依據聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）第 4 條及第 12 條與京都議定書第 5 條規範，締約方有義務提交有關因應氣候變遷相關進展之資訊，供 UNFCCC 締約方會議檢視，其中國家清冊報告（National Inventory Report, NIR）即為 UNFCCC¹ 要求附件一國家，每年以共同報告格式（Common Reporting Format, CRF）呈報其國家溫室氣體排放清冊之際，加以說明該國溫室氣體清冊準備程序、排放趨勢說明、各部門統計情況、重新計算情況等的國家報告。中華民國（以下簡稱臺灣）雖然不是 UNFCCC 締約方，但是向來恪盡地球村的責任，積極為減緩地球暖化貢獻心力，而建置國家溫室氣體排放清冊，估算溫室氣體排放量與移除量是國家因應 UNFCCC 的基本義務，也是減緩地球暖化的基本工作之一。

臺灣自 1998 年以來便積極準備溫室氣體清冊，根據 2011 年在南非德班召開 UNFCCC 第 17 次締約方大會及京都議定書第 7 次締約方會議（COP17/CMP7），通過第 24/CP.17 號決議文，要求已開發國家遵循 2006 年版政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）國家溫室氣體排放清冊指南的統計方法（2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories，以下簡稱 2006 IPCC 指南），於 2015 年起按照新統計方法遞交年度國家溫室氣體排放清冊及其報告（Annual National Inventory Report）；本報告同步依循 2006 IPCC 指南的統計方法進行統計與彙編，展現我國積極遵約的努力與決心，迄今已經完成 1990 至 2014 年溫室氣體清冊資料庫之建置，主要的目的在於彙整溫室氣體清冊統計概況，說明臺灣溫室氣體排放趨勢，

除了有利於未來溫室氣體統計工作的持續進行外，並能藉此向國內外各界介紹臺灣溫室氣體統計工作概況，期能獲得各方建議，不斷提昇國家溫室氣體排放清冊的品質。

ES.2 國家排放量與移除量趨勢摘要

臺灣總溫室氣體（Greenhouse Gas, GHG）排放量自 1990 年 137,854 千公噸二氧化碳當量（不包括二氧化碳移除量），上升至 2014 年 283,489 千公噸二氧化碳當量（不包括二氧化碳移除量），排放量增加 105.65%，年平均成長率為 3.05%，而 2014 年較 2013 年增加 0.33%。淨溫室氣體排放量自 1990 年 114,468 千公噸二氧化碳當量，上升至 2014 年 262,012 千公噸二氧化碳當量，排放量增加 128.90%，年平均成長率為 3.51%，而 2014 年較 2013 年增加 0.39%，資料如圖 ES2.1 所示。進一步比較各類溫室氣體排放量資料可知，2014 年二氧化碳為臺灣所排放溫室氣體中最大宗，其次為甲烷，再其次為氧化亞氮及含氟溫室氣體；在 1990 至 2014 年間，二氧化碳排放量成長 116.41%，年平均成長率為 3.27%；甲烷排放量減少 48.21%，年平均成長率為 -2.70%，呈現負成長；氧化亞氮排放量增加 55.54%，年平均成長率為 1.86%，資料如圖 ES2.1 所示。

臺灣二氧化碳排放源係來自於能源部門、工業製程及產品使用部門、農業部門和廢棄物部門，如表 ES2.2 所示。1990 年二氧化碳排放量為 124,077 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 268,515 千公噸二氧化碳當量，增加 116.41%，平均成長率為 3.27%；其中 2014 年能源部門占 93.49%、工業製程及產品使用部門占 6.46%、農業部門占 0.02% 與廢棄物部門占 0.03%。2014 年較 2013 年排放量增加 0.31%，主要為能源部門增加 0.77%、工業製程及產品使用部門減少 6.38%、農業部門減少 12.04% 與廢棄物部門增加 19.32%。

甲烷排放來源則來自於農業部門、廢棄物部門與能源部門，如表 ES2.3 所示。1990 年甲烷排放量 10,882 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 5,636 千公噸二氧化碳當

1 UNFCCC, FCCC/CP/2002/8, 2002.



量，減少 48.21%，平均成長率為減少 2.70%；其中 2014 年甲烷排放量以廢棄物部門占 68.04% 最多、農業部門占 22.82%、能源部門占 8.48%、與工業製程及產品使用部門占 0.66%。2014 年較 2013 年排放量減少 5.69%，主要為廢棄物部門減少 7.64%、農業部門減少 1.39%、能源部門減少 0.89% 與工業製程及產品使用部門減少 0.43%。

氧化亞氮排放來源為工業製程及產品使用部門、農業部門、與能源部門，廢棄物部門也有少量排放，如表 ES2.4 所示。1990 年氧化亞氮排放量為 2,895 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 4,503 千公噸二氧化碳當量，增加 55.54%，平均成長率為 1.86%；其中 2014 年臺灣氧化亞氮排放量以工業製程及產品使用部門占 33.62%、農業部門占 31.69%、能源部門占 27.17%，廢棄物部門占 7.52%。2014 年較 2013 年排放量減少 0.47%，工業製程及產品使用部門減少 1.63%、農業部門減少 0.32%、能源部門減少 0.31%，僅廢棄物部門增加 3.81%。

臺灣含氟溫室氣體多使用於經濟發展重點產業，包括半導體、光電、電力設施及鎂合金等產業，屬於較集中排放產業。臺灣含氟氣體排放量如表 ES2.5 所示。其中，氫氟碳化物（Hydrofluorocarbons, HFCs）自 1993 年的

755 千公噸二氧化碳當量，增加至 2014 年 1,010 千公噸二氧化碳當量；全氟碳化物（Perfluorocarbons, PFCs）自 1999 年的 3 千公噸二氧化碳當量，2014 年增加至 1,298 千公噸二氧化碳當量；六氟化硫（SF₆）則自 1999 年 116 千公噸二氧化碳當量，於 2014 年增至 1,355 千公噸二氧化碳當量；而三氟化氮（NF₃）則自 1999 年 11 千公噸二氧化碳當量，於 2014 年增至 1,171 千公噸二氧化碳當量。就整體含氟溫室氣體排放量而言，自 1999 年 1,738 千公噸二氧化碳當量（約占當年總溫室氣體排放量的 0.77%），增加至 2014 年的 4,835 千公噸二氧化碳當量（約占當年總溫室氣體排放量的 1.71%），排放量增加 178.16%，其中，2014 年較 2013 年排放量增加 10.77%。

ES.3 排放源及吸收匯分類之排放估算與趨勢總覽

就部門別而言，能源部門歷年皆為臺灣溫室氣體總排放量最大之部門，2014 年能源部門溫室氣體排放量約占總排放量（不計土地利用、土地利用變化及林業移除量）的 89.15%，工業製程及產品使用部門占 8.37%，農業部門占 0.97%，廢棄物部門占 1.50%。臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放趨勢如圖 ES3.1 與表 ES3.1 所示。在 1990 至 2014 年間，能源部門溫室氣體排放量




圖 ES2.1 臺灣 1990 至 2014 年總溫室氣體排放量和移除量趨勢

表 ES2.1 臺灣 1990 至 2014 年各類溫室氣體排放量和移除量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體	溫暖化潛勢	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
二氧化碳	1	124,077	133,543	142,155	153,784	161,024	168,487	176,292	190,297	199,924
甲烷	25	10,882	11,157	11,206	11,603	12,364	13,108	13,539	13,559	13,579
氧化亞氮	298	2,895	3,148	3,142	3,212	3,254	3,323	3,246	3,282	3,225
氫氟碳化物	HFC-134a: 1,430 等	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083
全氟碳化物	PFC-14:7,390 等	NE								
六氟化硫	22,800	NE								
三氟化氮	17,200	NE								
二氧化碳移除量	1	-23,386	-21,490	-23,516	-23,493	-23,379	-23,233	-22,717	-22,899	-22,699
淨溫室氣體排放量		114,468	126,357	132,988	145,861	154,118	162,487	171,666	185,716	196,111
總溫室氣體排放量		137,854	147,847	156,504	169,354	177,497	185,720	194,383	208,615	218,810
溫室氣體	溫暖化潛勢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
二氧化碳	1	207,599	227,119	229,840	237,857	248,233	256,453	263,492	272,689	276,249
甲烷	25	13,705	13,490	12,646	12,029	11,489	10,756	10,253	9,588	9,062
氧化亞氮	298	3,185	3,797	3,930	4,033	3,957	4,103	4,159	4,694	4,780
氫氟碳化物	HFC-134a: 1,430 等	1,609	2,319	2,619	2,216	2,397	2,451	1,070	987	1,093
全氟碳化物	PFC-14:7,390 等	3	13	2,939	4,143	4,198	4,341	3,070	3,264	2,972
六氟化硫	22,800	116	120	746	3,914	4,385	5,193	4,683	3,590	3,114
三氟化氮	17,200	11	10	235	398	540	659	726	650	759
二氧化碳移除量	1	-22,550	-22,476	-21,583	-22,415	-22,305	-22,196	-21,918	-21,861	-21,650
淨溫室氣體排放量		203,678	224,392	231,372	242,175	252,893	261,759	265,536	273,599	276,379
總溫室氣體排放量		226,228	246,868	252,955	264,590	275,198	283,955	287,454	295,460	298,029
溫室氣體	溫暖化潛勢	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
二氧化碳	1	263,531	248,714	266,607	272,452	267,894	267,687	268,515		
甲烷	25	8,344	7,682	7,092	6,658	6,321	5,976	5,636		
氧化亞氮	298	4,370	4,531	4,937	4,828	4,741	4,524	4,503		
氫氟碳化物	HFC-134a: 1,430 等	1,046	980	934	1,016	869	981	1,010		
全氟碳化物	PFC-14:7,390 等	1,682	1,143	1,354	1,365	725	929	1,298		
六氟化硫	22,800	2,644	2,176	2,155	1,755	1,647	1,722	1,355		
三氟化氮	17,200	166	538	219	381	349	734	1,171		
二氧化碳移除量	1	-21,631	-18,911	-21,413	-21,470	-21,572	-21,564	-21,477		
淨溫室氣體排放量		260,152	246,854	261,884	266,984	260,973	260,989	262,012		
總溫室氣體排放量		281,783	265,765	283,297	288,454	282,545	282,553	283,489		

說明：1. 溫暖化潛勢 (Global Warming Potential, 以下簡稱 GWP) 引用 IPCC 第四次評估報告。

2. NE (未估計)，指對現有排放量和移除量沒有估計。

表 ES2.2 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放量和移除量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	109,491	118,414	126,056	135,212	142,982	150,437	158,104	170,599	181,294	190,260	209,364	213,039	221,092	230,680
1.A.1. 能源工業	49,118	55,403	58,795	66,180	70,862	76,800	81,519	92,436	100,959	107,029	122,157	126,437	130,556	140,966
1.A.2. 製造業與營造業	30,154	31,656	33,121	33,405	34,380	34,996	36,051	37,818	38,551	39,854	43,064	42,158	44,936	43,564
1.A.3. 運輸	19,646	20,888	24,033	26,103	27,540	28,822	29,801	30,536	31,844	32,772	33,207	33,246	34,542	34,509
1.A.4. 其他	10,572	10,466	10,107	9,523	10,200	9,820	10,733	9,809	9,940	10,605	10,937	11,198	11,058	11,641
1.A.4.a 服務業	3,621	3,529	2,989	2,490	3,018	2,445	3,175	2,483	2,948	3,155	3,220	3,562	3,493	3,961
1.A.4.b 住宅	4,005	4,238	4,446	4,359	4,461	4,597	4,754	4,851	4,952	5,410	5,354	5,181	5,107	4,869
1.A.4.c 農林漁牧	2,946	2,700	2,672	2,675	2,721	2,777	2,805	2,475	2,041	2,040	2,362	2,455	2,459	2,811
2. 工業製程及產品使用部門	14,424	14,975	15,895	18,378	17,797	17,501	17,651	19,460	18,386	17,156	17,365	16,168	16,059	17,053
2.A 礦業 (非金屬製程)	10,584	10,698	11,854	13,879	13,259	12,766	12,645	13,394	11,564	10,746	10,486	9,974	10,648	10,270
2.B 化學工業	563	539	565	609	762	850	992	1,020	1,003	1,075	1,143	1,232	1,313	1,384
2.C 金屬工業	3,275	3,735	3,474	3,888	3,774	3,884	4,013	5,045	5,817	5,333	5,734	4,960	4,096	5,397
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 農業部門	142	146	139	131	135	151	151	134	127	118	131	94	93	82
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-23,386	-21,490	-23,516	-23,493	-23,379	-23,233	-22,717	-22,899	-22,699	-22,550	-22,476	-21,583	-22,415	-22,305
5. 廢棄物部門	20	8	65	63	110	398	387	105	117	65	259	540	612	417
淨二氧化碳排放量	100,691	112,053	118,639	130,291	137,645	145,254	153,575	167,398	177,225	185,049	204,643	208,257	215,442	225,928
總二氧化碳排放量	124,077	133,543	142,155	153,784	161,024	168,487	176,292	190,297	199,924	207,599	227,119	229,840	237,857	248,233
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	238,517	245,204	252,070	255,871	244,635	232,204	248,279	253,449	248,639	249,110	251,038			
1.A.1. 能源工業	146,638	153,820	160,602	164,426	158,464	148,936	159,910	163,547	161,112	160,239	165,646			
1.A.2. 製造業與營造業	43,978	42,660	43,947	45,868	42,391	39,558	43,663	44,898	43,256	44,564	40,361			
1.A.3. 運輸	35,859	36,844	36,769	35,415	33,394	33,711	34,824	35,293	34,502	34,472	34,930			
1.A.4. 其他	12,041	11,880	10,752	10,162	10,387	9,999	9,881	9,712	9,769	9,835	10,101			
1.A.4.a 服務業	4,118	4,230	4,248	4,192	4,201	4,226	4,203	3,961	3,958	4,177	4,411			
1.A.4.b 住宅	4,947	5,023	4,857	4,879	4,820	4,775	4,737	4,814	4,770	4,649	4,616			
1.A.4.c 農林漁牧	2,977	2,626	1,646	1,091	1,365	998	941	937	1,041	1,009	1,074			
2. 工業製程及產品使用部門	17,340	17,877	20,089	19,758	18,396	16,300	18,067	18,835	19,139	18,528	17,346			
2.A 礦業 (非金屬製程)	10,691	11,257	11,014	10,369	9,289	8,467	8,616	9,577	9,333	9,866	8,728			
2.B 化學工業	1,485	1,552	1,530	1,654	1,457	1,514	1,599	1,637	1,503	1,572	1,603			
2.C 金屬工業	5,162	5,066	7,544	7,733	7,648	6,317	7,851	7,620	8,301	7,088	7,013			
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3. 農業部門	84	62	59	57	57	55	54	53	55	45	40			
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-22,196	-21,918	-21,861	-21,650	-21,631	-18,911	-21,413	-21,470	-21,572	-21,564	-21,477			
5. 廢棄物部門	512	348	470	562	443	154	208	115	61	4	91			
淨二氧化碳排放量	234,257	241,574	250,827	254,599	241,900	229,803	245,194	250,982	246,322	246,123	247,038			
總二氧化碳排放量	256,453	263,492	272,688	276,249	263,531	248,714	266,607	272,452	267,894	267,687	268,515			

表 ES2.3 臺灣 1990 至 2014 年甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	254	270	293	310	328	344	359	370	390	409	430	435	447	465
2. 工業製程及產品使用部門	5	7	6	7	8	10	11	12	10	12	14	23	24	22
3. 農業部門	1,873	1,901	1,864	1,863	1,832	1,855	1,839	1,723	1,622	1,644	1,618	1,565	1,479	1,394
3.A 畜禽腸道發酵	670	731	738	775	789	822	822	732	674	694	692	660	636	626
3.B 畜禽糞尿管理	206	236	234	240	247	259	266	219	192	205	210	201	194	192
3.C 水稻種植	960	908	845	825	775	767	745	765	751	738	702	689	637	567
3.F 作物殘體燃燒	38	25	48	22	21	7	7	7	6	7	14	15	13	9
5. 廢棄物部門	8,750	8,980	9,044	9,423	10,196	10,899	11,329	11,454	11,556	11,640	11,429	10,624	10,079	9,607
5.A 固體廢棄物處理	5,832	5,917	5,928	6,323	7,061	7,719	8,080	8,212	8,372	8,596	8,512	7,732	7,214	6,675
5.B 固體廢棄物之生物處理	11	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2
5.D 廢水處理與放流	2,907	3,062	3,115	3,100	3,135	3,179	3,249	3,241	3,184	3,042	2,916	2,891	2,864	2,930
總計	10,882	11,157	11,206	11,603	12,364	13,108	13,539	13,559	13,579	13,705	13,490	12,646	12,029	11,489
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	482	488	488	491	473	462	478	485	478	482	478			
2. 工業製程及產品使用部門	28	29	33	39	37	33	36	9	35	38	37			
3. 農業部門	1,320	1,387	1,368	1,341	1,299	1,281	1,274	1,301	1,300	1,304	1,286			
3.A 畜禽腸道發酵	614	623	614	609	584	571	578	590	583	579	566			
3.B 畜禽糞尿管理	193	195	195	185	180	175	176	180	172	166	164			
3.C 水稻種植	505	561	551	543	529	530	514	526	540	555	552			
3.F 作物殘體燃燒	8	8	8	5	6	5	5	5	5	3	4			
5. 廢棄物部門	8,926	8,350	7,699	7,192	6,535	5,906	5,304	4,863	4,508	4,152	3,835			
5.A 固體廢棄物處理	6,101	5,525	4,930	4,379	3,814	3,246	2,749	2,352	1,997	1,688	1,428			
5.B 固體廢棄物之生物處理	7	10	11	14	16	18	21	26	24	23	20			
5.D 廢水處理與放流	2,818	2,815	2,757	2,798	2,705	2,642	2,535	2,485	2,486	2,441	2,387			
總計	10,756	10,253	9,588	9,062	8,344	7,682	7,092	6,658	6,321	5,976	5,636			

增加 129.18%，年平均成長率為 3.52%；工業製程及產品使用部門增加 62.61%，年平均成長率 2.05%；農業部門減少 29.61%，年平均成長率為減少 1.45%；廢棄物部門減少 52.97%，年平均成長率為 -3.09%；而土地利用、土地利用變化及林業部門溫室氣體移除量減少 8.16%，年平均成長率為 -0.35%。臺灣 2014 年總溫室氣體總排放量較 2013 年增加 0.33%，其中以能源部門增加 0.77%、工業製程及產品使用部門減少 3.01%、農業部門減少 1.01%、廢棄物部門減少 4.87%；另土地利用、土地利用變化及林業部門的碳移除量減少 0.40%。

1990 年能源部門溫室氣體排放為 110,281 千公噸二氧化碳當量，至 2014 年增加為 252,739 千公噸二氧化碳當量，成長 129.18%，年均成長為 3.52%，如表 ES3.2 所示。在此期間能源部門溫室氣體排放量至 2008 年首度呈現下降趨勢，2009 年再度下降，直到 2012 年又再度下降。2014 年能源部門之溫室氣體總排放量占臺灣溫室氣體總排放量的 89.15%，其中 1.A.1「能源產業」為 166,304 公噸二氧化碳當量，占能源部門之總溫室氣體排放量 65.80%，1.A.2「製造工業及營建」為 40,576 千公噸二氧化碳當量（占 16.05%），1.A.3「運輸」為 35,721

表 ES2.4 臺灣 1990 至 2014 年氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	537	578	652	703	739	772	816	861	912	961	1,047	1,070	1,124	1,175
1.A.1 能源產業	138	158	183	207	221	239	267	302	332	364	432	453	475	529
1.A.2 製造業與營造業	91	94	100	99	101	101	105	107	111	113	125	127	137	133
1.A.3 運輸	291	309	353	382	402	418	428	438	456	469	475	475	496	495
1.A.4 其他部門	17	17	15	14	15	14	16	14	14	14	15	16	16	17
2. 工業製程及產品使用部門	166	352	325	301	318	345	186	374	383	312	625	800	833	833
3. 農業部門	1,897	1,933	1,867	1,897	1,883	1,872	1,907	1,710	1,609	1,583	1,794	1,720	1,729	1,597
3.B 畜禽糞尿處理	48	50	52	54	59	61	67	70	71	72	73	71	71	71
3.D 農業土壤	1,837	1,876	1,800	1,837	1,818	1,808	1,838	1,638	1,536	1,509	1,717	1,644	1,655	1,524
3.F 農作物殘體燃燒	12	8	15	7	7	2	2	2	2	2	4	5	4	3
5. 廢棄物部門	296	285	298	311	313	334	337	337	321	329	331	340	348	353
總計	2,895	3,148	3,142	3,212	3,254	3,323	3,246	3,282	3,225	3,185	3,797	3,930	4,033	3,957
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	1,215	1,251	1,283	1,294	1,238	1,200	1,238	1,253	1,232	1,227	1,224			
1.A.1 能源產業	549	576	604	624	604	574	581	583	578	569	568			
1.A.2 製造業與營造業	135	132	137	149	139	131	144	151	144	148	138			
1.A.3 運輸	513	527	527	508	481	483	500	507	498	498	504			
1.A.4 其他部門	18	17	15	13	14	13	12	12	12	12	12			
2. 工業製程及產品使用部門	834	960	1,432	1,531	1,290	1,457	1,834	1,762	1,674	1,539	1,514			
3. 農業部門	1,710	1,598	1,629	1,595	1,514	1,547	1,528	1,469	1,497	1,432	1,427			
3.B 畜禽糞尿處理	69	71	72	71	72	71	71	71	71	71	73			
3.D 農業土壤	1,639	1,524	1,554	1,522	1,440	1,474	1,456	1,396	1,424	1,359	1,353			
3.F 農作物殘體燃燒	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1			
5. 廢棄物部門	343	350	351	360	328	327	337	344	339	326	339			
總計	4,103	4,159	4,694	4,780	4,370	4,531	4,937	4,828	4,741	4,524	4,503			

表 ES2.5 臺灣 1993 至 2014 年含氟氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
HFCs 總排放量	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,619	2,216	2,397	2,451
PFCs 總排放量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	3	13	2,939	4,143	4,198	4,341
SF ₆ 總排放量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	116	120	746	3,914	4,385	5,193
NF ₃ 總排放量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	11	10	235	398	540	659
總計	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,738	2,462	6,538	10,671	11,520	12,643
溫室氣體排放源和吸收匯	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HFCs 總排放量	1,070	987	1,093	1,046	980	934	1,016	869	981	1,010		
PFCs 總排放量	3,070	3,264	2,972	1,682	1,143	1,354	1,365	725	929	1,298		
SF ₆ 總排放量	4,683	3,590	3,114	2,644	2,176	2,155	1,755	1,647	1,722	1,355		
NF ₃ 總排放量	726	650	759	166	538	219	381	349	734	1,171		
總計	9,549	8,490	7,900	5,538	4,838	4,661	4,516	3,589	4,365	4,835		

說明：NE（未估計），指對現有源排放量和匯清除量沒有估計。




圖 ES2.2 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量趨勢

千公噸二氧化碳當量（占 14.13%），1.A.4「其他部門（包括服務業、住宅及農林漁牧業）」為 10,139 千公噸二氧化碳當量（占 4.01%）。

1990 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放為 14,595 千公噸二氧化碳當量，至 2014 年增加為 23,733 千公噸二氧化碳當量，成長 62.61%，年均成長為 2.05%，如表 ES3.3 所示。2014 年溫室氣體排放量占臺灣溫室氣體總排放量的 8.37%，其中 2.A「礦業（非金屬製品）」8,728 千公噸二氧化碳當量占工業製程及產品使用部門溫室氣體排放的 36.78%（比例最大），其次為 2.C「金屬工業」7,069 千公噸二氧化碳當量（占 29.79%）、2.E「電子工業」4,714 千公噸二氧化碳當量（19.86%）、2.B「化學工業」2,369 千公噸二氧化碳當量（占 9.98%）、2.F「破

壞臭氧層物質之替代品使用」828 千公噸二氧化碳當量（占 3.49%）、2.G「其他產品之製造與使用」24 千公噸二氧化碳當量（占 0.1%）及 2.H「其他」1.67 千公噸二氧化碳當量（占 0.01%）。

2014 農業部門溫室氣體排放量為 2,753 千公噸二氧化碳當量，約占臺灣溫室氣體總排放量的 0.97%，與 1990 年 3,911 千公噸二氧化碳當量相比較減少約 29.61%，年平均成長率為 -1.45%，如表 ES3.4 所示。2014 農業部門溫室氣體排放量較 2013 減少約 1.01%，其中以 3.D「農業土壤」氧化亞氮占 49.15%（比例最大）、3.A「畜禽腸胃發酵」甲烷占 20.57%、3.C「水稻種植」甲烷占 20.07%、3.B「畜禽糞尿處理」甲烷占 5.94%、3.B「畜禽糞尿處理」氧化亞氮占 2.65%、3.H「尿素使用」

表 ES3.1 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量

（單位：千公噸二氧化碳當量）

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	110,281	119,261	127,001	136,225	144,050	151,553	159,279	171,829	182,597	191,630	210,842	214,544	222,663	232,320
2. 工業製程及產品使用部門	14,595	15,333	16,227	19,441	18,977	18,658	19,154	21,323	20,862	19,218	20,465	23,529	27,586	29,428
3. 農業部門	3,911	3,980	3,869	3,890	3,850	3,878	3,897	3,567	3,359	3,345	3,543	3,379	3,301	3,074
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-23,386	-21,490	-23,516	-23,493	-23,379	-23,233	-22,717	-22,899	-22,699	-22,550	-22,476	-21,583	-22,415	-22,305
5. 廢棄物部門	9,066	9,273	9,407	9,798	10,619	11,631	12,053	11,896	11,993	12,035	12,018	11,504	11,039	10,377
淨溫室氣體排放量	114,468	126,357	132,988	145,861	154,118	162,487	171,666	185,716	196,111	203,678	224,392	231,372	242,175	252,893
總溫室氣體排放量	137,854	147,847	156,504	169,354	177,497	185,720	194,383	208,615	218,810	226,228	246,868	252,955	264,590	275,198
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	240,214	246,944	253,841	257,656	246,345	233,867	249,994	255,187	250,349	250,819	252,739			
2. 工業製程及生產使用部門	30,846	28,416	30,044	29,266	25,261	22,628	24,597	25,122	24,437	24,469	23,733			
3. 農業部門	3,114	3,047	3,056	2,993	2,870	2,884	2,856	2,823	2,851	2,781	2,753			
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-22,196	-21,918	-21,861	-21,650	-21,631	-18,911	-21,413	-21,470	-21,572	-21,564	-21,477			
5. 廢棄物部門	9,781	9,047	8,519	8,114	7,306	6,387	5,849	5,322	4,908	4,483	4,264			
淨溫室氣體排放量	261,759	265,536	273,599	276,379	260,152	246,854	261,884	266,984	260,973	260,989	262,012			
總溫室氣體排放量	283,955	287,454	295,460	298,029	281,783	265,765	283,297	288,454	282,545	282,553	283,489			

表 ES3.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	109,491	118,414	126,056	135,212	142,982	150,437	158,104	170,599	181,294	190,260	209,364	213,039	221,092	230,680
1.A.1. 能源工業	49,118	55,403	58,795	66,180	70,862	76,800	81,519	92,436	100,959	107,029	122,157	126,437	130,556	140,966
1.A.2. 製造業與營造業	30,154	31,656	33,121	33,405	34,380	34,996	36,051	37,818	38,551	39,854	43,064	42,158	44,936	43,564
1.A.3. 運輸	19,646	20,888	24,033	26,103	27,540	28,822	29,801	30,536	31,844	32,772	33,207	33,246	34,542	34,509
1.A.4. 其他	10,572	10,466	10,107	9,523	10,200	9,820	10,733	9,809	9,940	10,605	10,937	11,198	11,058	11,641
甲烷總排放量	254	270	293	310	328	344	359	370	390	409	430	435	447	465
1.A.1. 能源工業	26	29	28	31	33	38	37	44	50	57	66	67	68	78
1.A.2. 製造業與營造業	46	48	51	51	52	52	53	54	57	57	64	66	71	70
1.A.3. 運輸	152	163	187	202	216	228	239	245	257	266	270	272	278	287
1.A.4. 其他	30	29	28	26	28	27	29	26	27	28	29	30	30	32
氧化亞氮總排放量	537	578	652	703	739	772	816	861	912	961	1,047	1,070	1,124	1,175
1.A.1. 能源工業	138	158	183	207	221	239	267	302	332	364	432	453	475	529
1.A.2. 製造業與營造業	91	94	100	99	101	101	105	107	111	113	125	127	137	133
1.A.3. 運輸	291	309	353	382	402	418	428	438	456	469	475	475	496	495
1.A.4. 其他	17	17	15	14	15	14	16	14	14	14	15	16	16	17
能源部門總排放量	110,281	119,261	127,001	136,225	144,050	151,553	159,279	171,829	182,597	191,630	210,842	214,544	222,663	232,320
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	238,517	245,204	252,070	255,871	244,635	232,204	248,279	253,449	248,639	249,110	251,038			
1.A.1. 能源工業	146,638	153,820	160,602	164,426	158,464	148,936	159,910	163,547	161,112	160,239	165,646			
1.A.2. 製造業與營造業	43,978	42,660	43,947	45,868	42,391	39,558	43,663	44,898	43,256	44,564	40,361			
1.A.3. 運輸	35,859	36,844	36,769	35,415	33,394	33,711	34,824	35,293	34,502	34,472	34,930			
1.A.4. 其他	12,041	11,880	10,752	10,162	10,387	9,999	9,881	9,712	9,769	9,835	10,101			
甲烷總排放量	482	488	488	491	473	462	478	485	478	482	478			
1.A.1. 能源工業	83	84	89	95	95	85	89	89	90	91	89			
1.A.2. 製造業與營造業	71	69	73	79	75	70	78	82	79	82	77			
1.A.3. 運輸	295	303	298	289	276	281	285	288	284	284	286			
1.A.4. 其他	33	32	29	27	27	26	26	25	25	25	26			
氧化亞氮總排放量	1,215	1,251	1,283	1,294	1,238	1,200	1,237	1,253	1,232	1,227	1,224			
1.A.1. 能源工業	549	576	604	624	604	574	581	583	578	569	568			
1.A.2. 製造業與營造業	135	132	137	149	139	131	144	151	144	148	138			
1.A.3. 運輸	513	527	527	508	481	483	500	507	498	498	504			
1.A.4. 其他	18	17	15	13	14	13	12	12	12	12	12			
能源部門總排放量	240,214	246,944	253,841	257,656	246,345	233,867	249,994	255,187	250,349	250,819	252,739			

表 ES3.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	14,424	14,975	15,895	18,378	17,797	17,501	17,651	19,460	18,386	17,156	17,365	16,168	16,059	17,053
2.A 礦業 (非金屬製品)	10,584	10,698	11,854	13,879	13,259	12,766	12,645	13,394	11,564	10,746	10,486	9,974	10,648	10,270
2.B 化學工業	563	539	565	609	762	850	992	1,020	1,003	1,075	1,143	1,232	1,313	1,384
2.C 金屬工業	3,275	3,735	3,474	3,888	3,774	3,884	4,013	5,045	5,817	5,333	5,734	4,960	4,096	5,397
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
甲烷總排放量	5	7	6	7	8	10	11	12	10	12	14	23	24	22
氧化亞氮總排放量	166	352	325	301	318	345	186	374	383	312	625	800	833	833
2.B 化學工業	166	352	325	301	318	345	186	374	383	312	625	714	743	831
2.C 金屬工業	NE	86	90	2										
2.E 電子工業	NE													
氫氟碳化物總排放量	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,619	2,216	2,397
2.B 化學工業	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,567	2,157	1,937
2.E 電子工業	NE	51	59	59										
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	NE	401												
全氟碳化物總排放量 (2.E 電子工業)	NE	3	13	2,939	4,143	4,198								
六氟化硫總排放量	NE	116	120	746	3,914	4,385								
2.C 金屬工業	NE	1,027	1,027											
2.E 電子工業	NE	116	120	746	944	1,415								
2.G 其他產品之製造與使用	NE	1,943	1,943											
三氟化氮總排放量 (2.E 電子工業)	NE	11	10	235	398	540								
工業製程及產品使用部門總排放量	14,595	15,333	16,227	19,441	18,977	18,658	19,154	21,323	20,862	19,218	20,465	23,529	27,586	29,428
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	17,340	17,877	20,089	19,758	18,396	16,300	18,067	18,835	19,139	18,528	17,346			
2.A 礦業 (非金屬製品)	10,691	11,257	11,014	10,369	9,289	8,467	8,616	9,577	9,333	9,866	8,728			
2.B 化學工業	1,485	1,552	1,530	1,654	1,457	1,514	1,599	1,637	1,503	1,572	1,603			
2.C 金屬工業	5,162	5,066	7,544	7,733	7,648	6,317	7,851	7,620	8,301	7,088	7,013			
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
甲烷總排放量	28	29	33	39	37	33	36	9	35	38	37			
氧化亞氮總排放量	834	960	1,432	1,531	1,290	1,457	1,834	1,762	1,674	1,539	1,514			
2.B 化學工業	834	960	969	996	784	1,006	1,170	1,195	1,016	780	728			
2.C 金屬工業	NE	NE	94	95	90	76	119	NE	NE	NE	NE			
2.E 電子工業	NE	NE	369	439	416	375	546	568	658	759	786			
氫氟碳化物總排放量	2,451	1,070	987	1,093	1,046	980	934	1,016	869	981	1,010			
2.B 化學工業	1,710	NE												
2.E 電子工業	59	73	91	171	118	168	164	134	86	169	182			
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	682	996	896	922	928	812	770	881	783	812	828			
全氟碳化物總排放量 (2.E 電子工業)	4,341	3,070	3,264	2,972	1,682	1,143	1,354	1,365	725	929	1,298			
六氟化硫總排放量	5,193	4,683	3,590	3,114	2,644	2,176	2,155	1,755	1,647	1,722	1,355			
2.C 金屬工業	1,357	1,063	770	440	144	235	212	134	109	55	56			
2.E 電子工業	1,783	2,117	2,050	1,721	1,605	1,239	1,648	1,339	1,352	1,524	1,276			
2.G 其他產品之製造與使用	2,053	1,503	770	953	895	703	295	282	186	142	24			
三氟化氮總排放量 (2.E 電子工業)	659	726	650	759	166	538	219	381	349	734	1,171			
工業製程及產品使用部門總排放量	30,846	28,416	30,044	29,266	25,262	22,628	24,597	25,122	24,437	24,469	23,733			

說明：NE (未估計)，指對現有源排放量和匯清除量沒有估計。

二氧化碳占 1.45%、3.F「農作物殘體燃燒」甲烷占 0.13% 及 3.F「作物殘體燃燒」氧化亞氮占 0.04%。

土地利用、土地利用變化及林業部門移除之溫室氣體以二氧化碳為主，歷年之移除量呈現略有起伏增減的趨勢，每年的移除量變化並不大，主要係由森林資源年生長所增加的移除量為主，造林所增加的移除量及因森林干擾所減少的移除量較少。臺灣 1990 至 2014 年土地利用、土地利用變化及林業部門溫室氣體排放量（主要為森林資源之二氧化碳移除量）如表 ES3.5 所示，2014 年移除量為 21,477 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 87 千

公噸二氧化碳當量，減少 0.40%。1990 至 2014 年二氧化碳移除量減少約 8.16%，年平均成長率為 -0.35%。

2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量為 4,908 千公噸二氧化碳當量，約占臺灣溫室氣體總排放量的 1.50%（如表 ES3.6 所示），與 1990 年相比較減少約 52.97%，年平均成長率 -3.09%。2014 年廢棄物部門排放中，以 5.D「廢水處理與放流」甲烷占 55.97% 的比例最大，其次為 5.A「固體廢棄物處理」甲烷占 33.48%，5.D「5.D 廢水處理與放流」氧化亞氮占 7.38%，其餘為 5.C「廢棄物之焚化與露天燃燒」二氧化碳占 2.13%、5.B「廢棄物生物處理」

表 ES3.4 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量

（單位：千公噸二氧化碳當量）

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	142	146	139	131	135	151	151	134	142	127	119	131	94	93
甲烷總排放量	1,873	1,901	1,864	1,863	1,832	1,855	1,839	1,723	1,873	1,622	1,644	1,618	1,565	1,479
3.A 畜禽腸胃發酵	670	731	738	775	789	822	822	732	670	674	694	692	660	636
3.B 畜禽糞尿管理	206	236	234	240	247	259	266	219	206	192	205	210	201	194
3.C 水稻種植	960	908	845	825	775	767	745	765	960	751	738	702	689	637
3.F 作物殘體燃燒	38	25	48	22	21	7	7	7	38	6	7	14	15	13
氧化亞氮總排放量	1,897	1,933	1,866	1,897	1,883	1,872	1,907	1,710	1,897	1,609	1,583	1,794	1,720	1,729
3.B 畜禽糞尿管理	48	50	52	54	59	61	67	70	48	71	72	73	71	70
3.D 農耕土壤	1,837	1,876	1,800	1,837	1,818	1,808	1,838	1,638	1,837	1,536	1,509	1,717	1,644	1,655
3.F 作物殘體燃燒	12	8	15	7	7	2	2	2	12	2	2	4	5	4
農業部門總排放量	3,911	3,980	3,869	3,890	3,850	3,878	3,897	3,567	3,911	3,359	3,345	3,543	3,379	3,301
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	83	84	62	60	57	56	54	53	55	45	40			
甲烷總排放量	1,394	1,320	1,387	1,368	1,299	1,281	1,274	1,301	1,300	1,304	1,286			
3.A 畜禽腸胃發酵	626	614	623	614	584	571	578	590	583	579	566			
3.B 畜禽糞尿管理	192	193	195	195	180	175	176	180	172	166	164			
3.C 水稻種植	567	505	561	551	529	530	514	526	540	555	552			
3.F 作物殘體燃燒	9	8	8	8	6	5	5	5	5	3	4			
氧化亞氮總排放量	1,597	1,710	1,598	1,629	1,514	1,547	1,528	1,469	1,496	1,432	1,427			
3.B 畜禽糞尿管理	71	69	71	72	72	71	70	71	71	71	73			
3.D 農耕土壤	1,524	1,639	1,524	1,554	1,440	1,474	1,456	1,396	1,424	1,359	1,353			
3.F 作物殘體燃燒	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1			
農業部門總排放量	3,074	3,114	3,047	3,056	2,870	2,884	2,856	2,823	2,851	2,781	2,753			



甲烷占 0.48%、5.B「廢棄物生物處理」氧化亞氮占 0.43% 及 5.C「廢棄物焚化」氧化亞氮占 0.13%。

ES.4 其他資訊

後京都德班協議後，規範附件一國家需提交「國家清冊報告」(National Inventory Report)、「二年期報告」(Biennial Report)、「國家通訊」(National Communication)，非附件一國家需提交「二年期更新報告」(Biennial Update Report)及「國家通訊」，這些國家報告中，均涉及國家溫室氣體排放清冊之內容。目前臺灣已積極建置符合國情、部門分工、資料庫分層管

理、確實可行之國家體系，除已經擬定國家溫室氣體排放清冊審議規範外，並成立審議委員會，審議溫室氣體清冊與健全管理體系，以符合可量測、可報告與可查證機制 (Measurement, Reporting, Verification, MRV) 程序。此外，為配合 UNFCCC 自 2015 年起使用 2006 IPCC 指南的規劃，我國亦自動遵約 UNFCCC 規範，以 2006 IPCC 指南為統計基礎及架構，並於 2013 年建置國家溫室氣體排放清冊電子化之登錄平台，同時由相關部會線上提交國家溫室氣體統計資料，已於 2015 年與 UNFCCC 同步全面試用 2006 IPCC 指南。

表 ES3.5 臺灣 1990 至 2014 年林業部門年移除量變化

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年份	林地維持林地		其他土地轉變為林地	整體年移除量變化
	生物量二氧化碳貯存增加量 ($\Delta \text{CO}_2\text{G}$)	生物量年二氧化碳貯存損失量 ($\Delta \text{CO}_2\text{L}$)	生物量年二氧化碳貯存增加量 ($\Delta \text{CO}_2\text{G}$)	
1990	-23,902	607	-91	-23,386
1991	-23,902	2,503	-91	-21,490
1992	-23,713	333	-136	-23,516
1993	-23,524	216	-185	-23,493
1994	-23,335	190	-233	-23,379
1995	-23,146	202	-288	-23,233
1996	-22,957	559	-319	-22,717
1997	-22,768	266	-397	-22,899
1998	-22,579	326	-446	-22,699
1999	-22,390	401	-561	-22,550
2000	-22,201	389	-665	-22,476
2001	-22,012	1,112	-683	-21,583
2002	-21,823	167	-759	-22,415
2003	-21,633	227	-899	-22,305
2004	-21,444	243	-995	-22,196
2005	-21,255	369	-1,031	-21,918
2006	-21,066	251	-1,046	-21,861
2007	-20,877	308	-1,080	-21,650
2008	-20,688	199	-1,142	-21,631
2009	-20,499	2,753	-1,166	-18,911
2010	-20,392	218	-1,240	-21,413
2011	-20,409	140	-1,202	-21,470
2012	-20,435	145	-1,283	-21,572
2013	-20,473	135	-1,226	-21,564
2014	-20,508	197	-1,166	-21,477

表 ES3.6 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	20	8	65	63	110	398	387	105	117	65	259	540	612	417
甲烷總排放量	8,750	8,980	9,044	9,423	10,196	10,899	11,329	11,454	11,556	11,640	11,429	10,624	10,079	9,607
5.A 固體廢棄物處理	5,832	5,917	5,928	6,323	7,061	7,719	8,080	8,212	8,372	8,596	8,512	7,732	7,214	6,675
5.B 固體廢棄物之生物處理	11	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2
5.D 廢水處理與放流	2,907	3,062	3,115	3,100	3,135	3,179	3,249	3,241	3,184	3,042	2,916	2,891	2,864	2,930
氧化亞氮總排放量	296	285	298	311	313	334	337	337	321	329	331	340	348	353
5.B 固體廢棄物之生物處理	10	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2
5.C 廢棄物之焚化與露天燃燒	1	0	4	3	6	18	19	4	6	3	8	30	26	24
5.D 廢水處理與放流	285	284	294	307	307	316	318	332	315	324	322	310	321	327
廢棄物部門總排放量	9,066	9,273	9,407	9,798	10,619	11,631	12,053	11,896	1,993	12,035	12,018	11,504	11,039	10,377
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	512	348	470	562	443	154	208	115	61	4	91			
甲烷總排放量	8,926	8,350	7,699	7,192	6,535	5,906	5,304	4,863	4,508	4,152	3,835			
5.A 固體廢棄物處理	6,101	5,525	4,930	4,379	3,814	3,246	2,749	2,352	1,997	1,688	1,428			
5.B 固體廢棄物之生物處理	7	10	11	14	16	18	21	26	24	23	20			
5.D 廢水處理與放流	2,818	2,815	2,757	2,798	2,705	2,642	2,535	2,485	2,486	2,441	2,387			
氧化亞氮總排放量	343	350	351	360	328	327	337	344	339	326	339			
5.B 固體廢棄物之生物處理	6	9	10	13	15	16	19	23	22	20	18			
5.C 廢棄物之焚化與露天燃燒	23	27	30	30	21	9	11	7	4	0	5			
5.D 廢水處理與放流	314	314	310	318	293	302	307	313	314	306	315			
廢棄物部門總排放量	9,781	9,047	8,519	8,114	7,306	6,387	5,849	5,322	4,908	4,483	4,264			

第一章 簡介

1.1 國家溫室氣體排放清冊背景資訊

依據聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）第 4 條及第 12 條與京都議定書第 5 條規範，締約方有義務提交有關因應氣候變遷相關進展之資訊，供 UNFCCC 締約方會議檢視，中華民國（臺灣，以下簡稱臺灣）雖然不是 UNFCCC 締約方，但是向來恪盡地球村一份子的責任，積極為減緩地球暖化貢獻心力，而建置一份國家的溫室氣體清冊，估算溫室氣體排放量與移除量，是一個國家因應 UNFCCC 的基本義務，也是減緩地球暖化的基本工作之一。臺灣依據聯合國氣候變化政府間專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2006 年出版 2006 IPCC 國家溫室氣體排放清冊指南（2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories，以下簡稱 2006 IPCC 指南），並參考 IPCC 於 2000 年提出更新補充之「良好作法指南（Good Practice Guidance）」及不確定性管理（Uncertainty Management）」（以下簡稱 2000 GPG），與 2003 年「土地利用、土地利用變遷與林業良好作法指南」（以下簡稱 2003 LULUCF-GPG）編製國家溫室氣體排放清冊。清冊編製係基於臺灣的實際情況，包括排放源的界定、關鍵排放源的確定、活動數據和排放係數的可獲得性，其主要目的在於彙整溫室氣體清冊統計概況，說明臺灣溫室氣體排放趨勢，除了有利於未來溫室氣體統計工作的持續進行外，並能藉此向國際或臺灣各界介紹我國溫室氣體統計工作概況，期能獲得各方建議，不斷提昇我國溫室氣體清冊的品質。

1.2 清冊準備之組織制度安排

臺灣溫室氣體清冊準備工作之負責部會為行政院環境保護署，由其溫室氣體減量管理室執行各部門溫室氣體排放與吸收統計彙整、更新、維護、及管理溫室氣體清冊資料庫；負責相關活動數據的權責部會，則分別進

行清冊各部門的溫室氣體排放源及吸收匯的統計，部會分工如下：

1. 經濟部能源局：能源部門溫室氣體排放統計。
2. 經濟部工業局：工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計及彙整，含氟氣體排放統計則由行政院環境保護署逕行提供。
3. 行政院農業委員會：農業部門及土地利用、土地利用變化及林業部門溫室氣體排放源及吸收匯統計。
4. 行政院環境保護署：廢棄物部門溫室氣體排放統計，並彙整整體國家溫室氣體排放清冊。

此外，行政院環境保護署於 2012 年底邀集產官學及民間團體代表組成「國家溫室氣體排放清冊審議會」，作為臺灣推動國家溫室氣體排放清冊統計任務，及進行審議的單位，並每年彙編發布國家溫室氣體排放清冊報告。

1.3 清冊準備流程

臺灣國家溫室氣體排放清冊準備流程，如圖 1.3.1 所示。在活動數據統計部分主要由負責相關活動數據的權責部會，先進行清冊各部門的溫室氣體排放源及吸收匯的統計；執行溫室氣體清冊統計時，由各部門主動蒐集可靠的官方數據，資料來源包括行政院環境保護署、農業委員會，與經濟部能源局及工業局等相關部會，部分資料無法由官方數據提供者，例如工業製程及產品使用部門含氟溫室氣體排放，則進行產業調查，以獲得產業界各項製程的活動數據。

權責部會統計各部門溫室氣體清冊後，邀集各部會專家學者所建置的溫室氣體清冊審議小組，審視數據的正確性，並提供改善建議，經由部會修改後，再提送至國家溫室氣體排放清冊審議會進行審議，後續依溫室氣體減量及管理法每年提交。

目前臺灣已積極規劃溫室氣體國家體系（National System），以求能更精確掌握溫室氣體統計作業，優化各相關部會執行相關官方數據的統計與更新流程，期能持續並進一步改善溫室氣體清冊。

1 IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006.

2 IPCC, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000.

3 IPCC, Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry, 2003.

1.4 方法與資料來源

臺灣溫室氣體清冊主要是依照 UNFCCC 委託 IPCC 所制定的 2006 IPCC 指南而統計建置，研究人員蒐集各部門的活動數據 (Active Data) 及排放係數 (Emission Factor) 後，輸入依據 IPCC 指南所建置之溫室氣體統計電腦系統 (IPCC GHG Software) 進行計算，再將資料輸出至 UNFCCC 共同報告格式 (UNFCCC Common Reporting Format, UNFCCC CRF) 中，即成為臺灣溫室氣體清冊資料庫。以下簡述溫室氣體清冊之資料來源。

1. 能源部門

能源部門分類及燃料分類係與 2006 IPCC 指南的分類原則相同，其溫室氣體排放量計算方法，則按照數據分類方式有不同的計算級別，方法 1 (Tier 1) 的算法涉及能源的供需，方法 2、3 則以技術別數據為基礎進行計算；二氧化碳的計算方式係依據 2006 IPCC 指南的參考方法和部門方法，其他非二氧化碳的溫室氣體，則運用排放係數概估排放值。由於氣體的排放量取決於燃料類別、燃燒技術、操作情況、控制技術、維修及機具新舊等因素，需要詳細的技術別數據，因此並未列於第一級方法中。臺灣能源部門溫室氣體排放清冊統計資料之活動數據來源係依據經濟部能源局公布之能源平衡表 (新版)。此外，該部

門計算之碳排放因子 (Carbon Emission Factors, CEF)、碳氧化分率 (Fraction of Carbon Oxidised) 與碳積存分率 (Fraction of Carbon Stored) 則主要引用 2006 IPCC 指南之預設值 (Default Value)。

2. 工業製程及產品使用部門

臺灣工業製程及產品使用部門中各行業 / 生產之活動數據來源，係以政府統計公告資料為主，其活動數據具公信力、誤差率小並為延續性資料；若無政府公告資料，則以產業公會統計資料替代，或採用向業者進行實際調查統計結果。2000 至 2014 年半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業及冷凍冷藏空調設備等排放係數主要參考 2006 IPCC 指南提供之預設係數，或由產業以量測方法所建立的排放係數進行計算。此外，電力事業與鎂合金產業的含氟氣體排放量自 2005 年後才有完整數據得以列入統計。

3. 農業部門

臺灣農業部門之統計數據於 1990 至 1999 年間乃是引用自臺灣省政府農林廳的「臺灣農業年報」；自 2000 年至今，因主管機關受精省異動而更名，改引用行政院農業委員會編印的農業統計年報。至於排放係數以有研究報告之本土值為主，缺乏者則使用 2006 IPCC 指南之建議值。




圖 1.3.1 臺灣國家溫室氣體排放清冊準備程序

4. 土地利用、土地利用變化及林業部門

在估算林業部門溫室氣體時，由於臺灣森林資源及土地利用調查與林業統計資料不盡完整，因此僅依據 2006 IPCC 指南原則，以目前臺灣可取得及歸納之資料進行分類計算。相關係數則以臺灣的研究數值為主，如果臺灣無此數值，就使用 2006 IPCC 指南預設值。而「死有機質」在 2006 IPCC 指南中認為碳貯存量變化並不明顯，因此可假設為 0，即投入與損失相抵。土壤部分則因為臺灣尚在進行土壤分類及估算過程，目前資料不足而無法完成統計工作。

5. 廢棄物部門

廢棄物部門統計溫室氣體排放時，所引用的固體廢棄物處理、廢水、廢棄物焚化與露天燃燒及其他廢棄物管理之活動數據，係來自政府官方統計的環境統計年報、沼氣回收資料焚化爐資料、水污染源管制資料管理系統、事業廢棄物管制資訊網、下水道普及率及糧食平衡表所產生之排放。

1.5 主要排放源

臺灣溫室氣體清冊主要係針對能源活動、工業生產過程、農業活動、土地利用變化和林業、廢棄物處理的溫室氣體排放量進行估算，以下說明臺灣溫室氣體排放主要排放源。

1. 能源部門

有關使用能源排放溫室氣體的總量估算，包括燃料使用、能源生產、運輸、儲存及傳送過程所產生的溫室氣體，此部份包含生質能，但不包括國際空運及海運使用。

2. 工業製程及產品使用部門

工業製程及產品使用部門中產生之溫室氣體總排放量，需按國際工業標準分類詳細報告各製程排放的溫室氣體，但不包括能源使用的排放量。臺灣工業製程及產品使用部門部門涉及範圍相當廣泛，包括礦業（非金屬製品）、化學工業、金屬製程、燃料及溶劑使用的非能源產品、電子工業、破壞臭氧層物質之替代品使用、鹵烴（包括全氟碳化物與氫氟碳化物）及其他，共計五大類、四十八個行業/製程，大部份製程產生溫室氣體，少部份

製程則是因使用含一氧化碳及其他溫室氣體之原物料，高溫製造過程中產生二氧化碳及其他溫室氣體。

3. 農業部門

農業部門之排放，包括人類所飼養的畜禽類在腸胃發酵作用與糞尿的處理部分，以及因種植農作物所牽涉之排放，例如水稻田與其它農業土壤，與農作物殘體燃燒等產生之溫室氣體。而有關於燃料使用及廢水的溫室氣體排放，則在能源部門與廢棄物部門中計算。

4. 土地利用、土地利用變化及林業部門

由於土地利用變化及林業活動所排放與移除的溫室氣體，其統計項目包括森林及其他木質生物量的改變、森林及草原的變更、棄置的經營用地、土壤對二氧化碳的釋放與吸收及其他等五大類，內容涵蓋地上部生物量、地下部生物量、枯倒木、土壤內的有機碳等。

5. 廢棄物部門

廢棄物部門之溫室氣體排放包括固體廢棄物掩埋處理、廢水、廢棄物焚化及任何其他廢棄物管理之活動所產生之排放。任何石化產品焚化或分解所產生之二氧化碳排放應列入計算，但必須避免重複。此外，有機廢棄物處理及腐壞所產生之二氧化碳排放將不列入計算。對於廢棄物掩埋場及廢棄物焚化排放二氧化碳的部分，則包括固態廢棄物掩埋場甲烷排放、廢水處理甲烷排放與人類污水氧化亞氮之排放統計。

1.6 品質保證（Quality Assurance, QA）及品質控制（Quality Control, QC）計畫資訊

品質保證（Quality Assurance, QA）及品質控制（Quality Control, QC）是國家溫室氣體排放清冊準備工作極為重要的一環，如 1.3 節所述，各部會在其準備清冊程序過程，皆安排專家諮詢及同行專家審議之機制，而各部會之 QA/QC 計畫資訊，將在第 3 至 7 章中個別陳述。臺灣國家溫室氣體排放清冊現行的 QA/QC 作法，茲分成三個階段：各權責部會統計階段、國家清冊彙整階段、定稿與公布階段，其主要任務與品質管理屬性，請參見表 1.6.1。

1.7 一般不確定性

臺灣國家溫室氣體排放清冊統計關於估計不確定性 (Uncertainty) 的內容，僅參照 IPCC 2000 GPG 及 2003 LULUCF-GPG 指南中，預設評估方法與數據，進行說明與評估；目前，各部門仍無法整合評估部門排放量及吸收匯的不確定性值，整體國家溫室氣體排放清冊之不確定性值亦無法提供。

部分部會已經將不確定性管理列為其後續清冊改善計畫的重點，例如能源部門；各部會清冊不確定性評估情況，請參見後續章節的介紹與說明。

1.8 完整性概要評估

臺灣 2016 年國家溫室氣體排放清冊統計的範疇涵蓋 2006 IPCC 指南部門分類，包括能源部門、工業製程及產品使用部門、農業部門、土地利用、土地利用變化及林業部門、及廢棄物部門等，時間序列涵蓋 1990 至 2014 年，其中僅 1.B「燃料逸散性排放」、1.C「二氧化碳運輸與封

存」、3.G「石灰處理」、及 3.E「草原的焚燒」等四項應統計而未統計之次部門分類，部份估計排放量或移除量極低，不會對整體國家溫室氣體排放量統計有超過重大性原則之影響；臺灣國家溫室氣體排放清冊完整性已經相當高，相關概要評估請參見表 1.8.1 所示。

參考文獻

1. IPCC, 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventory, 2006.
2. IPCC, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000.
3. IPCC, Good Practice Guidance for Land Use, land-Use Change and Forestry, 2003.

表 1.6.1 臺灣國家溫室氣體排放清冊現行 QA/QC 作法

程序	任務	QA/QC
各權責部會統計階段	<ul style="list-style-type: none"> 按照 2006 年 IPCC 指南方法與表格統計。 活動數據引用自政府官方統計數據，遵循官方流程。 部會專家諮詢，確認相關方法與數據。 	QC
	<ul style="list-style-type: none"> 部會審議機制：執行同行專家審議。 部門清冊需經過政府程序後，方由各部會提報給行政院環境保護署。 	QA
國家清冊彙整階段	<ul style="list-style-type: none"> 各部會數據及清冊報告由行政院環境保護署（溫室氣體減量管理室）進行核校與檢查，必要時，再由各部會逕行修改。 	QC
	<ul style="list-style-type: none"> 國家溫室氣體審議會第一季審議：改善計畫檢討。 	QA
	<ul style="list-style-type: none"> 國家溫室氣體審議會第二季審議：各部門溫室氣體清冊數據及清冊報告審議。 	QC
	<ul style="list-style-type: none"> 國家溫室氣體審議會第三季審議：國家清冊數據確定。 	QC
定稿與公布階段	<ul style="list-style-type: none"> 國家溫室氣體審議會第四季審議：國家溫室氣體排放清冊報告。 	QA
	<ul style="list-style-type: none"> 行政院環境保護署將國家溫室氣體審議會定稿之國家溫室氣體排放清冊及其報告，提報行政院永續會核定，並向國民公布。 	QA

表 1.8.1 臺灣國家溫室氣體排放清冊完整性概要

IPCC 部門分類	時間序列完整性	次部門分類完整性
1. 能源部門	1990 至 2014 年	<ul style="list-style-type: none"> • 1.A.1.c.ii 油氣開採。 • 1.A.3.b.i 汽車 ~1.A.3.b.vi 尿素機觸媒。 • 1.A.3.e 其他運輸。 • 1.A.5 其他。 • 1.B 燃料逸散性排放。 • 1.C 二氧化碳運輸及儲存。 以上排放源，無調查數據，而未統計。
2. 工業製程及產品使用部門	1990 至 2014 年 (其中含氟氣體統計 1993 至 2014 年) / 含氟氣體基準年自 1995 年起，因此臺灣此部分數據仍屬完整。	<ul style="list-style-type: none"> • 2.C.5 鉛生產及 2.C.6 鋅生產之二氧化碳排放，因早期生產未進行調查，而未統計。 • 2.E.1 積體電路或半導體之 N₂O (1990 至 2005) 及含氟氣體排放 (1990 至 2000) 未進行調查，而未統計。 • 2.E.2 TFT 平面顯示器之氧化亞氮 (1990 至 2005) 及含氟氣體排放 (1990 至 1998)，在臺灣很少廠房，故不予計算。 • 2.F.1 冷凍及空調之氫氟碳化物排放，因早期 (1990 至 2002) HFC 冷媒使用量少，故不予計算；混合冷媒相關數據仍未含蓋在計算範圍內，尚待進一步調查及釐清。
3. 農業部門	1990 至 2014 年	<ul style="list-style-type: none"> • 3G 石灰處理之二氧化碳排放，缺乏直接統計資料，故未統計。 • 3.E. 草原的焚燒因臺灣鮮有此系統，亦無統計資料，故不予計算。
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	1990 至 2014 年	<ul style="list-style-type: none"> • 4.B 農地、4.C 牧草地、4.D 濕地、4.E 居住地、4.F 其他土地及 4.G 伐木產品，資訊仍有不足而尚未統計。
5. 廢棄物部門	1990 至 2014 年	無未統計之次部門

第二章 溫室氣體排放趨勢

2.1 總溫室氣體排放趨勢的描述與解釋

2.1.1 溫室氣體排放及移除

臺灣總溫室氣體（Greenhouse Gas, GHG）排放量自 1990 年 137,854 千公噸二氧化碳當量（不包括二氧化碳移除量），上升至 2014 年 283,489 千公噸二氧化碳當量（不包括二氧化碳移除量），排放量增加 105.65%，年平均成長率為 3.05%，而 2014 年較 2013 年增加 0.33%。淨溫室氣體排放量自 1990 年 114,468 千公噸二氧化碳當量，上升至 2014 年 262,012 千公噸二氧化碳當量，排放量增加 128.90%，年平均成長率為 3.51%，而 2014 年較 2013 年增加 0.39%，詳如圖 2.1.1 及表 2.1.1 所示。

2014 年二氧化碳為臺灣所排放溫室氣體中最大宗，其次為甲烷，再其次為氧化亞氮及含氟溫室氣體。2014 年二氧化碳排放量为 268,515 千公噸二氧化碳當量（不包括二氧化碳移除量），占總溫室氣體排放量 94.72%，在 1990 至 2014 年間，二氧化碳排放量成長 116.41%，年

平均成長率為 3.27%；2014 年二氧化碳移除量為 21,477 千公噸二氧化碳當量，1990 至 2014 年間移除量減少 8.16%，年平均成長率 -0.35%。2014 年甲烷排放量為 5,636 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放量 1.99%，1990 至 2014 年間排放量減少 48.21%，年平均成長率為 -2.70%，呈現負成長。2014 年氧化亞氮排放量為 4,503 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放量 1.59%，1990 至 2014 年間排放量增加 55.54%，年平均成長率為 1.86%。2014 年含氟溫室氣體排放量為 4,835 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放量 1.71%，自 1993 至 2014 年間增加 540.42%，年平均成長率為 9.25%。

2.1.2 人均二氧化碳排放

臺灣 2014 年燃料燃燒二氧化碳排放量為 251,038 千公噸二氧化碳當量（不包括二氧化碳移除量），占總溫室氣體排放量 88.55%。1990 年人均排放量約 5.4 公噸二氧化碳/人，至 2000 年為 9.5 公噸二氧化碳/人，2007 年達 11.2 公噸二氧化碳/人，為歷年最高點，2008 年降為 10.7 公噸二氧化碳/人，2009 年又再下降為 10.1 公噸二氧化碳/人，至 2011 年增加至 11.0 公噸二氧化碳/人，2013 年微幅下降至 10.7 公噸二氧化碳/人。詳如圖 2.1.2




圖 2.1.1 臺灣 1990 至 2014 年總溫室氣體排放量和移除量趨勢

表 2.1.1 臺灣 1990 至 2014 年各類溫室氣體排放量和移除量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體	溫暖化潛勢	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
二氧化碳	1	124,077	133,543	142,155	153,784	161,024	168,487	176,292	190,297	199,924
甲烷	25	10,882	11,157	11,206	11,603	12,364	13,108	13,539	13,559	13,579
氧化亞氮	298	2,895	3,148	3,142	3,212	3,254	3,323	3,246	3,282	3,225
氫氟碳化物	HFC-134a: 1,430 等	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083
全氟碳化物	PFC-14:7,390 等	NE								
六氟化硫	22,800	NE								
三氟化氮	17,200	NE								
二氧化碳移除量	1	-23,386	-21,490	-23,516	-23,493	-23,379	-23,233	-22,717	-22,899	-22,699
淨溫室氣體排放量		114,468	126,357	132,988	145,861	154,118	162,487	171,666	185,716	196,111
總溫室氣體排放量		137,854	147,847	156,504	169,354	177,497	185,720	194,383	208,615	218,810
溫室氣體	溫暖化潛勢	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
二氧化碳	1	207,599	227,119	229,840	237,857	248,233	256,453	263,492	272,689	276,249
甲烷	25	13,705	13,490	12,646	12,029	11,489	10,756	10,253	9,588	9,062
氧化亞氮	298	3,185	3,797	3,930	4,033	3,957	4,103	4,159	4,694	4,780
氫氟碳化物	HFC-134a: 1,430 等	1,609	2,319	2,619	2,216	2,397	2,451	1,070	987	1,093
全氟碳化物	PFC-14:7,390 等	3	13	2,939	4,143	4,198	4,341	3,070	3,264	2,972
六氟化硫	22,800	116	120	746	3,914	4,385	5,193	4,683	3,590	3,114
三氟化氮	17,200	11	10	235	398	540	659	726	650	759
二氧化碳移除量	1	-22,550	-22,476	-21,583	-22,415	-22,305	-22,196	-21,918	-21,861	-21,650
淨溫室氣體排放量		203,678	224,392	231,372	242,175	252,893	261,759	265,536	273,599	276,379
總溫室氣體排放量		226,228	246,868	252,955	264,590	275,198	283,955	287,454	295,460	298,029
溫室氣體	溫暖化潛勢	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
二氧化碳	1	263,531	248,714	266,607	272,452	267,894	267,687	268,515		
甲烷	25	8,344	7,682	7,092	6,658	6,321	5,976	5,636		
氧化亞氮	298	4,370	4,531	4,937	4,828	4,741	4,524	4,503		
氫氟碳化物	HFC-134a: 1,430 等	1,046	980	934	1,016	869	981	1,010		
全氟碳化物	PFC-14:7,390 等	1,682	1,143	1,354	1,365	725	929	1,298		
六氟化硫	22,800	2,644	2,176	2,155	1,755	1,647	1,722	1,355		
三氟化氮	17,200	166	538	219	381	349	734	1,171		
二氧化碳移除量	1	-21,631	-18,911	-21,413	-21,470	-21,572	-21,564	-21,477		
淨溫室氣體排放量		260,152	246,854	261,884	266,984	260,973	260,989	262,012		
總溫室氣體排放量		281,783	265,765	283,297	288,454	282,545	282,553	283,489		

說明：1. 溫暖化潛勢 (Global Warming Potential, 以下簡稱 GWP) 引用 IPCC 第四次評估報告。
2. NE (未估計)，指對現有排放量和移除量沒有估計。

所示。1991 至 2013 年期間人均排放量年均成長率約為 2.92%，其中，2009 年較 2008 年減少 5.40%，2010 年與 2011 年分別增加 6.67% 與 1.87%，而 2012 年與 2013 年分別減少 2.19% 與 0.09%。

2.1.3 二氧化碳密集度

臺灣 1990 年二氧化碳排放密集度（即每單位 GDP 之二氧化碳排放）為 0.0228 二氧化碳 / 元，2014 年為 0.0162 公斤二氧化碳 / 元，減少 28.95%，反映我國能源效率逐年改善之趨勢。詳如圖 2.1.3 所示。




圖 2.1.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒二氧化碳和人均排放趨勢
資料來源：人口資料來自行政院主計總處¹




圖 2.1.3 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放密集度趨勢
資料來源：GDP 資料來自行政院主計總處

1 行政院主計總處網站。http://www.dgbas.gov.tw

2.2 各種溫室氣體排放趨勢的描述與解釋

2.2.1 二氧化碳

能源部門、工業製程及產品使用部門、農業部門和廢棄物部門係臺灣二氧化碳的主要排放源，表 2.2.1 列有臺灣各部門 1990 至 2014 年二氧化碳排放量與移除量清單，排放趨勢則如圖 2.2.1 所示。臺灣 1990 年二氧化碳排放量為 124,077 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 268,515 千公噸二氧化碳當量，增加 116.41%，平均成長率為 3.27%；其中 2014 年能源部門占 93.49%，包括能源產業為 61.69%、製造業與營造業為 15.03%、運輸為 13.01% 及其他部門為 3.76%，另工業製程及產品使用部門占 6.46%、農業部門占 0.02% 及廢棄物部門占 0.03%。2014 年較 2013 年排放量增加 0.31%，主要為能源部門之其他部門（農林漁牧業、服務業）、能源產業、運輸與工業製程及生產使用部門之化學工業增加排放；土地利用、土地利用變化及林業活動係二氧化碳的移除量，1990 年臺灣二氧化碳移除量為 23,386 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 21,477 千公噸二氧化碳當量，減少 8.16%。

2.2.2 甲烷

臺灣主要甲烷排放來源係來自於廢棄物部門、農業部門、能源部門與工業製程及產品使用部門。表 2.2.2 列有臺灣各部門 1990 至 2014 年甲烷排放量清單，排放趨勢則如圖 2.2.2 所示。臺灣 1990 年甲烷排放量為 10,882 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 5,636 千公噸二氧化碳當量，減少 48.21%，平均成長率為 -2.70%。2014 年較 2013 年排放量減少 5.69%，其中 2014 年甲烷排放量以廢棄物部門占 68.04% 最多、農業部門占 22.82%、能源部門占 8.48%、工業製程及產品使用部門占 0.66%。1990 至 2014 年間廢棄物部門減少 56.17%，為比例最大者，農業部門則減少 31.33%；其中廢棄物部門於 1999 年間甲烷排放量開始逐年減少，主要是廢棄物處理改以資源回收與焚化，導致垃圾掩埋量大幅下降所致，由於直到 2008 年垃圾掩埋量仍每年持續下降，使得 1990 至 2014 年垃圾掩埋場甲烷排放量平均成長率為 -5.69%，其主要因與推動垃圾減量，以及推動廢棄物零掩埋、沼氣處理與鼓勵沼氣回收發電等政策有關，另外，家庭污水處理與放流則由於生活污水接管率逐年增加，而使得甲烷排放量從 1990 年至 2014 年減少

17.90%。農業部門溫室氣體從 1990 年起呈逐年下降，主要係與三段式禽畜糞尿處理及耕地面積減少有關。

2.2.3 氧化亞氮

氧化亞氮排放來源為農業部門、工業製程及產品使用部門與能源部門，與廢棄物部門也有少量排放。農業部門氧化亞氮排放係以農業土壤排放為主，排放來源包括農地化學肥料使用、動物排泄物、固氮作物、農作物殘體等。而工業製程及產品使用部門近年氧化亞氮排放逐年增加，係以化學工業及電子工業為主，排放來源包括己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產、硝酸生產、積體電路或半導體及 TFT 平面顯示器等。臺灣 1990 年氧化亞氮排放量為 2,895 千公噸二氧化碳當量，2014 年臺灣氧化亞氮排放量約為 4,503 千公噸二氧化碳當量，其中工業製程及產品使用部門排放約 1,514 千公噸二氧化碳當量（占 33.62%）、農業部門排放約 1,427 千公噸二氧化碳當量（占 31.69%）、能源部門排放約 1,224 千公噸二氧化碳當量（占 27.17%）、廢棄物部門排放約 339 千公噸二氧化碳當量（占 7.52%），詳如表 2.2.3 所示。臺灣 1990 至 2014 年各部門氧化亞氮的排放趨勢如圖 2.2.3 所示，就氧化亞氮總排放量而言，1990 至 2014 年排放量增加 55.54%，平均成長率 1.86%，相同期間下，以農業土壤排放量減少最多達 26.36%，平均成長率為 -1.27%，係與行政院農業委員會實施休耕及推廣合理化施肥有關。

2.2.4 氫氟碳化物

臺灣氫氟碳化物排放來源係為工業製程及產品使用部門，包括化學工業之含氟化合物生產為最大比例、其次為半導體、冷凍空調（不含混合氫氟碳化物冷媒）及滅火器。氫氟碳化物排放量 2014 年為 1,010 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放的 0.36%，2014 年較 1993 增加 33.82%，平均成長率為 1.40%，2014 年較 2013 年增加 2.97%，如圖 2.2.4 及表 2.2.4 所示。臺灣唯一生產氟氯烴（Hydrochlorofluorocarbons, HCFCs）廠商臺灣塑膠工業股份有限公司仁武廠在 2004 年關閉後，使得氫氟碳化物排放量自 2004 年 2,451 千公噸二氧化碳當量開始下降，2005 年為 1,070 千公噸二氧化碳當量，至 2011 年起因應蒙特婁議定書之管制時程，臺灣冷凍空調改以其他替代品，故 HFC-32、HFC-410A、HFC-404A 使用量大，導致其排放量上升。

表 2.2.1 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放量和移除量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	109,491	118,414	126,056	135,212	142,982	150,437	158,104	170,599	181,294	190,260	209,364	213,039	221,092	230,680
1.A.1. 能源工業	49,118	55,403	58,795	66,180	70,862	76,800	81,519	92,436	100,959	107,029	122,157	126,437	130,556	140,966
1.A.2. 製造業與營造業	30,154	31,656	33,121	33,405	34,380	34,996	36,051	37,818	38,551	39,854	43,064	42,158	44,936	43,564
1.A.3. 運輸	19,646	20,888	24,033	26,103	27,540	28,822	29,801	30,536	31,844	32,772	33,207	33,246	34,542	34,509
1.A.4. 其他	10,572	10,466	10,107	9,523	10,200	9,820	10,733	9,809	9,940	10,605	10,937	11,198	11,058	11,641
1.A.4.a 服務業	3,621	3,529	2,989	2,490	3,018	2,445	3,175	2,483	2,948	3,155	3,220	3,562	3,493	3,961
1.A.4.b 住宅	4,005	4,238	4,446	4,359	4,461	4,597	4,754	4,851	4,952	5,410	5,354	5,181	5,107	4,869
1.A.4.c 農林漁牧	2,946	2,700	2,672	2,675	2,721	2,777	2,805	2,475	2,041	2,040	2,362	2,455	2,459	2,811
2. 工業製程及產品使用部門	14,424	14,975	15,895	18,378	17,797	17,501	17,651	19,460	18,386	17,156	17,365	16,168	16,059	17,053
2.A 礦業（非金屬製程）	10,584	10,698	11,854	13,879	13,259	12,766	12,645	13,394	11,564	10,746	10,486	9,974	10,648	10,270
2.B 化學工業	563	539	565	609	762	850	992	1,020	1,003	1,075	1,143	1,232	1,313	1,384
2.C 金屬工業	3,275	3,735	3,474	3,888	3,774	3,884	4,013	5,045	5,817	5,333	5,734	4,960	4,096	5,397
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 農業部門	142	146	139	131	135	151	151	134	127	118	131	94	93	82
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-23,386	-21,490	-23,516	-23,493	-23,379	-23,233	-22,717	-22,899	-22,699	-22,550	-22,476	-21,583	-22,415	-22,305
5. 廢棄物部門	20	8	65	63	110	398	387	105	117	65	259	540	612	417
淨二氧化碳排放量	100,691	112,053	118,639	130,291	137,645	145,254	153,575	167,398	177,225	185,049	204,643	208,257	215,442	225,928
總二氧化碳排放量	124,077	133,543	142,155	153,784	161,024	168,487	176,292	190,297	199,924	207,599	227,119	229,840	237,857	248,233
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	238,517	245,204	252,070	255,871	244,635	232,204	248,279	253,449	248,639	249,110	251,038			
1.A.1. 能源工業	146,638	153,820	160,602	164,426	158,464	148,936	159,910	163,547	161,112	160,239	165,646			
1.A.2. 製造業與營造業	43,978	42,660	43,947	45,868	42,391	39,558	43,663	44,898	43,256	44,564	40,361			
1.A.3. 運輸	35,859	36,844	36,769	35,415	33,394	33,711	34,824	35,293	34,502	34,472	34,930			
1.A.4. 其他	12,041	11,880	10,752	10,162	10,387	9,999	9,881	9,712	9,769	9,835	10,101			
1.A.4.a 服務業	4,118	4,230	4,248	4,192	4,201	4,226	4,203	3,961	3,958	4,177	4,411			
1.A.4.b 住宅	4,947	5,023	4,857	4,879	4,820	4,775	4,737	4,814	4,770	4,649	4,616			
1.A.4.c 農林漁牧	2,977	2,626	1,646	1,091	1,365	998	941	937	1,041	1,009	1,074			
2. 工業製程及產品使用部門	17,340	17,877	20,089	19,758	18,396	16,300	18,067	18,835	19,139	18,528	17,346			
2.A 礦業（非金屬製程）	10,691	11,257	11,014	10,369	9,289	8,467	8,616	9,577	9,333	9,866	8,728			
2.B 化學工業	1,485	1,552	1,530	1,654	1,457	1,514	1,599	1,637	1,503	1,572	1,603			
2.C 金屬工業	5,162	5,066	7,544	7,733	7,648	6,317	7,851	7,620	8,301	7,088	7,013			
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3. 農業部門	84	62	59	57	57	55	54	53	55	45	40			
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-22,196	-21,918	-21,861	-21,650	-21,631	-18,911	-21,413	-21,470	-21,572	-21,564	-21,477			
5. 廢棄物部門	512	348	470	562	443	154	208	115	61	4	91			
淨二氧化碳排放量	234,257	241,574	250,827	254,599	241,900	229,803	245,194	250,982	246,322	246,123	247,038			
總二氧化碳排放量	256,453	263,492	272,688	276,249	263,531	248,714	266,607	272,452	267,894	267,687	268,515			




圖 2.2.1 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳排放量趨勢




圖 2.2.2 臺灣 1990 至 2014 年甲烷排放量趨勢

表 2.2.2 臺灣 1990 至 2014 年甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	254	270	293	310	328	344	359	370	390	409	430	435	447	465
2. 工業製程及產品使用部門	5	7	6	7	8	10	11	12	10	12	14	23	24	22
3. 農業部門	1,873	1,901	1,864	1,863	1,832	1,855	1,839	1,723	1,622	1,644	1,618	1,565	1,479	1,394
3.A 畜禽腸道發酵	670	731	738	775	789	822	822	732	674	694	692	660	636	626
3.B 畜禽糞尿管理	206	236	234	240	247	259	266	219	192	205	210	201	194	192
3.C 水稻種植	960	908	845	825	775	767	745	765	751	738	702	689	637	567
3.F 作物殘體燃燒	38	25	48	22	21	7	7	7	6	7	14	15	13	9
5. 廢棄物部門	8,750	8,980	9,044	9,423	10,196	10,899	11,329	11,454	11,556	11,640	11,429	10,624	10,079	9,607
5.A 固體廢棄物處理	5,832	5,917	5,928	6,323	7,061	7,719	8,080	8,212	8,372	8,596	8,512	7,732	7,214	6,675
5.B 固體廢棄物之生物處理	11	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2
5.D 廢水處理與放流	2,907	3,062	3,115	3,100	3,135	3,179	3,249	3,241	3,184	3,042	2,916	2,891	2,864	2,930
總計	10,882	11,157	11,206	11,603	12,364	13,108	13,539	13,559	13,579	13,705	13,490	12,646	12,029	11,489
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	482	488	488	491	473	462	478	485	478	482	478			
2. 工業製程及產品使用部門	28	29	33	39	37	33	36	9	35	38	37			
3. 農業部門	1,320	1,387	1,368	1,341	1,299	1,281	1,274	1,301	1,300	1,304	1,286			
3.A 畜禽腸道發酵	614	623	614	609	584	571	578	590	583	579	566			
3.B 畜禽糞尿管理	193	195	195	185	180	175	176	180	172	166	164			
3.C 水稻種植	505	561	551	543	529	530	514	526	540	555	552			
3.F 作物殘體燃燒	8	8	8	5	6	5	5	5	5	3	4			
5. 廢棄物部門	8,926	8,350	7,699	7,192	6,535	5,906	5,304	4,863	4,508	4,152	3,835			
5.A 固體廢棄物處理	6,101	5,525	4,930	4,379	3,814	3,246	2,749	2,352	1,997	1,688	1,428			
5.B 固體廢棄物之生物處理	7	10	11	14	16	18	21	26	24	23	20			
5.D 廢水處理與放流	2,818	2,815	2,757	2,798	2,705	2,642	2,535	2,485	2,486	2,441	2,387			
總計	10,756	10,253	9,588	9,062	8,344	7,682	7,092	6,658	6,321	5,976	5,636			

表 2.2.3 臺灣 1990 至 2014 年氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	537	578	652	703	739	772	816	861	912	961	1,047	1,070	1,124	1,175
1.A.1 能源產業	138	158	183	207	221	239	267	302	332	364	432	453	475	529
1.A.2 製造業與營造業	91	94	100	99	101	101	105	107	111	113	125	127	137	133
1.A.3 運輸	291	309	353	382	402	418	428	438	456	469	475	475	496	495
1.A.4 其他部門	17	17	15	14	15	14	16	14	14	14	15	16	16	17
2. 工業製程及產品使用部門	166	352	325	301	318	345	186	374	383	312	625	800	833	833
3. 農業部門	1,897	1,933	1,867	1,897	1,883	1,872	1,907	1,710	1,609	1,583	1,794	1,720	1,729	1,597
3.B 畜禽糞尿處理	48	50	52	54	59	61	67	70	71	72	73	71	71	71
3.D 農業土壤	1,837	1,876	1,800	1,837	1,818	1,808	1,838	1,638	1,536	1,509	1,717	1,644	1,655	1,524
3.F 農作物殘體燃燒	12	8	15	7	7	2	2	2	2	2	4	5	4	3
5. 廢棄物部門	296	285	298	311	313	334	337	337	321	329	331	340	348	353
總計	2,895	3,148	3,142	3,212	3,254	3,323	3,246	3,282	3,225	3,185	3,797	3,930	4,033	3,957
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	1,215	1,251	1,283	1,294	1,238	1,200	1,238	1,253	1,232	1,227	1,224			
1.A.1 能源產業	549	576	604	624	604	574	581	583	578	569	568			
1.A.2 製造業與營造業	135	132	137	149	139	131	144	151	144	148	138			
1.A.3 運輸	513	527	527	508	481	483	500	507	498	498	504			
1.A.4 其他部門	18	17	15	13	14	13	12	12	12	12	12			
2. 工業製程及產品使用部門	834	960	1,432	1,531	1,290	1,457	1,834	1,762	1,674	1,539	1,514			
3. 農業部門	1,710	1,598	1,629	1,595	1,514	1,547	1,528	1,469	1,497	1,432	1,427			
3.B 畜禽糞尿處理	69	71	72	71	72	71	71	71	71	71	73			
3.D 農業土壤	1,639	1,524	1,554	1,522	1,440	1,474	1,456	1,396	1,424	1,359	1,353			
3.F 農作物殘體燃燒	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	1			
5. 廢棄物部門	343	350	351	360	328	327	337	344	339	326	339			
總計	4,103	4,159	4,694	4,780	4,370	4,531	4,937	4,828	4,741	4,524	4,503			




圖 2.2.3 臺灣 1990 至 2014 年氧化亞氮排放量趨勢




圖 2.2.4 臺灣 1993 至 2014 年氫氟碳化物排放量趨勢

2.2.5 全氟碳化物

2014 年臺灣全氟碳化物排放量為 1,298 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放的 0.46%，2014 年較 2013 年增加 39.82%，如圖 2.2.5 及表 2.2.5 所示。早期積體電路或半導體尚未大量生產，有關全氟碳化物排放量相關資料不齊全，故無法估算其排放量。至 2004 年後由於臺灣半導體產業協會（Taiwan Semiconductor Industrial Association, TSIA）配合政府推動自願減量，包括半導體業、光電等產業導入安裝尾氣處理設施，同時以量測程序進行製程改善，使得全氟碳化物排放量逐年下降。

2.2.6 六氟化硫

2014 年臺灣六氟化硫排放量為 1,355 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放的 0.48%，2014 年較 2013 年減少 21.28%，如圖 2.2.6 及表 2.2.6 所示。六氟化硫排放量自 2002 年起逐年上升，其原因為 TFT 平面顯示器、電力設備及鎂生產使用量增加，以 2004 年 5,193 千公噸二氧化碳當量為最高排放量，而後因六氟化硫使用量減少，導致其排放量減自 2014 年 1,355 千公噸二氧化碳當量，約減少 -73.90%。

2.2.7 三氟化氮

2014 年臺灣三氟化氮排放量為 1,171 千公噸二氧化碳當量，占總溫室氣體排放的 0.41%，2014 年較 2013

年增加 59.66%，如圖 2.2.7 及表 2.2.6 所示。三氟化氮排放量自 2001 年起逐年上升，其原因為半導體使用量增加。至 2007 年因半導體使用量大幅驟減，導致其排放量自 2007 年 759 千公噸二氧化碳當量，減自 2008 年 166 千公噸二氧化碳當量，2012 年後，因半導體及 TFT 平面顯示器使用量增加，使得三氟化氮排放量自 2012 年 349 千公噸二氧化碳當量上升至 2014 年 1,171 千公噸二氧化碳當量。

2.3 各排放源溫室氣體排放趨勢的描述與解釋

就部門別而言，2014 年能源部門溫室氣體排放量為 252,739 千公噸二氧化碳當量（不計土地利用變化及林業移除量），占臺灣溫室氣體總排放量的 89.15%，工業製程及產品使用部門為 23,733 千公噸二氧化碳當量（不計土地利用變化及林業移除量），占 8.37%，農業部門為 2,753 千公噸二氧化碳當量（不計土地利用變化及林業移除量），占 0.97%，廢棄物部門為 4,264 千公噸二氧化碳當量（不計土地利用變化及林業移除量），占 1.50%。2014 年土地利用、土地利用變化及林業部門之移除量則為 21,477 千公噸二氧化碳當量。臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放趨勢如圖 2.3.1 及表 2.3.1 所示。

2.3.1 能源部門

能源部門排放之溫室氣體種類包括二氧化碳、甲

表 2.2.4 臺灣 1990 至 2014 年氫氟碳化物生產排放量

（單位：千公噸二氧化碳當量）

溫室氣體排放源	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
2.B 化學工業	NO	NO	NO	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,567	2,157	1,937
2.E 電子工業	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	51	59	59
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	401
總計	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,619	2,216	2,397
溫室氣體排放源	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
2.B 化學工業	1,937	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
2.E 電子工業	59	73	91	171	118	168	164	134	86	169	182			
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	682	996	896	922	928	812	770	881	783	812	828			
總計	2,451	1,070	987	1,093	1,046	980	934	1,016	869	981	1,010			

說明：NO（未發生），代表臺灣該分類項目無生產或使用，即國內唯一氟氯烴廠僅於 1993 至 2004 年生產。
NE（未估計），指對現有排放量和移除量沒有估計。

烷及氧化亞氮，該部門溫室氣體排放總量歷年來呈現上升趨勢，至 2008 年首度呈現下降趨勢，2012 年又再度下降，2014 年較 2013 年成長 0.77%，詳如表 2.3.2 和圖 2.3.2 所示。2014 年能源部門之溫室氣體總排放為 252,739 千公噸二氧化碳當量約，占臺灣溫室氣體總排放量的 89.15%，其中 1.A.1「能源產業」為 166,304 公噸二氧化碳當量，占能源部門之總溫室氣體排放量 65.8%，1.A.2「製造業與營造業」為 40,576 千公噸二氧化碳當量（占 16.05%），1.A.3「運輸」為 35,721 千公噸二氧化

碳當量（占 14.13%），1.A.4「其他部門（包括服務業、住宅及農林漁牧業）」為 10,139 千公噸二氧化碳當量（占 4.01%）。1990 至 2014 年間，能源部門之成長率為 129.18%，年平均成長率為 3.52%，其中 1.A.1「能源產業」溫室氣體排放量增加 237.45%，年平均成長率為 5.20%；1.A.2「製造業與營造業」增加 33.95%，年平均成長率為 1.23%；1.A.3「運輸」增加 77.81%，年平均成長率為 2.43%；1.A.4「其他部門」減少 4.52%，年平均成長率為 -0.19%。




圖 2.2.5 臺灣 1999 至 2014 年全氟碳化合物排放量趨勢

表 2.2.5 臺灣 1990 至 2014 年全氟碳化合物排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
2.E.1 積體電路或半導體	NE	NE	3	13	2,933	4,077	4,173							
2.E.2 TFT 平面顯示器	NE	NE	NE	NE	6	65	25							
總計	NE	NE	3	13	2,939	4,143	4,198							
溫室氣體排放源	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
2.E.1 積體電路或半導體	4,327	3,043	3,211	2,933	1,657	1,126	1,322	1,335	691	899	1,273			
2.E.2 TFT 平面顯示器	14	27	53	39	25	17	32	30	33	30	26			
總計	4,341	3,070	3,264	2,972	1,682	1,143	1,354	1,365	725	929	1,298			

說明：NE（未估計），指對現有排放量和移除量沒有估計。




圖 2.2.6 臺灣 1999 至 2014 年六氟化硫排放量趨勢

表 2.2.6 臺灣 1990 至 2014 年六氟化硫排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
2.C 金屬工業	NE	NE	1,027	1,027										
2.E 電子工業	NE	116	120	746	944	1,415								
2.G 其他產品之製造與使用	NE	NE	1,943	1,943										
總計	NE	116	120	746	3,914	4,385								
溫室氣體排放源	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
2.C 金屬工業	1,357	1,063	770	440	144	235	212	134	109	55	56			
2.E 電子工業	1,783	2,117	2,050	1,721	1,605	1,239	1,648	1,339	1,352	1,524	1,276			
2.G 其他產品之製造與使用	2,053	1,503	770	953	895	703	295	282	186	142	24			
總計	5,193	4,683	3,590	3,114	2,644	2,176	2,155	1,755	1,647	1,722	1,355			

說明：NE (未估計)，指對現有排放量和移除量沒有估計。




圖 2.2.7 臺灣 1999 至 2014 年三氟化氮排放量趨勢

表 2.2.7 臺灣 1990 至 2014 年三氟化氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
2.E.1 積體電路或半導體	NE	11	10	202	359	455								
2.E.2 TFT 平面顯示器	NE	33	39	86										
總計	NE	11	10	235	398	540								
溫室氣體排放源	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
2.E.1 積體電路或半導體	587	623	512	590	136	473	156	306	295	687	1,075			
2.E.2 TFT 平面顯示器	72	103	138	170	30	65	62	75	54	46	96			
總計	659	726	650	759	166	538	219	381	349	734	1,171			

說明：NE（未估計），指對現有排放量和移除量沒有估計。




圖 2.3.1 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量和移除量趨勢

表 2.3.1 臺灣 1990 至 2014 年各部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. 能源部門	110,281	119,261	127,001	136,225	144,050	151,553	159,279	171,829	182,597	191,630	210,842	214,544	222,663	232,320
2. 工業製程及產品使用部門	14,595	15,333	16,227	19,441	18,977	18,658	19,154	21,323	20,862	19,218	20,465	23,529	27,586	29,428
3. 農業部門	3,911	3,980	3,869	3,890	3,850	3,878	3,897	3,567	3,359	3,345	3,543	3,379	3,301	3,074
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-23,386	-21,490	-23,516	-23,493	-23,379	-23,233	-22,717	-22,899	-22,699	-22,550	-22,476	-21,583	-22,415	-22,305
5. 廢棄物部門	9,066	9,273	9,407	9,798	10,619	11,631	12,053	11,896	11,993	12,035	12,018	11,504	11,039	10,377
淨溫室氣體排放量	114,468	126,357	132,988	145,861	154,118	162,487	171,666	185,716	196,111	203,678	224,392	231,372	242,175	252,893
總溫室氣體排放量	137,854	147,847	156,504	169,354	177,497	185,720	194,383	208,615	218,810	226,228	246,868	252,955	264,590	275,198
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1. 能源部門	240,214	246,944	253,841	257,656	246,345	233,867	249,994	255,187	250,349	250,819	252,739			
2. 工業製程及生產使用部門	30,846	28,416	30,044	29,266	25,261	22,628	24,597	25,122	24,437	24,469	23,733			
3. 農業部門	3,114	3,047	3,056	2,993	2,870	2,884	2,856	2,823	2,851	2,781	2,753			
4. 土地利用、土地利用變化及林業部門	-22,196	-21,918	-21,861	-21,650	-21,631	-18,911	-21,413	-21,470	-21,572	-21,564	-21,477			
5. 廢棄物部門	9,781	9,047	8,519	8,114	7,306	6,387	5,849	5,322	4,908	4,483	4,264			
淨溫室氣體排放量	261,759	265,536	273,599	276,379	260,152	246,854	261,884	266,984	260,973	260,989	262,012			
總溫室氣體排放量	283,955	287,454	295,460	298,029	281,783	265,765	283,297	288,454	282,545	282,553	283,489			

2.3.2 工業製程及產品使用部門

工業製程及產品使用部門排放之溫室氣體種類包含二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、全氟碳化物、氫氟碳化物、六氟化硫及三氟化氮等七種，該部門歷年溫室氣體排放量詳如表 2.3.3 和圖 2.3.3。2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體總排放量 23,733 千公噸二氧化碳當量，約占臺灣溫室氣體總排放量的 8.37%，其中 2.A「礦業（非金屬製品）」二氧化碳排放占工業製程部門溫室氣體排放的 36.78%，所占比例最大，其次為 2.C「金屬工業」二氧化碳排放占 29.55%、2.E「電子工業」六氟化硫排放占 5.38%。1990 至 2014 年間，工業製程及產品使用排放量增加 62.61%，年平均成長率為 2.05%，其中以 2004 年 30,846 千公噸二氧化碳當量，成為歷年排放量最多的一年，約占臺灣溫室氣體總排放量的 10.86%，2005 年後溫室氣體排放量即逐年下降，至 2010 年因金屬工業之鋼鐵生產二氧化碳排放、TFT 平面顯示器六氟化硫排放及半導體全氟碳化物排放使得工業製程及產品使用部門溫室氣體排放又有上升趨勢，2014 年因 TFT 平面顯示器及電力設備使用六氟化硫、化學工業之己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產產生氧化亞氮排放及礦業（非金屬製品）之水泥生產產生二氧化碳排放，使得工業製程及產品使用排放量增加。

2.3.3 農業部門

農業部門排放之溫室氣體種類包含甲烷、氧化亞氮及少量二氧化碳。該部門溫室氣體排放量逐年呈現遞減的趨勢，2014 年的 2,753 千公噸二氧化碳當量，約占臺灣溫室氣體總排放量的 0.97%，與 1990 年相比較減少約 29.61%，年平均成長率為 -1.45%，詳如圖 2.3.4 和表 2.3.5 所示。臺灣 2014 年農業部門溫室氣體排放較 2013 年減少約 1.01%，其中 2014 年排放以 3.D「農業土壤」排放氧化亞氮占 49.15%，3.A「畜禽腸胃發酵」甲烷占 20.57%，3.C「水稻種植」甲烷占 20.07%，3.B「畜禽糞尿處理」甲烷占 5.94%，3.B「畜禽糞尿處理」氧化亞氮占 2.65%，3.H「尿素使用」排放二氧化碳 1.45%，3.F「農作物殘體燃燒」甲烷占 0.13% 及 3.F「農作物殘體燃燒」氧化亞氮占 0.04%。

2.3.4 土地利用、土地利用變化及林業部門

土地利用、土地利用變化及林業部門移除之溫室氣體以二氧化碳為主，歷年之移除量呈現略有起伏增減的趨勢，每年的移除量變化並不大，主要係由森林資源年生長所增加的移除量為主，造林所增加的移除量及因森林干擾所減少的移除量較少。1990 至 2014 年間森林資源整體之年移除量變化，其中 1991 年及 2001 年係因森林火災及颱風等災害造成碳損失量高，其年碳移除量分




圖 2.3.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門溫室氣體排放量趨勢

表 2.3.2 臺灣 1990 至 2014 年能源部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	109,491	118,414	126,056	135,212	142,982	150,437	158,104	170,599	181,294	190,260	209,364	213,039	221,092	230,680
1.A.1. 能源工業	49,118	55,403	58,795	66,180	70,862	76,800	81,519	92,436	100,959	107,029	122,157	126,437	130,556	140,966
1.A.2. 製造業與營造業	30,154	31,656	33,121	33,405	34,380	34,996	36,051	37,818	38,551	39,854	43,064	42,158	44,936	43,564
1.A.3. 運輸	19,646	20,888	24,033	26,103	27,540	28,822	29,801	30,536	31,844	32,772	33,207	33,246	34,542	34,509
1.A.4. 其他	10,572	10,466	10,107	9,523	10,200	9,820	10,733	9,809	9,940	10,605	10,937	11,198	11,058	11,641
甲烷總排放量	254	270	293	310	328	344	359	370	390	409	430	435	447	465
1.A.1. 能源工業	26	29	28	31	33	38	37	44	50	57	66	67	68	78
1.A.2. 製造業與營造業	46	48	51	51	52	52	53	54	57	57	64	66	71	70
1.A.3. 運輸	152	163	187	202	216	228	239	245	257	266	270	272	278	287
1.A.4. 其他	30	29	28	26	28	27	29	26	27	28	29	30	30	32
氧化亞氮總排放量	537	578	652	703	739	772	816	861	912	961	1,047	1,070	1,124	1,175
1.A.1. 能源工業	138	158	183	207	221	239	267	302	332	364	432	453	475	529
1.A.2. 製造業與營造業	91	94	100	99	101	101	105	107	111	113	125	127	137	133
1.A.3. 運輸	291	309	353	382	402	418	428	438	456	469	475	475	496	495
1.A.4. 其他	17	17	15	14	15	14	16	14	14	14	15	16	16	17
能源部門總排放量	110,281	119,261	127,001	136,225	144,050	151,553	159,279	171,829	182,597	191,630	210,842	214,544	222,663	232,320
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	238,517	245,204	252,070	255,871	244,635	232,204	248,279	253,449	248,639	249,110	251,038			
1.A.1. 能源工業	146,638	153,820	160,602	164,426	158,464	148,936	159,910	163,547	161,112	160,239	165,646			
1.A.2. 製造業與營造業	43,978	42,660	43,947	45,868	42,391	39,558	43,663	44,898	43,256	44,564	40,361			
1.A.3. 運輸	35,859	36,844	36,769	35,415	33,394	33,711	34,824	35,293	34,502	34,472	34,930			
1.A.4. 其他	12,041	11,880	10,752	10,162	10,387	9,999	9,881	9,712	9,769	9,835	10,101			
甲烷總排放量	482	488	488	491	473	462	478	485	478	482	478			
1.A.1. 能源工業	83	84	89	95	95	85	89	89	90	91	89			
1.A.2. 製造業與營造業	71	69	73	79	75	70	78	82	79	82	77			
1.A.3. 運輸	295	303	298	289	276	281	285	288	284	284	286			
1.A.4. 其他	33	32	29	27	27	26	26	25	25	25	26			
氧化亞氮總排放量	1,215	1,251	1,283	1,294	1,238	1,200	1,237	1,253	1,232	1,227	1,224			
1.A.1. 能源工業	549	576	604	624	604	574	581	583	578	569	568			
1.A.2. 製造業與營造業	135	132	137	149	139	131	144	151	144	148	138			
1.A.3. 運輸	513	527	527	508	481	483	500	507	498	498	504			
1.A.4. 其他	18	17	15	13	14	13	12	12	12	12	12			
能源部門總排放量	240,214	246,944	253,841	257,656	246,345	233,867	249,994	255,187	250,349	250,819	252,739			

別為 21,490 及 21,583 千公噸二氧化碳當量，其餘各年均維持穩定之狀態。直至 2009 年莫拉克風災對臺灣造成嚴重災害，致林木損失材積量大，其年移除量為 18,911 千公噸二氧化碳當量為最低，如圖 2.3.5 與表 2.3.5 所示。2014 年土地利用、土地利用變化及林業部門溫室氣體的移除量為 21,477 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 0.40%，1990 至 2014 年二氧化碳移除量減少約 8.16%，年平均成長率為 0.35%。

2.3.5 廢棄物部門

廢棄物部門排放之溫室氣體種類包含二氧化碳、甲烷及氧化亞氮三種。該部門溫室氣體排放量近年來逐漸遞減的趨勢，詳如圖 2.3.6 與表 2.3.6 所示，2014 年排放量為 4,264 千公噸二氧化碳當量，約占臺灣溫室氣體總排放

量的 1.50%，與 1990 年相比較減少約 52.97%，年平均成長率為 -3.09%。2000 年後甲烷排放量大幅下降，主要是實行垃圾減量，導致衛生掩埋量和一般掩埋量大量減少，同時推行沼氣（甲烷）回收措施。2014 年廢棄物部門排放中，以 5.D「廢水處理與放流」甲烷占 55.97%，比例最大，其次為 5.A.「固體廢棄物處理」甲烷占 33.48%，並以 5.A.「5.A 固體廢棄物處理」甲烷減量最多，較 2013 年減少 15.43%，係受國人垃圾掩埋量仍持續減少影響。

參考文獻

1. 行政院經濟部主計總處網站。http://www.dgbas.gov.tw




圖 2.3.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量趨勢

表 2.3.3 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	14,424	14,975	15,895	18,378	17,797	17,501	17,651	19,460	18,386	17,156	17,365	16,168	16,059	17,053
2.A 礦業 (非金屬製品)	10,584	10,698	11,854	13,879	13,259	12,766	12,645	13,394	11,564	10,746	10,486	9,974	10,648	10,270
2.B 化學工業	563	539	565	609	762	850	992	1,020	1,003	1,075	1,143	1,232	1,313	1,384
2.C 金屬工業	3,275	3,735	3,474	3,888	3,774	3,884	4,013	5,045	5,817	5,333	5,734	4,960	4,096	5,397
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
甲烷總排放量	5	7	6	7	8	10	11	12	10	12	14	23	24	22
氧化亞氮總排放量	166	352	325	301	318	345	186	374	383	312	625	800	833	833
2.B 化學工業	166	352	325	301	318	345	186	374	383	312	625	714	743	831
2.C 金屬工業	NE	86	90	2										
2.E 電子工業	NE													
氫氟碳化物總排放量	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,619	2,216	2,397
2.B 化學工業	NE	NE	NE	755	855	801	1,305	1,477	2,083	1,609	2,319	2,567	2,157	1,937
2.E 電子工業	NE	51	59	59										
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	NE	401												
全氟碳化物總排放量 (2.E 電子工業)	NE	3	13	2,939	4,143	4,198								
六氟化硫總排放量	NE	116	120	746	3,914	4,385								
2.C 金屬工業	NE	1,027	1,027											
2.E 電子工業	NE	116	120	746	944	1,415								
2.G 其他產品之製造與使用	NE	1,943	1,943											
三氟化氮總排放量 (2.E 電子工業)	NE	11	10	235	398	540								
工業製程及產品使用部門總排放量	14,595	15,333	16,227	19,441	18,977	18,658	19,154	21,323	20,862	19,218	20,465	23,529	27,586	29,428
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	17,340	17,877	20,089	19,758	18,396	16,300	18,067	18,835	19,139	18,528	17,346			
2.A 礦業 (非金屬製品)	10,691	11,257	11,014	10,369	9,289	8,467	8,616	9,577	9,333	9,866	8,728			
2.B 化學工業	1,485	1,552	1,530	1,654	1,457	1,514	1,599	1,637	1,503	1,572	1,603			
2.C 金屬工業	5,162	5,066	7,544	7,733	7,648	6,317	7,851	7,620	8,301	7,088	7,013			
2.H 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
甲烷總排放量	28	29	33	39	37	33	36	9	35	38	37			
氧化亞氮總排放量	834	960	1,432	1,531	1,290	1,457	1,834	1,762	1,674	1,539	1,514			
2.B 化學工業	834	960	969	996	784	1,006	1,170	1,195	1,016	780	728			
2.C 金屬工業	NE	NE	94	95	90	76	119	NE	NE	NE	NE			
2.E 電子工業	NE	NE	369	439	416	375	546	568	658	759	786			
氫氟碳化物總排放量	2,451	1,070	987	1,093	1,046	980	934	1,016	869	981	1,010			
2.B 化學工業	1,710	NE												
2.E 電子工業	59	73	91	171	118	168	164	134	86	169	182			
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	682	996	896	922	928	812	770	881	783	812	828			
全氟碳化物總排放量 (2.E 電子工業)	4,341	3,070	3,264	2,972	1,682	1,143	1,354	1,365	725	929	1,298			
六氟化硫總排放量	5,193	4,683	3,590	3,114	2,644	2,176	2,155	1,755	1,647	1,722	1,355			
2.C 金屬工業	1,357	1,063	770	440	144	235	212	134	109	55	56			
2.E 電子工業	1,783	2,117	2,050	1,721	1,605	1,239	1,648	1,339	1,352	1,524	1,276			
2.G 其他產品之製造與使用	2,053	1,503	770	953	895	703	295	282	186	142	24			
三氟化氮總排放量 (2.E 電子工業)	659	726	650	759	166	538	219	381	349	734	1,171			
工業製程及產品使用部門總排放量	30,846	28,416	30,044	29,266	25,262	22,628	24,597	25,122	24,437	24,469	23,733			

說明：NE (未估計)，指對現有排放量和移除量沒有估計。




圖 2.3.4 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量趨勢

表 2.3.4 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	142	146	139	131	135	151	151	134	142	127	119	131	94	93
甲烷總排放量	1,873	1,901	1,864	1,863	1,832	1,855	1,839	1,723	1,873	1,622	1,644	1,618	1,565	1,479
3.A 畜禽腸胃發酵	670	731	738	775	789	822	822	732	670	674	694	692	660	636
3.B 禽糞尿管理	206	236	234	240	247	259	266	219	206	192	205	210	201	194
3.C 水稻種植	960	908	845	825	775	767	745	765	960	751	738	702	689	637
3.F 作物殘體燃燒	38	25	48	22	21	7	7	7	38	6	7	14	15	13
氧化亞氮總排放量	1,897	1,933	1,866	1,897	1,883	1,872	1,907	1,710	1,897	1,609	1,583	1,794	1,720	1,729
3.B 禽糞尿管理	48	50	52	54	59	61	67	70	48	71	72	73	71	70
3.D 農耕土壤	1,837	1,876	1,800	1,837	1,818	1,808	1,838	1,638	1,837	1,536	1,509	1,717	1,644	1,655
3.F 作物殘體燃燒	12	8	15	7	7	2	2	2	12	2	2	4	5	4
農業部門總排放量	3,911	3,980	3,869	3,890	3,850	3,878	3,897	3,567	3,911	3,359	3,345	3,543	3,379	3,301
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	83	84	62	60	57	56	54	53	55	45	40			
甲烷總排放量	1,394	1,320	1,387	1,368	1,299	1,281	1,274	1,301	1,300	1,304	1,286			
3.A 畜禽腸胃發酵	626	614	623	614	584	571	578	590	583	579	566			
3.B 禽糞尿管理	192	193	195	195	180	175	176	180	172	166	164			
3.C 水稻種植	567	505	561	551	529	530	514	526	540	555	552			
3.F 作物殘體燃燒	9	8	8	8	6	5	5	5	5	3	4			
氧化亞氮總排放量	1,597	1,710	1,598	1,629	1,514	1,547	1,528	1,469	1,496	1,432	1,427			
3.B 禽糞尿管理	71	69	71	72	72	71	70	71	71	71	73			
3.D 農耕土壤	1,524	1,639	1,524	1,554	1,440	1,474	1,456	1,396	1,424	1,359	1,353			
3.F 作物殘體燃燒	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1			
農業部門總排放量	3,074	3,114	3,047	3,056	2,870	2,884	2,856	2,823	2,851	2,781	2,753			



圖 2.3.5 臺灣 1990 至 2014 年土地利用、土地利用變化及林業部門二氧化碳移除量趨勢

表 2.3.5 臺灣 1990 至 2014 年林業部門整體年移除量變化

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年份	林地維持林地		其他土地轉變為林地	整體年移除量變化
	生物量二氧化碳貯存增加量 (ΔCO_{2G})	生物量年二氧化碳貯存損失量 (ΔCO_{2L})	生物量年二氧化碳貯存增加量 (ΔCO_{2G})	
1990	-23,902	607	-91	-23,386
1991	-23,902	2,503	-91	-21,490
1992	-23,713	333	-136	-23,516
1993	-23,524	216	-185	-23,493
1994	-23,335	190	-233	-23,379
1995	-23,146	202	-288	-23,233
1996	-22,957	559	-319	-22,717
1997	-22,768	266	-397	-22,899
1998	-22,579	326	-446	-22,699
1999	-22,390	401	-561	-22,550
2000	-22,201	389	-665	-22,476
2001	-22,012	1,112	-683	-21,583
2002	-21,823	167	-759	-22,415
2003	-21,633	227	-899	-22,305
2004	-21,444	243	-995	-22,196
2005	-21,255	369	-1,031	-21,918
2006	-21,066	251	-1,046	-21,861
2007	-20,877	308	-1,080	-21,650
2008	-20,688	199	-1,142	-21,631
2009	-20,499	2,753	-1,166	-18,911
2010	-20,392	218	-1,240	-21,413
2011	-20,409	140	-1,202	-21,470
2012	-20,435	145	-1,283	-21,572
2013	-20,473	135	-1,226	-21,564
2014	-20,508	197	-1,166	-21,477




圖 2.3.6 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量趨勢

表 2.3.6 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
二氧化碳總排放量	20	8	65	63	110	398	387	105	117	65	259	540	612	417
甲烷總排放量	8,750	8,980	9,044	9,423	10,196	10,899	11,329	11,454	11,556	11,640	11,429	10,624	10,079	9,607
5.A 固體廢棄物處理	5,832	5,917	5,928	6,323	7,061	7,719	8,080	8,212	8,372	8,596	8,512	7,732	7,214	6,675
5.B 固體廢棄物之生物處理	11	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2
5.D 廢水處理與放流	2,907	3,062	3,115	3,100	3,135	3,179	3,249	3,241	3,184	3,042	2,916	2,891	2,864	2,930
氧化亞氮總排放量	296	285	298	311	313	334	337	337	321	329	331	340	348	353
5.B 固體廢棄物之生物處理	10	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2
5.C 廢棄物之焚化與露天燃燒	1	0	4	3	6	18	19	4	6	3	8	30	26	24
5.D 廢水處理與放流	285	284	294	307	307	316	318	332	315	324	322	310	321	327
廢棄物部門總排放量	9,066	9,273	9,407	9,798	10,619	11,631	12,053	11,896	1,993	12,035	12,018	11,504	11,039	10,377
溫室氣體排放源和吸收匯	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
二氧化碳總排放量	512	348	470	562	443	154	208	115	61	4	91			
甲烷總排放量	8,926	8,350	7,699	7,192	6,535	5,906	5,304	4,863	4,508	4,152	3,835			
5.A 固體廢棄物處理	6,101	5,525	4,930	4,379	3,814	3,246	2,749	2,352	1,997	1,688	1,428			
5.B 固體廢棄物之生物處理	7	10	11	14	16	18	21	26	24	23	20			
5.D 廢水處理與放流	2,818	2,815	2,757	2,798	2,705	2,642	2,535	2,485	2,486	2,441	2,387			
氧化亞氮總排放量	343	350	351	360	328	327	337	344	339	326	339			
5.B 固體廢棄物之生物處理	6	9	10	13	15	16	19	23	22	20	18			
5.C 廢棄物之焚化與露天燃燒	23	27	30	30	21	9	11	7	4	0	5			
5.D 廢水處理與放流	314	314	310	318	293	302	307	313	314	306	315			
廢棄物部門總排放量	9,781	9,047	8,519	8,114	7,306	6,387	5,849	5,322	4,908	4,483	4,264			



第三章 能源部門 (CRF Sector 1)

- 
- 3.1 部門概述
 - 3.2 燃料燃燒
 - 3.3 燃料逸散性排放
- 
- 
- 

第三章 能源部門 (CRF Sector 1)

3.1 部門概述

能源部門包括來自固定性與移動性能源活動，包括燃料燃燒及燃料逸散性排放之所有溫室氣體總排放。臺灣目前尚無燃料逸散統計，另自產煤炭已於 2000 年間停產，自產天然氣產量不豐（僅約占初級能源供給 0.3%），逸散性排放量較少，因此能源部門溫室氣體統計範疇僅包含燃料燃燒溫室氣體排放統計結果。

能源部門統計溫室氣體包含：二氧化碳、甲烷與氧化亞氮等三類，2014 年能源部門溫室氣體排放為 252,739 千公噸二氧化碳當量，相較於 1990 年成長 129.18%，年均成長 3.52%。

3.2 燃料燃燒

1. 統計範疇

能源部門燃料燃燒溫室氣體排放包括所有燃料燃燒活動溫室氣體之總排放，其計算方法係依據聯合國氣候變化政府間專家委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2006 年出版國家溫室氣體排放清冊指南（2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories，以下簡稱 2006 IPCC 指南）Tier 1 方法，使用我國能源平衡表與 IPCC 建議排放係數，進行溫室氣體排放統計。本部門統計資料包括：

(1) 部門方法統計：1990 至 2014 年能源消費部門別，包括能源產業、製造業與營造業、運輸，以及服務業、住宅、農林漁牧等其他部門之二氧化碳、甲烷與氧化亞氮和溫室氣體排放當量；

(2) 參考方法統計：1990 至 2014 年初級能源總供給之二氧化碳、甲烷與氧化亞氮等溫室氣體排放當量。

生質能部分，考量生物固碳效果，生質燃料燃燒溫室氣體排放不包括在本部門排放總量，然仍進行數據揭露。至於廢棄物燃燒作為能源使用之排放，則須計算在本分類中；另依據 2006 IPCC 指南分類，用於國際空運與海運燃料的排放不應計算在國內排放總量內，應該分開予以計算。

2. 方法論議題

(1) 燃料燃燒二氧化碳排放計算方法與程序

各方法簡述如下：參考法（Reference Approach）為利用國家燃料燃燒能源供給數據計算之溫室氣體排放量；方法一（Tier 1）為利用國家燃料燃燒活動數據為基礎，以 2006 IPCC 指南建議排放係數，計算該國之二氧化碳排放量；方法二（Tier 2）為利用國家燃料燃燒活動數據為基礎，以各國本土排放係數，計算該國之二氧化碳排放量；方法三（Tier 3）為依排放型態別或個別排放源之細部數據，估計國家之二氧化碳排放量，以運輸部門為例，其排放量係依不同運輸方式之運具別、運量、油耗率及排放係數等數據進行估計。

現階段臺灣燃料燃燒二氧化碳排放統計係依據 2006 IPCC 指南一（Tier 1），統計參考法及部門法（Sectoral Approach）排放量。前述方法適用於本節各排放源溫室氣體排放量之計算，爰在此一併敘明，茲說明如下：

A. 各類能源活動之排放量計算：

(A) 各類能源排放量計算公式說明如下：

a. 二氧化碳排放量：

排放量（公斤二氧化碳）= 各活動所使用之能源數據（兆焦耳）× 各燃料燃燒排放係數（公斤二氧化碳 / 兆焦耳）

b. 甲烷排放量：

排放量（公斤甲烷）= 各活動所使用之能源數據（兆焦耳）× 各燃料燃燒排放係數（公斤甲烷 / 兆焦耳）

c. 氧化亞氮排放量：

排放量（公斤氧化亞氮）= 各活動所使用之能源數據（兆焦耳）× 各燃料燃燒排放係數（公斤氧化亞氮 / 兆焦耳）

(B) 各類一般廢棄物每單位重量二氧化碳排放量計算公式說明如下：

各類廢棄物單位重量二氧化碳排放量（公斤）= 各類一般廢棄物重量（公斤）× 各類廢棄物乾基重量占濕基重量比（%）（如附件表 3.2.3）× 碳成分占乾基總重量比（%）× 化石能源成分占比（%）× 44/12（二氧化碳與碳之重量比）



表 3.2.1 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 能源部門

排放源		範疇定義
能源部門 (Energy)		本部門包括來自固定性與移動性能源活動 (燃料燃燒及逸散性燃料排放) 所有溫室氣體排放。
1.A	燃料燃燒活動	<p>1. 包括所有燃料燃燒活動所有溫室氣體之總排放。</p> <p>2. 生質燃料燃燒排放之二氧化碳不包括在本部門，假如生物質量是永續地產生，生質燃料燃燒排放之二氧化碳則可能不是淨排放；假如生物質量的獲取是處於不穩定的速率下 (高於年平均成長率)，淨二氧化碳排放將顯現於土地利用、土地利用變化及林業部門生物質量積蓄的損失；生質燃料燃燒所排放的其他溫室氣體，則計算於本部門。</p> <p>3. 廢棄物燃燒當成能源使用的排放，則計算在本分類中。</p> <p>4. 用於國際航空與海運燃料的排放不應計算在國內排放總量內，兩者應該分開計算。</p>
	能源產業	包括因燃料萃取或能源生產的燃料燃燒排放。
	1.A.1 a. 公用與自用電能及熱能製造	包括公用與自用發電廠、公用與自用熱能工廠及發電廠、公用與自用熱能工廠的燃料燃燒排放。
	i. 發電廠	公用與自用發電廠燃料燃燒排放。
	ii. 汽電共生廠	公用與自用汽電共生廠燃料燃燒排放。
	iii. 熱能工廠	公用與自用熱能工廠的燃料燃燒排放。
	b. 石油煉製	關於石油產品煉製的所有燃燒活動，但不包括蒸散排放，蒸散排放應該計算於 1A3bv 或 1B2a 中。
	c. 固體燃料製造與其他能源產業	包括從固體燃料轉變成次級、三級產品製程之能源使用的燃燒排放，包括木炭的生產過程。
	i. 固體燃料製造業	包括焦炭、褐煤、煤球生產之燃料燃燒的排放。
	ii. 其他能源產業	其他能源產業能源使用之燃燒排放，本分類亦包括於煤礦開採、油氣萃取過程能源使用之排放。
	1.A.2 製造業與營造業	包括工業中電力、熱能產生燃料燃燒排放。鋼鐵基本工業焦爐燃燒排放應被估算於 1A1c 分類中。
	a. 鋼鐵基本工業	(ISIC Group 271 and Class 2731)
	b. 非鐵金屬基本工業	(ISIC Group 272 and Class 2732)
	c. 化學材料與化學製品製造業	(ISIC Division 24)
	d. 紙漿、紙及印刷業	(ISIC Division 21 and 22)
	e. 食品製造、飲料及菸草業	(ISIC Division 15 and 16)
	f. 其他	其他工業的燃料燃燒排放，此部分亦可包含來自營造業的排放。但請盡可能以 ISIC 分類標明清楚所計算的分類，必須留心的是避免與 1A3eii 及 / 或 1A5 的建築排放重複計算。
	1.A.3 運輸	所有運輸活動燃料燃燒之排放。
	a. 空運	包括起飛與著陸國際空運與國內空運 (服務業、私人、農業等) 的排放，不包括 1A3e 機場陸地運輸之排放，而且也不包括機場固定燃燒源的排放。
	i. 國際空運	國際航空燃料使用的排放。
	ii. 國內空運	在一個國家內，所有國內客運、貨運起飛與著陸的各種機型燃料使用之排放。
	b. 公路運輸	包括所有因公路交通工具燃料使用之燃燒、逸散之排放，在公路行駛的農用交通工具亦包括在內。
	c. 鐵路	包括貨運、客運路線的鐵路運輸排放。
d. 水運	包括螺旋槳水上工具，如水翼船等的排放。	
i. 國際海運	包括懸掛所有旗幟用於國際運輸之航海船隻。	
ii. 國內水運	除了魚釣及國際海運外，所有國內水上交通工具的排放。	
e. 其他運輸	包括管線運輸、機場及港口的地面活動、及除 1A2、1A4c 以外之道路外活動等之所有剩餘運輸活動的燃燒排放。軍事運輸應屬於 1A5。	
i. 管線運輸		
1.A.4 其他部門	所有敘述於 1A4 項次下，以區分 1A5 的燃燒活動之排放。	
a. 服務業 / 機構	服務業及機構建築的燃料燃燒排放。(ISIC categories 4103,42,6,7,19,72,8,and 91-96)	
b. 住宅	所有住宅燃料燃燒之排放。	
c. 農林漁牧業	農、林、內陸、沿海、深海魚釣、牧業之燃料燃燒排放，包括接駁工具、幫浦燃料使用、穀物乾燥、園藝溫室、及其他農林漁牧之燃料使用。	
1.A.5 其他	所有剩餘的未歸類之燃料燃燒排放，包括軍隊的燃料使用排放。	

(C) 各類一般廢棄物單位重量甲烷及氧化亞氮排放量計算公式說明如下：

各類廢棄物原始單位甲烷或氧化亞氮排放量（公斤）= 各類一般廢棄物重量（公斤）× 熱值（千卡）× 4.1868（焦耳 / 卡）× 一般廢棄物排放係數（公斤甲烷或氧化亞氮 / 兆焦耳）× 10^{-9} × 各類廢棄物化石能源成分占比（%）

B. 參考方法

可由經濟體系中最終能源使用所消耗的化石能源數量計算一國中燃料燃燒排放的溫室氣體數量，此即由能源消費面計算溫室氣體排放量。由於不是所有國家均擁有詳細且精確的各部門最終能源使用資料；而能源供應資料相對易於掌握，所以 2006 IPCC 指南為了使各國均能應用其方法，遂採行由能源供應面計算二氧化碳排放量，且可經由國際能源交易記錄複核，由供應面計算全球資料既公平且實際可行。參考方法一般使用於已建立能源供給統計的國家，目前所有經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）國家或開發中國家皆有以此法計算，我國亦運用此法進行估算。參考方法計算步驟如下：

- (A) 參考法排放總量 = 固體燃料燃燒淨排放 + 液體燃料燃燒淨排放 + 氣體燃料燃燒淨排放 + 廢棄物燃燒淨排放
- (B) 固體（煤及煤產品）燃料燃燒淨排放 = 初級能源總供給之固體排放量 - 固體扣除量
- (C) 液體（原油及石油產品）燃料燃燒淨排放 = 初級能源總供給之液體排放量 - 液體扣除量
- (D) 氣體（天然氣產品）燃料燃燒淨排放 = 初級能源總供給之氣體排放量 - 氣體扣除量
- (E) 廢棄物燃燒淨排放 = 初級能源總供給之廢棄物排放量

C. 部門方法

聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）鼓勵有詳細能源使用資料的國家，依據「部門方法」的分類方式計算，並按 2006 IPCC 指南中的報告格式提報該項計算結果。

「部門方法」就是由「最終消費部門」計算其能源消費所產生之二氧化碳排放量。為了確保各國排放統計的一致性、透明性及可比較性，避免各部門之間的重複計算，並顧及既有國際通用的部門分類方式，UNFCCC 要求各成員國共同採行 2006 IPCC 指南的「部門方法」。

部門方法目前使用於所有 OECD 的國家及部門數據完整之開發中國家，此法計算結果作為 OECD 國家二氧化碳排放指標跨國比較之基礎，臺灣亦採用此法作為各項指標基準。部門方法計算步驟簡介如下：

- (A) 部門法排放總量 = 能源部門自用能源淨排放量 + 製造與營造業部門能源淨排放量 + 運輸部門燃料燃燒排放量 + 農業部門燃料燃燒排放量 + 服務業部門燃料燃燒排放量 + 住宅部門燃料燃燒排放量
- (B) 各部門淨排放量 = 各部門固體燃料燃燒淨排放量 + 各部門液體燃料燃燒淨排放量 + 各部門氣體燃料燃燒淨排放量 + 各部門廢棄物燃燒淨排放量 + 各部門電力消費之排放量
- (C) 各部門電力消費之排放量 = 發電總排放量 ×（各部門電力消費熱值 / 發電總熱值）
- (D) 發電總排放量 = 公用發電廠排放量 + 自用發電廠排放量 + 公用汽電共生廠排放量 + 自用汽電共生廠排放量
- (E) 發電總熱值 = 各部門電力消費合計熱值 + 最終消費電力合計熱值

(2) 排放係數

溫室氣體排放計算引用排放係數，引用 2006 IPCC 指南所公布係數為主，其內涵為以淨熱值為基準下，測量所得之排放量，溫室氣體排放計算所引用各燃料燃燒排放係數如表 3.2.2 所示。

由於臺灣一般廢棄物可依行政院環境保護署（以下簡稱保護署）統計進行類別分攤，一般廢棄物之二氧化碳排放係數依據 2006 IPCC 指南中，各類廢棄物中來自化石能源碳含量占比進行計算，詳細數據如表 3.2.3。

針對 2006 IPCC 指南中，未明列能源之排放係數，則引用其他國家公告之排放係數，如廢輪胎之排放係數係引用美國環保署公告係數，其內涵為以毛熱值為基準，



表 3.2.2 2006 IPCC 指南版本燃料燃燒二氧化碳、甲烷與氧化亞氮排放係數

能源產業類別				
項目	燃料燃燒二氧化碳排放係數與燃燒率及固定率		CH ₄	N ₂ O
	排放係數	燃燒率	排放係數	排放係數
單位	(kgCO ₂ /TJ)	(1.0 = 100%)	(kgCH ₄ /TJ)	(kgN ₂ O/TJ)
固體 (煤及煤產品 Coal and Coal Products)				
煙煤 - 煉焦煤 (Bituminous Coal-Coking Coal)	94,600	1	1	1.5
煙煤 - 燃料煤 (Bituminous Steam Coal)	94,600	1	1	1.5
無煙煤 (Anthracite)	98,300	1	1	1.5
亞煙煤 (Sub-bituminous Coal)	96,100	1	1	1.5
褐煤 (Lignite)	101,000	1	1	1.5
泥煤 (Peat)	106,000	1	1	1.5
焦炭 (Coke Oven Coke)	107,000	1	1	1.5
煤球 (Patent Fuel)	97,500	1	1	1.5
焦爐氣 (Coke Oven Gas)	44,400	1	1	0.1
高爐氣 (Blast Furnace Gas)	260,000	1	1	0.1
轉爐氣* (Steel Furnace Gas)	182,000	1	1	0.1
液體 (原油及石油產品 Crude Oil and Petroleum Products Total)				
原油 (Crude Oil)	73,300	1	3	0.6
煉油廠進料 (Refinery Feed stocks)	73,300	1	3	0.6
添加劑 / 含氧化合物 (Additives/Oxygenates)	73,300	1	3	0.6
煉油氣 (Refinery Gas)	57,600	1	1	0.1
液化石油氣 (LPG)	63,100	1	1	0.1
天然汽油 (Natural Gasoline)	63,100	1	1	0.1
石油腦 (Naphthas)	73,300	1	3	0.6
車用汽油 (Motor Gasoline)	69,300	1	3	0.6
航空汽油 (Aviation Gasoline)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 汽油 (Jet Fuel-Gasoline Type)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 煤油 (Jet Fuel-Kerosene Type)	71,500	1	3	0.6
煤油 (Kerosene)	71,900	1	3	0.6
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	3	0.6
燃料油 (Fuel Oil)	77,400	1	3	0.6
白精油 (White Spirits)	73,300	1	3	0.6
潤滑油 (Lubricants)	73,300	1	3	0.6
柏油 (Asphalts)	80,700	1	3	0.6
溶劑油 (Solvents)	73,300	1	3	0.6
石蠟 (Paraffin Waxes)	73,300	1	3	0.6
石油焦 (Petroleum Coke)	97,500	1	3	0.6
其他石油產品 (Other Petroleum Products)	73,300	1	3	0.6
氣體 (天然氣 Natural Gas)				
(自產) 天然氣 (Indigenous- Natural Gas)	56,100	1	1	0.1
(進口) 液化天然氣 (Imported- LNG)	56,100	1	1	0.1
廢棄物				
事業廢棄物之廢輪胎 (Industry waste-scrape tyre)	81,480	1	30.33	3.98
一般廢棄物 (Municipal Wastes non-biomass fraction)	91,700	1	30	4

資料來源：1. IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2: Energy, Table 2.2, 2006.

2. 廢輪胎：美國環保署, Climate Leaders GHG Inventory Protocol, Table B-1；美國環保署 (2013), Greenhouse Gas Inventory Protocol Core Module Guidance · US EPA Greenhouse Gas Reporting Rule and Regulation, Table C-2 to Subpart C, 2009。

表 3.2.2 2006 IPCC 指南版本燃料燃燒二氧化碳、甲烷與氧化亞氮排放係數

製造業與營造業類別				
項目	燃料燃燒二氧化碳排放係數與燃燒率及固定率		CH ₄	N ₂ O
	排放係數	燃燒率	排放係數	排放係數
單位	(kgCO ₂ /TJ)	(1.0 = 100%)	(kg CH ₄ /TJ)	(kg N ₂ O/TJ)
固體 (煤及煤產品 Coal and Coal Products)				
煙煤 - 煉焦煤 (Bituminous Coal-Coking Coal)	94,600	1	1	1.5
煙煤 - 燃料煤 (Bituminous Steam Coal)	94,600	1	1	1.5
無煙煤 (Anthracite)	98,300	1	1	1.5
亞煙煤 (Sub-bituminous Coal)	96,100	1	1	1.5
褐煤 (Lignite)	101,000	1	1	1.5
泥煤 (Peat)	106,000	1	1	1.5
焦炭 (Coke Oven Coke)	107,000	1	1	1.5
煤球 (Patent Fuel)	97,500	1	1	1.5
焦爐氣 (Coke Oven Gas)	44,400	1	1	0.1
高爐氣 (Blast Furnace Gas)	260,000	1	1	0.1
轉爐氣* (Steel Furnace Gas)	182,000	1	1	0.1
液體 (原油及石油產品 Crude Oil and Petroleum Products Total)				
原油 (Crude Oil)	73,300	1	3	0.6
煉油廠進料 (Refinery Feed stocks)	73,300	1	3	0.6
添加劑 / 含氧化合物 (Additives/Oxygenates)	73,300	1	3	0.6
煉油氣 (Refinery Gas)	57,600	1	1	0.1
液化石油氣 (LPG)	63,100	1	1	0.1
天然汽油 (Natural Gasoline)	63,100	1	1	0.1
石油腦 (Naphthas)	73,300	1	3	0.6
車用汽油 (Motor Gasoline)	69,300	1	3	0.6
航空汽油 (Aviation Gasoline)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 汽油 (Jet Fuel-Gasoline Type)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 煤油 (Jet Fuel-Kerosene Type)	71,500	1	3	0.6
煤油 (Kerosene)	71,900	1	3	0.6
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	3	0.6
燃料油 (Fuel Oil)	77,400	1	3	0.6
白精油 (White Spirits)	73,300	1	3	0.6
潤滑油 (Lubricants)	73,300	1	3	0.6
柏油 (Asphalts)	80,700	1	3	0.6
溶劑油 (Solvents)	73,300	1	3	0.6
石蠟 (Paraffin Waxes)	73,300	1	3	0.6
石油焦 (Petroleum Coke)	97,500	1	3	0.6
其他石油產品 (Other Petroleum Products)	73,300	1	3	0.6
氣體 (天然氣 Natural Gas)				
(自產) 天然氣 (Indigenous- Natural Gas)	56,100	1	1	0.1
(進口) 液化天然氣 (Imported- LNG)	56,100	1	1	0.1
廢棄物				
事業廢棄物之廢輪胎 (Industry waste-scrape tyre)	81,480	1	30.33	3.98
一般廢棄物 (Municipal Wastes non-biomass fraction)	91,700	1	30	4

資料來源：1. IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2: Energy, Table 2.2, 2006.

2. 廢輪胎：美國環保署, Climate Leaders GHG Inventory Protocol, Table B-1；美國環保署 (2013), Greenhouse Gas Inventory Protocol Core Module Guidance · US EPA Greenhouse Gas Reporting Rule and Regulation, Table C-2 to Subpart C, 2009。



表 3.2.2 2006 IPCC 指南版本燃料燃燒二氧化碳、甲烷與氧化亞氮排放係數

服務業類別				
項目	燃料燃燒二氧化碳排放係數與燃燒率及固定率		CH ₄	N ₂ O
	排放係數	燃燒率	排放係數	排放係數
單位	(kgCO ₂ /TJ)	(1.0 = 100%)	(kg CH ₄ /TJ)	(kg N ₂ O/TJ)
固體 (煤及煤產品 Coal and Coal Products)				
煙煤 - 煉焦煤 (Bituminous Coal-Coking Coal)	94,600	1	1	1.5
煙煤 - 燃料煤 (Bituminous Steam Coal)	94,600	1	1	1.5
無煙煤 (Anthracite)	98,300	1	1	1.5
亞煙煤 (Sub-bituminous Coal)	96,100	1	1	1.5
褐煤 (Lignite)	101,000	1	1	1.5
泥煤 (Peat)	106,000	1	1	1.5
焦炭 (Coke Oven Coke)	107,000	1	1	1.5
煤球 (Patent Fuel)	97,500	1	1	1.5
焦爐氣 (Coke Oven Gas)	44,400	1	1	0.1
高爐氣 (Blast Furnace Gas)	260,000	1	1	0.1
轉爐氣* (Steel Furnace Gas)	182,000	1	1	0.1
液體 (原油及石油產品 Crude Oil and Petroleum Products Total)				
原油 (Crude Oil)	73,300	1	3	0.6
煉油廠進料 (Refinery Feed stocks)	73,300	1	3	0.6
添加劑 / 含氧化合物 (Additives/Oxygenates)	73,300	1	3	0.6
煉油氣 (Refinery Gas)	57,600	1	1	0.1
液化石油氣 (LPG)	63,100	1	1	0.1
天然汽油 (Natural Gasoline)	63,100	1	1	0.1
石油腦 (Naphthas)	73,300	1	3	0.6
車用汽油 (Motor Gasoline)	69,300	1	3	0.6
航空汽油 (Aviation Gasoline)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 汽油 (Jet Fuel-Gasoline Type)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 煤油 (Jet Fuel-Kerosene Type)	71,500	1	3	0.6
煤油 (Kerosene)	71,900	1	3	0.6
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	3	0.6
燃料油 (Fuel Oil)	77,400	1	3	0.6
白精油 (White Spirits)	73,300	1	3	0.6
潤滑油 (Lubricants)	73,300	1	3	0.6
柏油 (Asphalts)	80,700	1	3	0.6
溶劑油 (Solvents)	73,300	1	3	0.6
石蠟 (Paraffin Waxes)	73,300	1	3	0.6
石油焦 (Petroleum Coke)	97,500	1	3	0.6
其他石油產品 (Other Petroleum Products)	73,300	1	3	0.6
氣體 (天然氣 Natural Gas)				
(自產) 天然氣 (Indigenous- Natural Gas)	56,100	1	1	0.1
(進口) 液化天然氣 (Imported- LNG)	56,100	1	1	0.1
廢棄物				
事業廢棄物之廢輪胎 (Industry waste-scrape tyre)	81,480	1	30.33	3.98
一般廢棄物 (Municipal Wastes non-biomass fraction)	91,700	1	30	4

資料來源：1. IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2: Energy, Table 2.2, 2006.

2. 廢輪胎：美國環保署, Climate Leaders GHG Inventory Protocol, Table B-1；美國環保署 (2013), Greenhouse Gas Inventory Protocol Core Module Guidance · US EPA Greenhouse Gas Reporting Rule and Regulation, Table C-2 to Subpart C, 2009。

表 3.2.2 2006 IPCC 指南版本燃料燃燒二氧化碳、甲烷與氧化亞氮排放係數

住宅及農林漁牧類別				
項目	燃料燃燒二氧化碳排放係數與燃燒率及固定率		CH ₄	N ₂ O
	排放係數	燃燒率	排放係數	排放係數
單位	(kgCO ₂ /TJ)	(1.0 = 100%)	(kg CH ₄ /TJ)	(kg N ₂ O/TJ)
固體 (煤及煤產品 Coal and Coal Products)				
煙煤 - 煉焦煤 (Bituminous Coal-Coking Coal)	94,600	1	1	1.5
煙煤 - 燃料煤 (Bituminous Steam Coal)	94,600	1	1	1.5
無煙煤 (Anthracite)	98,300	1	1	1.5
亞煙煤 (Sub-bituminous Coal)	96,100	1	1	1.5
褐煤 (Lignite)	101,000	1	1	1.5
泥煤 (Peat)	106,000	1	1	1.5
焦炭 (Coke Oven Coke)	107,000	1	1	1.5
煤球 (Patent Fuel)	97,500	1	1	1.5
焦爐氣 (Coke Oven Gas)	44,400	1	1	0.1
高爐氣 (Blast Furnace Gas)	260,000	1	1	0.1
轉爐氣* (Steel Furnace Gas)	182,000	1	1	0.1
液體 (原油及石油產品 Crude Oil and Petroleum Products Total)				
原油 (Crude Oil)	73,300	1	3	0.6
煉油廠進料 (Refinery Feed stocks)	73,300	1	3	0.6
添加劑 / 含氧化合物 (Additives/Oxygenates)	73,300	1	3	0.6
煉油氣 (Refinery Gas)	57,600	1	1	0.1
液化石油氣 (LPG)	63,100	1	1	0.1
天然汽油 (Natural Gasoline)	63,100	1	1	0.1
石油腦 (Naphthas)	73,300	1	3	0.6
車用汽油 (Motor Gasoline)	69,300	1	3	0.6
航空汽油 (Aviation Gasoline)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 汽油 (Jet Fuel-Gasoline Type)	70,000	1	3	0.6
航空燃油 - 煤油 (Jet Fuel-Kerosene Type)	71,500	1	3	0.6
煤油 (Kerosene)	71,900	1	3	0.6
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	3	0.6
燃料油 (Fuel Oil)	77,400	1	3	0.6
白精油 (White Spirits)	73,300	1	3	0.6
潤滑油 (Lubricants)	73,300	1	3	0.6
柏油 (Asphalts)	80,700	1	3	0.6
溶劑油 (Solvents)	73,300	1	3	0.6
石蠟 (Paraffin Waxes)	73,300	1	3	0.6
石油焦 (Petroleum Coke)	97,500	1	3	0.6
其他石油產品 (Other Petroleum Products)	73,300	1	3	0.6
氣體 (天然氣 Natural Gas)				
(自產) 天然氣 (Indigenous- Natural Gas)	56,100	1	1	0.1
(進口) 液化天然氣 (Imported- LNG)	56,100	1	1	0.1
廢棄物				
事業廢棄物之廢輪胎 (Industry waste-scrape tyre)	81,480	1	30.33	3.98
一般廢棄物 (Municipal Wastes non-biomass fraction)	91,700	1	30	4

資料來源：1. IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2: Energy, Table 2.2, 2006.

2. 廢輪胎：美國環保署, Climate Leaders GHG Inventory Protocol, Table B-1；美國環保署 (2013), Greenhouse Gas Inventory Protocol Core Module Guidance · US EPA Greenhouse Gas Reporting Rule and Regulation, Table C-2 to Subpart C, 2009。



並適用於該國之汽電共生廠，詳細數據如表 3.2.2 與 3.2.3 所示。

(3) 活動數據

A. 各類能源熱值標準：

溫室氣體排放所引用各類能源熱值整理如表 3.2.4 所示，其中化石燃料熱值係依據經濟部能源局出版之能源統計刊物之能源熱值單位，一般廢棄物熱值係依據行政院環境保護署公佈之「中華民國環境保護統計年報」之垃圾發熱量定期進行更新。針對上述各類能源之引用來源，

若因資料來源單位更新公布，應配合其調整，重新檢討各能源熱值。

B. 溫室氣體溫暖化潛勢：

各類溫室氣體溫暖化潛勢係依據 2007 年 IPCC 出版之「第四次評估報告」，溫室氣體之溫暖化潛勢如表 3.2.6，針對溫室氣體溫暖化潛勢數據，若因資料來源公布更新，得重新檢討數據之引用。

表 3.2.2 2006 IPCC 指南版本燃料燃燒二氧化碳、甲烷與氧化亞氮排放係數

運輸類別				
項目	燃料燃燒二氧化碳排放係數與燃燒率及固定率		CH ₄	N ₂ O
	排放係數	燃燒率	排放係數	排放係數
單位	(kgCO ₂ /TJ)	(1.0 = 100%)	(kg CH ₄ /TJ)	(kg N ₂ O/TJ)
航空運輸				
航空汽油 (Aviation Gasoline)	70,000	1	0.5	2
航空煤油 (Jet Fuel-Kerosene Type)	71,500	1	0.5	2
公路運輸				
液化石油氣 (LPG)	63,100	1	62	0.2
車用汽油 (Motor Gasoline) (註 1)	69,300	1	33	3.2
煤油 (Kerosene)	71,900	1		
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	3.9	3.9
潤滑油 (Lubricants)	73,300	1		
天然氣 (Natural Gas)	56,100	1	92	3
鐵路運輸				
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	4.15	28.6
亞煙煤 (Sub-bituminous Coal)	96,100	1	2	1.5
非道路運輸				
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	4.15	28.6
水路運輸				
煉油氣 (Refinery Feed stocks)	57,600	1		
液化石油氣 (LPG)	63,100	1		
汽油 (Motor Gasoline)	69,300	1		
煤油 (Kerosene)	71,900	1		
柴油 (Diesel Oil)	74,100	1	7	2
燃料油 (Fuel Oil)	77,400	1	7	2
白精油 (White Spirits)	73,300	1		
石蠟 (Paraffin Waxes)	73,300	1		
其他石油產品 (Other Petroleum Products)	73,300	1		
天然氣 (Natural Gas)	56,100	1		

資料來源：IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2: Energy, Table 3.2.1 & Table 3.2.2 & Table 3.4.1 & Table 3.5.2 & Table 3.5.3 & Table 3.6.4 & Table 3.6.5, 2006.

表 3.2.3 一般廢棄物各分類之二氧化碳排放係數

項目	乾基占濕基重量比 (%)	碳成分占乾基重量比 (%)	化石能源成分占比 (%)
紙類	90	46	1
纖維布類	80	50	20
木竹稻草落葉類	40	49	0
廚餘類	40	38	0
塑膠類	100	75	100
皮革橡膠類	84	67	20
其他	90	3	100

資料來源：IPCC，Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 5: Waste，Table 2.4, 2006。

備註：本表排放係數係以濕基重量基準下之排放係數。

表 3.2.4 能源熱值表

燃料別		原始單位	淨熱值 (千卡)
煙煤 - 燃料煤	發電業	公斤 (kg)	5,700
	鋼鐵業		6,800
	其他		6,100
煙煤 - 煉焦煤	鋼鐵業	公斤 (kg)	7,380
	其他		6,800
亞煙煤	鋼鐵業	公斤 (kg)	4,900
	其他		5,600
無煙煤		公斤 (kg)	7,100
焦炭		公斤 (kg)	7,000
煤球		公斤 (kg)	3,800
焦爐氣		立方公尺 (M3)	4,200
高爐氣		立方公尺 (M3)	777
轉爐氣		立方公尺 (M3)	1,869
原油		公升 (liter)	9,000
添加劑		公升 (liter)	9,000
液化油		公升 (liter)	8,900
煉油氣		立方公尺 (M3)	9,000
液化石油氣		公升 (liter)	6,635
石油腦		公升 (liter)	7,800
車用汽油		公升 (liter)	7,800
航空汽油		公升 (liter)	7,500
航空燃油		公升 (liter)	8,000
煤油		公升 (liter)	8,500
柴油		公升 (liter)	8,400
燃料油		公升 (liter)	9,600
白精油		公升 (liter)	9,000
潤滑油		公升 (liter)	9,600
柏油		公升 (liter)	10,000
溶劑油		公升 (liter)	8,300
石蠟		公升 (liter)	9,000
石油焦		公升 (liter)	8,200
其他石油產品		公升 (liter)	9,000
天然氣		立方公尺 (M3)	8,000
液化天然氣		立方公尺 (M3)	9,000
一般廢棄物		公斤 (kg)	見表 3.2.5
廢輪胎		公斤 (kg)	7,685

資料來源：1. 經濟部，能源局能源統計手冊，2015年5月。

2. 廢輪胎：US EPA, Climate Leaders GHG Inventory Protocol, Table B-1, 2009。

C. 溫室氣體排放活動數據資料來源：

- (A) 各活動燃料燃燒使用數據係依據經濟部能源局公布之能源平衡表（熱值單位），詳如附件二。
- (B) 一般廢棄物作為能源用途之使用量與按行政院環境保護署統計分類之垃圾成分分析由各焚化廠提報，事業用廢棄物之廢輪胎作為能源用途之使用量由各工廠提供。

(4) 燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

(A) 部門方法統計結果

臺灣 1990 至 2014 年臺灣燃料燃燒排放之二氧化碳總量趨勢如圖 3.2.1 所示，其中 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 109,491 千公噸二氧化碳，逐年持續成長至 2000 年為 209,364 千公噸二氧化碳，2007 年成長至 255,871 千公噸二氧化碳，2008 年減少至

244,635 千公噸二氧化碳，2009 年持續降為 232,204 千公噸二氧化碳，2010 年回升至 248,279 千公噸二氧化碳，2011 年則增加至 253,449 千公噸二氧化碳，2012 年又微幅減少至 248,639 千公噸二氧化碳，2013 年微幅增加至 249,110 千公噸二氧化碳，2014 年又微幅增加至 251,038 千公噸二氧化碳，較 2013 年增加 0.77%，詳見表 3.2.7。

占比方面，2014 年臺灣燃料燃燒二氧化碳排放以能源產業部門為最高，達總排放量之 65.98%，其次為製造業與營造業，占比為 16.08%，再次為運輸部門排放，達 13.91%，占比較低者為服務業、住宅、與農林漁牧，分別為 1.76%、1.84% 與 0.43%，詳見圖 3.2.2。

(B) 參考方法統計結果

以參考方法計算我國能源燃燒之二氧化碳當量排放，由表 3.2.7 可知，1990 年之二氧化碳排放量為 109,533 千公噸二氧化碳當量，2000 年為 213,525 千公噸二氧化碳當量，2010 年為 255,291 千公噸二氧化碳當量，2012 年

表 3.2.5 一般廢棄物歷年熱值

(單位：千卡)

年	熱值 (千卡)
1997	1,738
1998	1,738
1999	1,651
2000	1,889
2001	1,541
2002	1,712
2003	1,618
2004	1,785
2005	1,689
2006	1,788
2007	2,022
2008	2,098
2009	1,914
2010	1,896
2011	1,854
2012	1,941
2013	2,012
2014	1,865

資料來源：1.1997 年無熱值統計數據，故使用 1998 年之數據。
2.1998 年資料取自行政院環境保護署之中華民國環境保護統計年報（2010）。
3.1999 年 2014 年資料取自行政院環境保護署之中華民國環境保護統計年報（2015）。

表 3.2.6 各類能源之溫室氣體溫暖化潛勢

項目	二氧化碳	甲烷	氧化亞氮
第四次評估報告潛勢	1	25	298

資料來源：IPCC (2007), Climate Change, the Fourth Assessment Report.




圖 3.2.1 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢




圖 3.2.2 臺灣 2014 年能源部門燃料燃燒二氧化碳排放部門占比

表 3.2.7 臺灣 1990 至 2014 年燃料燃燒二氧化碳排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
全國總淨排放量	109,491	118,414	126,056	135,212	142,982	150,437	158,104
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	109,533	118,934	126,210	137,922	144,475	151,648	159,797
(部門方法)							
1. 能源產業	49,118	55,403	58,795	66,180	70,862	76,800	81,519
2. 製造業與營造業	30,154	31,656	33,121	33,405	34,380	34,996	36,051
3. 運輸	19,646	20,888	24,033	26,103	27,540	28,822	29,801
4. 其他部門							
a. 服務業	3,621	3,529	2,989	2,490	3,018	2,445	3,175
b. 住宅	4,005	4,238	4,446	4,359	4,461	4,597	4,754
c. 農林漁牧	2,946	2,700	2,672	2,675	2,721	2,777	2,805
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
全國總淨排放量	170,599	181,294	190,260	209,364	213,039	221,092	230,680
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	173,562	186,691	194,005	213,525	216,507	226,636	232,891
(部門方法)							
1. 能源產業	92,436	100,959	107,029	122,157	126,437	130,556	140,966
2. 製造業與營造業	37,818	38,551	39,854	43,064	42,158	44,936	43,564
3. 運輸	30,536	31,844	32,772	33,207	33,246	34,542	34,509
4. 其他部門							
a. 服務業	2,483	2,948	3,155	3,220	3,562	3,493	3,961
b. 住宅	4,851	4,952	5,410	5,354	5,181	5,107	4,869
c. 農林漁牧	2,475	2,041	2,040	2,362	2,455	2,459	2,811
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
全國總淨排放量	238,517	245,204	252,070	255,871	244,635	232,204	248,279
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	245,896	249,978	256,905	263,982	248,797	237,012	255,291
(部門方法)							
1. 能源產業	146,638	153,820	160,602	164,426	158,464	148,936	159,910
2. 製造業與營造業	43,978	42,660	43,947	45,868	42,391	39,558	43,663
3. 運輸	35,859	36,844	36,769	35,415	33,394	33,711	34,824
4. 其他部門							
a. 服務業	4,118	4,230	4,248	4,192	4,201	4,226	4,203
b. 住宅	4,947	5,023	4,857	4,879	4,820	4,775	4,737
c. 農林漁牧	2,977	2,626	1,646	1,091	1,365	998	941
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
全國總淨排放量	253,449	248,639	249,110	251,038			
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	261,761	254,817	255,852	259,879			
(部門方法)							
1. 能源產業	163,547	161,112	160,239	165,646			
2. 製造業與營造業	44,898	43,256	44,564	40,361			
3. 運輸	35,293	34,502	34,472	34,930			
4. 其他部門							
a. 服務業	3,961	3,958	4,177	4,411			
b. 住宅	4,814	4,770	4,649	4,616			
c. 農林漁牧	937	1,041	1,009	1,074			

為 254,817 千公噸二氧化碳當量，2013 年為 255,852 千公噸二氧化碳當量，2014 年為 259,879 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年成長 1.57%。

B. 甲烷

(A) 部門方法統計結果

臺灣 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放量為 254 千公噸二氧化碳當量，逐年持續成長至 2000 年為 430 千公噸二氧化碳當量，2006 年成長至 488 千公噸二氧化碳當量，2008 年微幅減少，至 2009 年達 462 千公噸二氧化碳當量，2010 年又微幅增加至 478 千公噸二氧化碳當量，2011 年則增加至 485 千公噸二氧化碳當量，2012 年又微幅減少至 478 千公噸二氧化碳當量，2013 年增加至 482 千公噸二氧化碳當量，2014 年減少至 478 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 0.83%，詳見表 3.2.8。

占比方面，2014 年臺灣甲烷排放量以運輸部門為最高，達總排放量之 59.88%，其次為能源產業，占比為 18.63%，再次為製造業與營造業排放，達 16.02%，占比較低者為服務業、住宅、與農林漁牧，分別為 2.70%、2.00% 與 0.75%，詳見圖 3.2.3 及圖 3.2.4。

(B) 參考方法統計結果

以參考方法計算臺灣能源燃燒之甲烷排放，由表 3.2.8 可知，1990 年之排放量為 76 千公噸二氧化碳當量，逐年成長至 2000 年為 141 千公噸二氧化碳當量，2006 年達 166 千公噸二氧化碳當量，2008 年微幅減少至 165 千公噸二氧化碳當量，2013 年減少至 161 千公噸二氧化碳當量，2014 年排放量又減少為 159 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 1.24%。

C. 氧化亞氮

(A) 部門方法統計結果

臺灣 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒氧化亞氮總排放量為 537 千公噸二氧化碳當量，逐年持續成長至 2007 年為 1,294 千公噸二氧化碳當量，至 2009 年減少為 1,200 千公噸二氧化碳當量，2010 年回升至 1,238 千公噸二氧化碳當量，2011 年則增加至 1,253 千公噸二氧化碳當量，2012 年微幅減少至 1,232 千公噸二氧化碳當量，2013 年減少至 1,227 千公噸二氧化碳當量，2014 年又減少至 1,224 千公噸二氧化碳當量，較 2012 年減少 0.24%，詳見表 3.2.9。

占比方面，2014 年我國氧化亞氮排放量以能源產業部門為最高，達總排放量之 46.44%，其次為運輸部門，占比為 41.22%，再次為製造業與營造業排放，達 11.32%，占比較低者為服務業、住宅、與農林漁牧，分別為 0.62%、0.19% 與 0.21%，詳見圖 3.2.5 及圖 3.2.6。

(B) 參考方法統計結果

以參考方法計算我國能源燃燒之氧化亞氮排放，由表 3.2.9 可知，1990 年之排放量為 385 千公噸二氧化碳當量，至 2007 年達 1,080 千公噸二氧化碳當量，至 2009 年減少至 987 千公噸二氧化碳當量，2010 年又逐步回升，至 2011 年為 1,050 千公噸二氧化碳當量，至 2013 年減少為 1,049 千公噸二氧化碳當量，2014 年又增加為 1,060 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 1.05%。

(5) 完整性

臺灣自 1993 年起即每年更新我國能源有關二氧化碳排放量，遵照聯合國氣候變化政府間專家委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2006 年發布之「國家溫室氣體排放清冊指南（Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories）」計算方法及排放係數等相關規範，並考量我國能源平衡表資料特性進行修正，且逐年隨我國能源統計資料更新而作調整。

能源部門國家清冊除廢棄物部分自 1997 年起始有一般廢棄物總量資料蒐集，燃燒事業廢棄物之廢輪胎自 2002 年起始有相關資料蒐集，與生質能部分受限於歷史統計資料，生質能統計僅能追溯至 1997 年外，我國燃料燃燒溫室氣體統計自 1990 年至 2014 年均十分完整。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

為完善我國溫室氣體排放清冊編製作業及確保能源統計資料之數據品質，我國能源部門於 2015 年度，參考 IPCC 對於溫室氣體排放統計中有關不確定性分析相關規範，以及主要國家（如日本、澳洲、英國及紐西蘭等）不確定性分析做法及相關規範，並依我國現有燃料燃燒溫室氣體排放統計資料掌握情形，業於 2015 年完成不確定性初步分析結果，今年持續檢視不確定性分析計算結果，釐清資料內涵（活動數據、排放係數與能源熱值等）、計算方法與過程之合理性，並邀請專家學者共同檢視，以確保計算結果之數據品質。

表 3.2.8 臺灣 1990 至 2014 年燃料燃燒甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
全國總淨排放量	254	270	293	310	328	344	359
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	76	81	83	90	94	100	102
(部門方法)							
1. 能源產業	26	29	28	31	33	38	37
2. 製造業與營造業	46	48	51	51	52	51	53
3. 運輸	152	163	187	202	216	228	239
4. 其他部門							
a. 服務業	12	12	10	8	10	8	10
b. 住宅	8	9	9	9	9	9	10
c. 農林漁牧	10	9	9	9	9	9	9
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
全國總淨排放量	370	390	409	430	435	447	465
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	112	121	130	141	141	144	150
(部門方法)							
1. 能源產業	44	50	57	66	67	68	78
2. 製造業與營造業	54	57	57	64	66	71	70
3. 運輸	245	257	266	270	272	278	287
4. 其他部門							
a. 服務業	8	10	10	10	11	11	12
b. 住宅	10	10	11	11	11	10	10
c. 農林漁牧	8	7	7	8	8	8	9
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
全國總淨排放量	482	488	488	491	473	462	478
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	163	162	166	172	165	154	161
(部門方法)							
1. 能源產業	83	84	89	95	95	85	89
2. 製造業與營造業	71	69	73	79	75	70	82
3. 運輸	295	303	298	289	276	281	288
4. 其他部門							
a. 服務業	13	13	13	13	13	13	12
b. 住宅	10	10	10	10	10	10	10
c. 農林漁牧	10	9	6	4	5	3	3
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
全國總淨排放量	485	478	482	478			
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	163	160	161	159			
(部門方法)							
1. 能源產業	90	91	89	89			
2. 製造業與營造業	79	82	77	82			
3. 運輸	284	284	286	288			
4. 其他部門							
a. 服務業	12	12	13	12			
b. 住宅	10	10	10	10			
c. 農林漁牧	3	3	4	3			




圖 3.2.3 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒甲烷排放量趨勢




圖 3.2.4 臺灣 2014 年能源部門燃料燃燒甲烷排放部門占比

表 3.2.9 臺灣 1990 至 2014 年燃料燃燒氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
全國總淨排放量	537	578	652	703	739	772	816
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	385	416	451	498	519	545	586
(部門方法)							
1. 能源產業	138	158	183	207	221	239	267
2. 製造業與營造業	91	94	100	99	101	101	105
3. 運輸	291	309	353	382	402	418	428
4. 其他部門							
a. 服務業	8	8	7	5	7	5	7
b. 住宅	2	2	2	2	2	2	2
c. 農林漁牧	7	6	6	6	7	7	7
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
全國總淨排放量	861	912	961	1,047	1,070	1,124	1,175
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	640	687	712	802	848	895	941
(部門方法)							
1. 能源產業	302	332	364	432	453	475	529
2. 製造業與營造業	107	111	113	125	127	137	133
3. 運輸	438	456	469	475	475	496	495
4. 其他部門							
a. 服務業	5	6	7	7	7	7	8
b. 住宅	2	2	3	3	3	2	2
c. 農林漁牧	6	5	5	6	6	6	7
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
全國總淨排放量	1,215	1,251	1,283	1,294	1,238	1,200	1,238
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	985	993	1,025	1,080	1,022	987	1,049
(部門方法)							
1. 能源產業	549	576	604	624	604	574	581
2. 製造業與營造業	135	132	137	149	139	131	144
3. 運輸	513	527	527	508	481	483	500
4. 其他部門							
a. 服務業	8	8	8	8	8	8	8
b. 住宅	2	2	2	2	2	2	2
c. 農林漁牧	7	6	4	3	3	2	2
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
全國總淨排放量	1,253	1,232	1,227	1,224			
1. 能源							
A. 燃料燃燒 (參考方法)	1,050	1,032	1,049	1,060			
(部門方法)							
1. 能源產業	583	578	569	568			
2. 製造業與營造業	151	144	148	138			
3. 運輸	507	498	498	504			
4. 其他部門							
a. 服務業	7	7	7	8			
b. 住宅	2	2	2	2			
c. 農林漁牧	2	3	2	3			




圖 3.2.5 臺灣 1990 至 2014 年能源部門燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢




圖 3.2.6 臺灣 2014 年能源部門燃料燃燒氧化亞氮排放部門占比

(2) 時間序列的一致性

臺灣燃料燃燒溫室氣體排放係依據國家能源統計數據進行計算，除廢棄物排放資料外，各類能源統計可追溯至 1981 年，故資料涵蓋範疇與資料品質具相當一致性。

4. QA/QC 及查證

臺灣業於 2006 年成立「經濟部能源局溫室氣體統計與技術參數諮詢小組」，負責能源部門溫室氣體排放統計結果之審議，並於 2012 年建立燃料燃燒溫室氣體排放統計活動數據品質管理程序，檢核活動數據之「一致性」與「合理性」，以確保我國燃料燃燒溫室氣體排放統計活動數據品質。

(1) 「一致性」檢視方法

由於能源統計已為第一手資料，缺乏完整可對照之原始統計數據，燃料燃燒溫室氣體排放統計活動數據檢核工作之「一致性」檢視方法，以「完整性」檢視方法取代較為合宜，未來將由能源統計端定期進行活動數據檢視，其檢視程序及結果則作為後續燃料燃燒溫室氣體排放統計作業依據。

(2) 「合理性」檢視方法

A. 燃料燃燒溫室氣體排放統計活動數據檢核之「合理性」檢視方法，當由能源統計端進行逐月檢視。

B. 「合理性」檢視訂定明確之一致性檢視標準，變動範圍 5% 以上為合理之檢視標準。

5. 特定排放源的重新計算

污水處理廠產生沼氣之燃燒利用應歸屬於能源部門，惟目前相關資料尚未納入能源統計，規劃取得相關資料納入能源統計後，即進行重新計算。

6. 特定排放源的改善計畫

與環保署協商提供業者申報溫室氣體盤查報告書中，有關煤炭與油氣之逸散排放量數據，俟取得統計數據，並釐清屬能源相關逸散排放後，將評估納入統計範疇。

3.2.1 能源產業 (1.A.1)

1. 統計範疇

能源產業燃料燃燒溫室氣體排放，依據國家清冊分類，可分為公用與自用電能及熱能製造業、熱能工廠、石油煉製業，以及固體燃料製造與其他能源產業。

而電能及熱能製造業以下又可再細分為公用與自用發電廠、公用與自用汽電共生廠及公用與自用熱能工廠，固體燃料製造與其他能源產業下亦可再區分為固體燃料製造業與其他能源產業兩項。




圖 3.2.7 燃料燃燒溫室氣體排放統計活動數據品質管理程序

2. 方法論議題

(1) 燃料燃燒二氧化碳排放計算方法與程序

請參照 3.2 節計算方法。

(2) 排放係數

請參照 3.2 節使用排放係數。

(3) 活動數據

請參考附件二能源平衡表統計數據，其中「電能及熱能製造業」為轉變投入—公用發電廠、自用發電廠、公用汽電共生廠與自用汽電共生廠之加總；「發電廠」參考轉變投入—公用發電廠；「汽電共生廠」參考轉變投入—公用與自用汽電共生廠；另臺灣目前無「公用熱能工廠」。

「石油煉製」活動數據請參考能源平衡表之能源部門自用—油氣礦業與煉油廠之加總；「固體燃料製造與其他能源產業」則為能源部門自用—煤礦業、煉焦工場 / 煤製品業與高爐工場之加總；「固體燃料製造業」為能源部門自用—煉焦工場 / 煤製品業與高爐工場之加總；「其他能源產業」則僅包含能源部門自用—煤礦業。

(4) 燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

臺灣能源產業 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 49,118 千公噸二氧化碳，其後呈現逐年持續成長至 2007 年為 164,426 千公噸二氧化碳，2008 年與 2009 年微幅減少至 148,936 千公噸二氧化碳，2010 年又微幅上升，至 2011 年達 163,547 千公噸二氧化碳，2012 年與 2013 年持續下降，至 2013 年減少至 160,239 千公噸二氧化碳，2014 年則增加至 165,646 千公噸二氧化碳，較 2013 年增加 3.37%，排放占比以公用與自用電能及熱能製造業 90.78% 為最高，詳見圖 3.2.8、3.2.9 與表 3.2.11。

B. 甲烷

臺灣能源產業 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放量為 26 千公噸二氧化碳當量，其後增減互現，至 2007 年為 95 千公噸二氧化碳當量達最高，2009 年減少至 85 千公噸二氧化碳當量，2010 年後呈現增加趨勢，至 2014 年達 89 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 2.20%，排放占比以公用與自用電能及熱能製造業 96.02% 為最高，詳見圖 3.2.10、圖 3.2.11 與表 3.2.12。

C. 氧化亞氮

臺灣能源產業 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒氧化亞氮總排放量為 138 千公噸二氧化碳當量，其後增減互現，至 2007 年為 624 千公噸二氧化碳當量達最高，2008 年減少至 604 千公噸二氧化碳當量，2009 年持續減少為 574 千公噸二氧化碳當量，2010 年又微幅上升至 581 千公噸二氧化碳當量，至 2011 年排放量達 583 千公噸二氧化碳當量，2012 年至 2014 年則呈現下降趨勢，2014 年排放量為 568 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 0.18%，排放占比則以公用與自用電能及熱能製造業 99.15% 為最高，詳見圖 3.2.12、圖 3.2.13 與表 3.2.13。

(5) 完整性

請參照 3.2 節完整性論述。

3. 不確定性與時間序列的一致性

請參照 3.2 節不確定性與時間序列的一致性。

4. QA/QC 及查證

請參照 3.2 節 QA/QC 及查證方法。

5. 特定排放源的重新計算

請參照 3.2 節特定排放源的重新計算規劃。

6. 特定排放源的改善計畫

請參照 3.2 節特定排放源改善計畫。

3.2.2 製造業與營造業 (1.A.2)

1. 統計範疇

製造業與營造業燃料燃燒溫室氣體排放，依據國家清冊分類，可向下細分為：鋼鐵基本工業、非鐵金屬基本工業、化學材料與化學製品製造業、紙漿、紙與印刷業、食品飲料及菸草業其他等項目。

2. 方法論議題

(1) 燃料燃燒二氧化碳排放計算方法與程序

請參照 3.2 節計算方法。

(2) 排放係數

請參照 3.2 節使用排放係數。

(3) 活動數據

請參考附件二能源平衡表統計數據，其中「鋼鐵基

表 3.2.10 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 能源產業

排放源		範疇定義
1.A.1	能源產業	包括因燃料萃取或能源生產的燃料燃燒排放。
	a. 公用與自用電能及熱能製造業	包括公用與自用發電廠、公用與自用熱能工廠及發電廠、公用與自用熱能工廠的燃料燃燒排放。
	i. 發電廠	公用與自用發電廠燃料燃燒排放。
	ii. 汽電共生廠	公用與自用汽電共生廠燃料燃燒排放。
	iii. 熱能工廠	公用與自用熱能工廠的燃料燃燒排放。
	b. 石油煉製	關於石油產品煉製的所有燃燒活動，但不包括蒸散排放，蒸散排放應該計算於 1A3bv 或 1B2a 中。
	c. 固體燃料製造與其他能源產業	包括從固體燃料轉變成次級、三級產品製程之能源使用的燃燒排放，包括木炭的生產過程。
	i. 固體燃料製造業	包括焦炭、褐煤、煤球生產之燃料燃燒的排放。
ii. 其他能源產業	其他能源產業能源使用之燃燒排放，本分類亦包括於煤礦開採、油氣萃取過程能源使用之排放。	




圖 3.2.8 臺灣 1990 至 2014 年能源產業燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢




圖 3.2.9 臺灣 2014 年能源產業燃料燃燒二氧化碳排放占比

表 3.2.11 臺灣 1990 至 2014 年能源產業二氧化碳排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
能源產業	49,118	55,403	58,795	66,180	70,862	76,800	81,519
a. 公用與自用電能及熱能製造業	39,543	46,143	49,891	56,736	60,648	66,239	70,916
i. 公用與自用發電廠	34,282	39,807	41,806	46,988	50,598	54,937	57,947
ii. 公用與自用汽電共生廠	5,262	6,337	8,085	9,748	10,050	11,302	12,969
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	5,169	4,736	4,625	4,961	5,731	5,975	6,068
c. 固體燃料製造與其他能源產業	4,406	4,524	4,272	4,483	4,483	4,585	4,534
i. 固體燃料製造業	4,387	4,506	4,269	4,482	4,482	4,584	4,533
ii. 其他能源產業	19	18	4	1	1	1	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
能源產業	92,436	100,959	107,029	122,157	126,437	130,556	140,966
a. 公用與自用電能及熱能製造業	79,756	87,898	94,225	108,068	112,667	117,200	127,232
i. 公用與自用發電廠	64,483	71,780	75,230	81,363	83,527	87,115	91,864
ii. 公用與自用汽電共生廠	15,273	16,118	18,995	26,705	29,140	30,085	35,369
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	6,088	6,077	6,453	7,051	7,025	6,497	6,709
c. 固體燃料製造與其他能源產業	6,592	6,984	6,347	7,025	6,743	6,858	7,023
i. 固體燃料製造業	6,591	6,984	6,316	6,829	6,705	6,815	6,983
ii. 其他能源產業	0	1	32	195	38	43	40
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
能源產業	146,638	153,820	160,602	164,426	158,464	148,936	159,910
a. 公用與自用電能及熱能製造業	131,921	138,486	145,237	149,603	145,161	136,722	145,902
i. 公用與自用發電廠	93,526	99,432	105,892	107,374	107,131	99,334	106,823
ii. 公用與自用汽電共生廠	38,395	39,054	39,345	42,229	38,030	37,388	39,078
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	7,507	8,325	7,969	7,256	6,049	5,965	5,966
c. 固體燃料製造與其他能源產業	7,209	7,006	7,396	7,567	7,254	6,247	8,043
i. 固體燃料製造業	7,170	6,966	7,362	7,530	7,216	6,210	8,005
ii. 其他能源產業	39	39	34	37	38	38	38
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
能源產業	163,547	161,112	160,239	165,646			
a. 公用與自用電能及熱能製造業	149,012	146,799	144,612	150,381			
i. 公用與自用發電廠	109,878	109,702	106,174	109,360			
ii. 公用與自用汽電共生廠	39,134	37,098	38,438	41,021			
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0			
b. 石油煉製	5,684	5,829	5,364	4,643			
c. 固體燃料製造與其他能源產業	8,851	8,484	10,263	10,622			
i. 固體燃料製造業	8,811	8,448	10,224	10,583			
ii. 其他能源產業	40	36	38	39			




圖 3.2.10 臺灣 1990 至 2014 年能源產業燃料燃燒甲烷排放量趨勢




圖 3.2.11 臺灣 2014 年能源產業燃料燃燒甲烷排放占比

表 3.2.12 臺灣 1990 至 2014 年能源產業甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
能源產業	26	29	28	31	33	38	37
a. 公用與自用電能及熱能製造業	22	26	24	28	29	34	33
i. 公用與自用發電廠	20	24	22	25	26	30	28
ii. 公用與自用汽電共生廠	2	2	3	3	3	4	4
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	3	3	3	3	3	4	4
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1	1	1	1
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1	1	1	1
ii. 其他能源產業	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
能源產業	44	50	57	66	67	68	78
a. 公用與自用電能及熱能製造業	40	45	52	61	62	62	72
i. 公用與自用發電廠	31	33	35	36	34	33	34
ii. 公用與自用汽電共生廠	9	12	17	25	28	29	38
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	4	4	4	5	5	4	5
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1	1	1	1
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1	1	1	1
ii. 其他能源產業	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
能源產業	83	84	89	95	95	85	89
a. 公用與自用電能及熱能製造業	77	77	83	90	91	80	85
i. 公用與自用發電廠	33	35	38	38	38	33	37
ii. 公用與自用汽電共生廠	44	42	45	52	53	47	48
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	5	5	5	5	4	4	3
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1	1	1	1
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1	1	1	1
ii. 其他能源產業	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
能源產業	89	90	91	89			
a. 公用與自用電能及熱能製造業	85	86	87	85			
i. 公用與自用發電廠	38	37	36	38			
ii. 公用與自用汽電共生廠	48	49	51	48			
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0			
b. 石油煉製	3	3	3	2			
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1			
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1			
ii. 其他能源產業	0	0	0	0			




圖 3.2.12 臺灣 1990 至 2014 年能源產業燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢




圖 3.2.13 臺灣 2014 年能源產業燃料燃燒甲烷排放占比

表 3.2.13 臺灣 1990 至 2014 年能源產業氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
能源產業	138	158	183	207	221	239	267
a. 公用與自用電能及熱能製造業	131	153	178	202	215	232	260
i. 公用與自用發電廠	122	138	156	175	186	197	219
ii. 公用與自用汽電共生廠	9	14	22	27	29	34	41
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	6	4	5	5	6	6	6
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1	1	1	1
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1	1	1	1
ii. 其他能源產業	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
能源產業	302	332	364	432	453	475	529
a. 公用與自用電能及熱能製造業	295	324	355	422	443	466	519
i. 公用與自用發電廠	243	267	281	308	320	337	360
ii. 公用與自用汽電共生廠	52	57	75	114	124	129	159
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	6	6	7	9	9	8	9
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1	1	1	1
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1	1	1	1
ii. 其他能源產業	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
能源產業	549	576	604	624	604	574	581
a. 公用與自用電能及熱能製造業	539	565	593	614	596	566	574
i. 公用與自用發電廠	360	384	406	409	401	378	386
ii. 公用與自用汽電共生廠	179	181	187	205	195	189	187
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0	0	0	0
b. 石油煉製	9	10	9	8	7	6	5
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	1	1	1	1	1
i. 固體燃料製造業	1	1	1	1	1	1	1
ii. 其他能源產業	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
能源產業	583	578	569	568			
a. 公用與自用電能及熱能製造業	577	572	563	563			
i. 公用與自用發電廠	393	392	372	378			
ii. 公用與自用汽電共生廠	183	180	191	186			
iii. 公用與自用熱能工廠	0	0	0	0			
b. 石油煉製	5	5	4	3			
c. 固體燃料製造與其他能源產業	1	1	2	2			
i. 固體燃料製造業	1	1	2	2			
ii. 其他能源產業	0	0	0	0			

本工業」為製造業與營造業部門—鋼鐵基本工業；「非鐵金屬基本工業」為製造業與營造業部門—非鐵金屬基本工業；「化學材料製造業」為製造業與營造業部門—化學材料製造業與化學製品製造業之加總；「紙漿、紙製品與印刷業」為製造業與營造業部門—紙漿、紙及紙製品業；「食品飲料及菸草業」為製造業與營造業部門—食品飲料及菸草業；「其他」則為製造業與營造業部門扣除上述行業別之統計結果。

(4) 燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

臺灣製造業與營造業 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 30,154 千公噸二氧化碳，其後呈現逐年持續成長至 2007 年最高，達 45,868 千公噸二氧化碳，至 2009 年微幅下降至 39,558 千公噸二氧化碳，其後漲跌互現，至 2011 年排放量達 44,898 千公噸二氧化碳，2012 年又下降至 43,256 千公噸二氧化碳，2013 年又增加至 44,564 千公噸二氧化碳，2014 年則下降至 40,361 千公噸二氧化碳，較 2013 年減少 9.43%；排放占比以化學材料與化學製品製造業 46.46% 為最高，鋼鐵基本工業占 20.18%，紙漿、紙與印刷業、食品製造、飲料及菸草業與非鐵金屬基本工業則分別占 4.58%、1.75% 與 0.60%，詳見圖 3.2.13、圖 3.2.14 與表 3.2.15。

B. 甲烷

臺灣製造業與營造業 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放量為 46 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年持續成長至 2002 年達 71 千公噸二氧化碳當量，2003 年微幅下降至 70 千公噸二氧化碳當量，2004 年上升至 71 千公噸二氧化碳當量，其後互有增減，至 2011 年排放量達 82 千公噸二氧化碳當量，2012 年減少至 79 千

公噸二氧化碳當量，2013 年增加至 82 千公噸二氧化碳當量，2014 年又減少至 77 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 6.10%；排放占比以化學材料與化學製品製造業 57.02% 為最高，鋼鐵基本工業占 12.11%，紙漿、紙與印刷業、食品製造、飲料及菸草業與非鐵金屬基本工業則分別占 6.44%、0.87% 與 0.22%，詳見圖 3.2.16、圖 3.2.17 與表 3.2.16。

C. 氧化亞氮

臺灣製造業與營造業 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒氧化亞氮總排放量為 91 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年持續成長至 2002 年達 137 千公噸二氧化碳當量，2003 年微幅下降至 133 千公噸二氧化碳當量，後又持續上升至 2004 年 135 千公噸二氧化碳當量，其後互有增減，至 2014 年為 138 噸二氧化碳當量，較 2013 年減少 6.76%；排放占比以化學材料與化學製品製造業 56.80% 為最高，鋼鐵基本工業占 11.71%，紙漿、紙與印刷業、食品製造、飲料及菸草業與非鐵金屬基本工業則分別占 6.33%、1.14% 與 0.24%，詳見圖 3.2.18、圖 3.2.19 與表 3.2.17。

(5) 完整性

請參照 3.2 節完整性論述。

3. 不確定性與時間序列的一致性

請參照 3.2 節不確定性與時間序列的一致性。

4. QA/QC 及查證

請參照 3.2 節 QA/QC 及查證方法。

5. 特定排放源的重新計算

請參照 3.2 節特定排放源的重新計算規劃。

表 3.2.14 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 製造業與營造業

排放源		範疇定義
1.A.2	製造業與營造業	包括工業中電力、熱能產生燃料燃燒排放。鋼鐵基本工業焦爐燃燒排放應被估算於 1A1c 分類中。
	a. 鋼鐵基本工業	(ISIC Group 271 and Class 2731)
	b. 非鐵金屬基本工業	(ISIC Group 272 and Class 2732)
	c. 化學材料與化學製品製造業	(ISIC Division 24)
	d. 紙漿、紙與印刷業	(ISIC Division 21 and 22)
	e. 食品飲料及菸草業	(ISIC Division 15 and 16)
	f. 其他	其他工業的燃料燃燒排放，此部分亦可包含來自營造業的排放。但請盡可能以 ISIC 分類標明清楚所計算的分類，必須留心的是避免與 1A3eii 及 / 或 1A5 的建築排放重複計算。




圖 3.2.14 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業燃料燃燒二氧化碳排放趨勢




圖 3.2.15 臺灣 2014 年製造業與營造業燃料燃燒二氧化碳排放占比

表 3.2.15 臺灣 1990 至 2014 年製造業與營造業二氧化碳排放趨勢

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
製造業與營造業	30,154	31,656	33,121	33,405	34,380	34,996	36,051
a. 鋼鐵基本工業	4,877	5,282	5,289	5,836	5,856	5,925	5,820
b. 非鐵金屬基本工業	193	209	209	233	254	286	347
c. 化學材料製造業	6,444	6,481	7,516	7,699	8,300	8,712	9,216
d. 紙漿、紙製品與印刷業	2,049	2,148	2,241	2,130	2,246	2,310	2,397
e. 食品飲料及菸草業	1,504	1,434	1,464	1,413	1,384	1,358	1,391
f. 其他	15,087	16,102	16,402	16,094	16,339	16,405	16,880
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
製造業與營造業	37,818	38,551	39,854	43,064	42,158	44,936	43,564
a. 鋼鐵基本工業	7,455	7,783	7,997	8,608	7,681	7,996	7,694
b. 非鐵金屬基本工業	403	365	349	348	344	343	316
c. 化學材料製造業	9,354	10,106	10,850	13,599	14,933	15,973	15,282
d. 紙漿、紙製品與印刷業	2,495	2,350	2,270	2,011	1,869	1,781	1,794
e. 食品飲料及菸草業	1,392	1,392	1,520	1,479	1,303	1,206	1,155
f. 其他	16,718	16,554	16,867	17,019	16,027	17,637	17,322
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
製造業與營造業	43,978	42,660	43,947	45,868	42,391	39,558	43,663
a. 鋼鐵基本工業	8,230	7,687	8,367	8,057	7,820	7,057	8,417
b. 非鐵金屬基本工業	404	368	348	352	316	241	276
c. 化學材料製造業	16,849	16,604	18,224	21,287	19,375	18,638	20,578
d. 紙漿、紙製品與印刷業	1,937	2,026	1,828	1,859	1,716	1,643	1,729
e. 食品飲料及菸草業	1,259	1,165	1,140	1,055	973	987	1,028
f. 其他	15,299	14,811	14,040	13,259	12,191	10,992	11,636
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
製造業與營造業	44,898	43,256	44,564	40,361			
a. 鋼鐵基本工業	9,041	9,000	10,028	8,145			
b. 非鐵金屬基本工業	272	257	248	243			
c. 化學材料製造業	20,236	19,158	19,654	18,751			
d. 紙漿、紙製品與印刷業	1,963	2,007	1,966	1,847			
e. 食品飲料及菸草業	998	837	743	708			
f. 其他	12,387	11,997	11,926	10,667			




圖 3.2.16 1990 至 2014 年臺灣製造業與營造業燃料燃燒甲烷排放量趨勢




圖 3.2.17 2014 年臺灣製造業與營造業燃料燃燒甲烷排放占比

表 3.2.16 臺灣 1990 至 2014 年臺灣製造業與營造業甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
製造業與營造業	46	48	51	51	52	51	53
a. 鋼鐵基本工業	5	5	5	6	5	6	5
b. 非鐵金屬基本工業	0	0	0	0	0	0	0
c. 化學材料製造業	11	10	13	14	15	15	16
d. 紙漿、紙製品與印刷業	3	4	4	4	4	4	4
e. 食品飲料及菸草業	1	1	1	1	1	1	1
f. 其他	26	27	27	26	26	26	27
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
製造業與營造業	54	57	57	64	66	71	70
a. 鋼鐵基本工業	7	7	7	8	8	8	8
b. 非鐵金屬基本工業	0	0	0	0	0	0	0
c. 化學材料製造業	16	18	20	27	30	31	30
d. 紙漿、紙製品與印刷業	4	4	4	3	3	3	3
e. 食品飲料及菸草業	1	1	1	1	1	1	1
f. 其他	26	25	25	24	23	27	27
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
製造業與營造業	71	69	73	79	75	70	78
a. 鋼鐵基本工業	8	8	8	8	7	7	8
b. 非鐵金屬基本工業	0	0	0	0	0	0	0
c. 化學材料製造業	33	33	37	45	42	40	45
d. 紙漿、紙製品與印刷業	4	4	3	4	4	4	4
e. 食品飲料及菸草業	1	1	1	1	1	1	1
f. 其他	24	24	23	22	20	19	20
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
製造業與營造業	82	79	82	77			
a. 鋼鐵基本工業	9	8	9	9			
b. 非鐵金屬基本工業	0	0	0	0			
c. 化學材料製造業	45	44	46	44			
d. 紙漿、紙製品與印刷業	5	5	5	5			
e. 食品飲料及菸草業	1	1	1	1			
f. 其他	22	21	21	18			




圖 3.2.18 1990 至 2014 年臺灣製造業與營造業燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢




圖 3.2.19 2014 年臺灣製造業與營造業燃料燃燒氧化亞氮排放占比

6. 特定排放源的改善計畫

請參照 3.2 節特定排放源改善計畫。

3.2.3 運輸 (1.A.3)

1. 統計範疇

運輸部門燃料燃燒溫室氣體排放，依據國家清冊分類，可分為空運、公路運輸、鐵路、水運與其他等大項；

本節空運部分僅包含國內空運，水運部分則僅包含國內水運，至於國際空運及國際海運數據則另於 3.2.7 節進行說明。

2. 方法論議題

(1) 燃料燃燒二氧化碳排放計算方法與程序

請參照 3.2 節計算方法。

表 3.2.17 臺灣 1990 至 2014 年臺灣製造業與營造業氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
製造業與營造業	91	94	100	99	101	101	105
a. 鋼鐵基本工業	10	10	10	11	11	11	10
b. 非鐵金屬基本工業	0	1	0	1	1	1	1
c. 化學材料製造業	21	21	26	27	28	29	31
d. 紙漿、紙製品與印刷業	6	7	8	7	7	8	8
e. 食品飲料及菸草業	3	3	3	3	3	3	3
f. 其他	50	53	53	51	51	50	52
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
製造業與營造業	107	111	113	125	127	137	133
a. 鋼鐵基本工業	13	14	14	15	14	15	14
b. 非鐵金屬基本工業	1	1	1	1	1	1	1
c. 化學材料製造業	31	35	38	51	56	58	56
d. 紙漿、紙製品與印刷業	9	8	8	7	6	6	6
e. 食品飲料及菸草業	3	3	3	3	3	3	3
f. 其他	50	50	49	49	47	54	53
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
製造業與營造業	135	132	137	149	139	131	144
a. 鋼鐵基本工業	16	14	15	14	13	12	15
b. 非鐵金屬基本工業	1	1	1	1	1	0	1
c. 化學材料製造業	62	61	68	82	77	74	82
d. 紙漿、紙製品與印刷業	7	7	7	7	7	7	7
e. 食品飲料及菸草業	3	3	3	2	2	2	2
f. 其他	47	47	44	42	39	35	37
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
製造業與營造業	151	144	148	138			
a. 鋼鐵基本工業	16	15	16	16			
b. 非鐵金屬基本工業	0	0	0	0			
c. 化學材料製造業	82	79	82	79			
d. 紙漿、紙製品與印刷業	9	9	9	9			
e. 食品飲料及菸草業	2	2	2	2			
f. 其他	41	39	39	33			

表 3.2.18 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 運輸

排放源	範疇定義
運輸	所有運輸活動油料燃燒之排放。
a. 空運	包括起飛與著陸國內空運（服務業、私人、農業等）的排放，不包括 1A3e 機場陸地運輸之排放，而且也不包括機場固定燃燒源的排放。
ii. 國內空運	在一個國家內，所有國內客運、貨運起飛與著陸的各種機型燃料使用之排放。
b. 公路運輸	包括所有因公路交通工具燃料使用之燃燒、逸散之排放，在公路行駛的農用交通工具亦包括在內。
c. 鐵路	包括貨運、客運路線的鐵路運輸排放。
d. 水運	包括螺旋槳水上工具，如水翼船等的排放。
ii. 國內水運	除了魚釣及國際海運外，所有國內水上交通工具的排放。
e. 其他運輸	包括管線運輸、機場及港口的地面活動、及除 1A4c、1A2 以外之道路外活動等之所有剩餘運輸活動的燃燒排放。軍事運輸應屬於 1A5。

(2) 排放係數

請參照 3.2 節使用排放係數。

(3) 活動數據

請參考附件二能源平衡表統計數據，其中「國內空運」為運輸部門—國內航空；「公路運輸」為運輸部門—公路；「鐵路」為運輸部門—鐵路；「國內水運」為運輸部門—國內水運；「其他運輸」為運輸部門—管線運輸與其他之加總。

(4) 燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

臺灣運輸部門 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 19,646 千公噸二氧化碳，其後呈現逐年持續成長至 2005 年達 36,844 千公噸二氧化碳，其後互有增長，至 2013 年排放量達 34,472 千公噸二氧化碳，2014 年增加至 34,930 千公噸二氧化碳，較 2013 年增加 1.33%；排放占比以公路運輸 97.71% 為最高，水運其次，占 1.31%，空運占 0.76%、鐵路占 0.22%，詳見圖 3.2.20、圖 3.2.21 與表 3.2.19。




圖 3.2.20 1990 至 2014 年臺灣運輸部門燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢




圖 3.2.21 2014 年臺灣運輸部門燃料燃燒二氧化碳排放占比

B. 甲烷

臺灣運輸部門 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放量為 152 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年持續成長至 2005 年達 303 千公噸二氧化碳當量，其後排放量互有增長，至 2013 年下降至 284 千公噸二氧化碳當量，2014 年微幅增加至 286 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 0.70%；排放占比以公路運輸 99.58% 為最高，水運其次，占 0.37%，鐵路占 0.04%、空運為 0.02%，詳見圖 3.2.22、圖 3.2.23 與表 3.2.20。

C. 氧化亞氮

臺灣運輸部門 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒氧化亞氮總排放量為 291 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年持續成長至 2005 年達 527 千公噸二氧化碳當量，其

後排放量或有增長，至 2011 年排放量達 507 千公噸二氧化碳當量，2013 年又微幅下降至 498 千公噸二氧化碳當量，2014 年又微幅上升至 504 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 1.20%；排放占比以公路運輸 97.09% 為最高，鐵路其次，占 1.75%，空運占 0.44%、水運為 0.72%，詳見圖 3.2.24、圖 3.2.25 與表 3.2.21。

(5) 完整性

請參照 3.2 節完整性部分論述。

3. 不確定性與時間序列的一致性

請參照 3.2 節不確定性與時間序列的一致性。

4. QA/QC 及查證

請參照 3.2 節 QA/QC 及查證方法。

表 3.2.19 臺灣 1990 至 2014 年臺灣運輸部門二氧化碳排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
運輸	19,646	20,888	24,033	26,103	27,540	28,822	29,801
a. 空運	280	300	368	527	641	853	1,072
ii. 國內空運	280	300	368	527	641	853	1,072
b. 公路運輸	18,547	19,762	22,693	24,515	25,866	26,936	27,615
c. 鐵路	130	139	138	144	140	140	132
d. 水運	690	687	833	917	893	893	982
ii. 國內水運	690	687	833	917	893	893	982
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
運輸	30,536	31,844	32,772	33,207	33,246	34,542	34,509
a. 空運	1,075	1,025	1,052	903	828	755	630
ii. 國內空運	1,075	1,025	1,052	903	828	755	630
b. 公路運輸	28,290	29,570	30,370	30,956	30,942	32,459	32,790
c. 鐵路	129	126	133	123	118	117	106
d. 水運	1,042	1,124	1,217	1,226	1,360	1,211	982
ii. 國內水運	1,042	1,124	1,217	1,226	1,360	1,211	982
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
運輸	35,859	36,844	36,769	35,415	33,394	33,711	34,824
a. 空運	646	592	516	390	259	228	231
ii. 國內空運	646	592	516	390	259	228	231
b. 公路運輸	34,035	35,021	35,090	33,972	32,267	32,619	33,648
c. 鐵路	95	96	94	91	90	74	82
d. 水運	1,083	1,135	1,069	961	778	790	863
ii. 國內水運	1,083	1,135	1,069	961	778	790	863
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
運輸	35,293	34,502	34,472	34,930			
a. 空運	257	259	237	266			
ii. 國內空運	257	259	237	266			
b. 公路運輸	34,149	33,678	33,685	34,129			
c. 鐵路	83	83	83	77			
d. 水運	804	483	467	458			
ii. 國內水運	804	483	467	458			
e. 其他運輸	0	0	0	0			




圖 3.2.22 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門燃料燃燒甲烷排放量趨勢




圖 3.2.23 2014 年臺灣運輸部門燃料燃燒甲烷排放占比

表 3.2.20 臺灣 1990 至 2014 年臺灣運輸部門甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
運輸	152	163	187	202	216	228	239
a. 空運	0	0	0	0	0	0	0
ii. 國內空運	0	0	0	0	0	0	0
b. 公路運輸	150	162	184	200	213	226	237
c. 鐵路	0	0	0	0	0	0	0
d. 水運	2	2	2	2	2	2	2
ii. 國內水運	2	2	2	2	2	2	2
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
運輸	245	257	266	270	272	278	287
a. 空運	0	0	0	0	0	0	0
ii. 國內空運	0	0	0	0	0	0	0
b. 公路運輸	243	254	263	267	269	275	284
c. 鐵路	0	0	0	0	0	0	0
d. 水運	2	3	3	3	3	3	2
ii. 國內水運	2	3	3	3	3	3	2
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
運輸	295	303	298	289	276	281	285
a. 空運	0	0	0	0	0	0	0
ii. 國內空運	0	0	0	0	0	0	0
b. 公路運輸	292	300	295	287	274	279	283
c. 鐵路	0	0	0	0	0	0	0
d. 水運	2	3	2	2	2	2	2
ii. 國內水運	2	3	2	2	2	2	2
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
運輸	288	284	284	286			
a. 空運	0	0	0	0			
ii. 國內空運	0	0	0	0			
b. 公路運輸	286	283	283	285			
c. 鐵路	0	0	0	0			
d. 水運	2	1	1	1			
ii. 國內水運	2	1	1	1			
e. 其他運輸	0	0	0	0			





圖 3.2.24 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢



■ 空運 ■ 公路運輸 ■ 鐵路 ■ 水運 ■ 其他運輸

圖 3.2.25 臺灣 2014 年運輸部門燃料燃燒氧化亞氮排放占比

表 3.2.21 臺灣 1990 至 2014 年運輸部門氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
運輸	291	309	353	382	402	418	428
a. 空運	2	3	3	4	5	7	9
ii. 國內空運	2	3	3	4	5	7	9
b. 公路運輸	268	285	328	354	373	388	396
c. 鐵路	15	16	16	17	16	16	15
d. 水運	5	5	6	7	7	7	8
ii. 國內水運	5	5	6	7	7	7	8
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
運輸	438	456	469	475	475	496	495
a. 空運	9	9	9	8	7	6	5
ii. 國內空運	9	9	9	8	7	6	5
b. 公路運輸	406	424	436	444	443	466	470
c. 鐵路	15	14	15	14	14	13	12
d. 水運	8	9	10	10	11	10	8
ii. 國內水運	8	9	10	10	11	10	8
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
運輸	513	527	527	508	481	483	500
a. 空運	5	5	4	3	2	2	2
ii. 國內空運	5	5	4	3	2	2	2
b. 公路運輸	488	502	504	487	462	466	482
c. 鐵路	11	11	11	10	10	9	9
d. 水運	8	9	8	8	6	6	7
ii. 國內水運	8	9	8	8	6	6	7
e. 其他運輸	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
運輸	507	498	498	504			
a. 空運	2	2	2	2			
ii. 國內空運	2	2	2	2			
b. 公路運輸	489	483	483	490			
c. 鐵路	10	9	9	9			
d. 水運	6	4	4	4			
ii. 國內水運	6	4	4	4			
e. 其他運輸	0	0	0	0			

5. 特定排放源的重新計算

請參照 3.2 節特定排放源的重新計算規劃。

6. 特定排放源的改善計畫

請參照 3.2 節特定排放源改善計畫。

3.2.4 其他部門（服務、住、農林漁牧）（1.A.4）

1. 統計範疇

依據國家清冊分類，臺灣其他部門統計範疇包含服務業/機構、住宅，以及農林漁業之燃料燃燒排放，其中，農林漁業包括農、林、內陸、沿海、深海魚釣業之接駁工具、幫浦燃料使用、穀物乾燥、園藝溫室及其他農林漁之燃料使用排放。

2. 方法論議題

（1）燃料燃燒二氧化碳排放計算方法與程序

請參照 3.2 節計算方法。

（2）排放係數

請參照 3.2 節使用排放係數。

（3）活動數據

請參考附件二能源平衡表統計數據，其中「服務業/機構」為服務業部門；「住宅」為住宅部門；「農林漁牧」為農業部門。

（4）燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

臺灣服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒溫室氣體排放統計 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 10,572 千公噸二氧化碳，其後呈現逐年減少至 1995 年達 9,820 千公噸二氧化碳，其後逐年或有增減，2000 年排放量為 10,937 千公噸二氧化碳，2005 年為 11,880 千公噸二氧化碳，2010 年排放量為達 9,881 千公噸二氧化碳，至 2013 年排放量減少至 9,835 千公噸二氧化碳，2014 年排放量微幅增加至 10,101 千公噸二氧化碳。

表 3.2.22 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 服務業、住宅、農林漁牧

排放源		範疇定義
1.A.4	其他部門	所有敘述於下的燃燒活動之排放。
	a. 服務業 / 機構	服務業及機構建築的燃料燃燒排放。 (ISIC categories 4103,42,6,719,72,8,and 91-96)
	b. 住宅	所有住宅燃料燃燒之排放。
	c. 農林漁牧	農、林、內陸、沿海、深海魚釣、牧業之燃料燃燒之排放，包括接駁工具、幫浦燃料使用、穀物乾燥、園藝溫室、及其他農林漁牧之燃料使用。




圖 3.2.26 臺灣 1990 至 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢

碳，較 2013 年增加 2.70%；排放占比部分，2014 年占比較高者為住宅部門 45.70%、其次為服務業部門 43.67%，再次為農林漁牧的 10.63%，詳見圖 3.2.26、圖 3.2.27 與表 3.2.23。

B. 甲烷

臺灣服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒溫室氣體排放統計 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放量為 30 千公噸二氧化碳當量，其後逐年或有增減，至 2004 年排放量為 33 千公噸二氧化碳當量，2012 年排放

量為 25 千公噸二氧化碳當量，至 2014 年排放量增加至 26 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 4.00%；排放占比部分，2014 年占比較高者為服務業部門 49.48%、其次為住宅部門 36.70%，再次為農林漁牧的 13.83%，詳見圖 3.2.28、圖 3.2.29 與表 3.2.24。

C. 氧化亞氮

臺灣商、住、農林漁牧部門燃料燃燒溫室氣體排放統計 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒氧化亞氮總排放量為 17 千公噸二氧化碳當量，其後逐年或有增減，2005




圖 3.2.27 臺灣 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒二氧化碳排放量占比

表 3.2.23 臺灣 1990 至 2014 年服務、住、農林漁牧部門二氧化碳排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
4. 其他部門	10,572	10,466	10,107	9,523	10,200	9,820	10,733
a. 服務業	3,621	3,529	2,989	2,490	3,018	2,445	3,175
b. 住宅	4,005	4,238	4,446	4,359	4,461	4,597	4,754
c. 農林漁牧	2,946	2,700	2,672	2,675	2,721	2,777	2,805
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
4. 其他部門	9,809	9,940	10,605	10,937	11,198	11,058	11,641
a. 服務業	2,483	2,948	3,155	3,220	3,562	3,493	3,961
b. 住宅	4,851	4,952	5,410	5,354	5,181	5,107	4,869
c. 農林漁牧	2,475	2,041	2,040	2,362	2,455	2,459	2,811
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
4. 其他部門	12,041	11,880	10,752	10,162	10,387	9,999	9,881
a. 服務業	4,118	4,230	4,248	4,192	4,201	4,226	4,203
b. 住宅	4,947	5,023	4,857	4,879	4,820	4,775	4,737
c. 農林漁牧	2,977	2,626	1,646	1,091	1,365	998	941
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
4. 其他部門	9,712	9,769	9,835	10,101			
a. 服務業	3,961	3,958	4,177	4,411			
b. 住宅	4,814	4,770	4,649	4,616			
c. 農林漁牧	937	1,041	1,009	1,074			




圖 3.2.28 臺灣 1990 至 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒甲烷排放量趨勢




圖 3.2.29 臺灣 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒甲烷排放量占比

表 3.2.24 臺灣 1990 至 2014 年臺灣服務、住、農林漁牧部門甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
4. 其他部門	30	29	28	26	28	27	29
a. 服務業	12	12	10	8	10	8	10
b. 住宅	8	9	9	9	9	9	10
c. 農林漁牧	10	9	9	9	9	9	9
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
4. 其他部門	26	27	28	29	30	30	32
a. 服務業	8	10	10	10	11	11	12
b. 住宅	10	10	11	11	11	10	10
c. 農林漁牧	8	7	7	8	8	8	9
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
4. 其他部門	33	32	29	27	27	26	26
a. 服務業	13	13	13	13	13	13	13
b. 住宅	10	10	10	10	10	10	10
c. 農林漁牧	10	9	6	4	5	3	3
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
4. 其他部門	25	25	25	26			
a. 服務業	12	12	12	13			
b. 住宅	10	10	10	10			
c. 農林漁牧	3	3	3	4			

年排放量為 17 千公噸二氧化碳當量，至 2014 年排放量微幅減少至 12 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 2.62%；排放占比部分，2014 年占比較高者為服務業部門 60.81%、其次為農林漁牧 20.79%，再次為住宅部門的 18.40%，詳見圖 3.2.30、圖 3.2.31 與表 3.2.25。

(5) 完整性

請參照 3.2 節完整性論述。

3. 不確定性與時間序列的一致性

請參照 3.2 節不確定性與時間序列的一致性。

4. QA/QC 及查證

請參照 3.2 節 QA/QC 及查證方法。

5. 特定排放源的重新計算

請參照 3.2 節特定排放源的重新計算規劃。

6. 特定排放源的改善計畫

請參照 3.2 節特定排放源改善計畫。

3.2.5 其他

1. 統計範疇

依據國家清冊分類，臺灣我國其他部門統計範疇為來自能源平衡表其他項目，依據我國能源平衡表特性，並無其他項目統計數據。

3.2.6 部門方法與參考方法的比較

國際間於統計燃料燃燒之二氧化碳排放時，參考方法可作為檢核部門方法正確性之輔助做法，並以兩種方法之統計結果差異於 5% 以內作為評估基準。




圖 3.2.30 臺灣 1990 至 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢




圖 3.2.31 臺灣 2014 年服務、住、農林漁牧部門燃料燃燒氧化亞氮排放量占比

國際間燃料燃燒二氧化碳排放之統計，以參考方法作為檢核部門方法正確性之輔助做法，並以兩種方法之統計結果差異於 5% 以內作為評估基準。臺灣燃料燃燒計

算部門方法與參考方法之差距為 3.52%，低於 2006 IPCC 指南建議的 5.0% 差異值。

表 3.2.25 臺灣 1990 至 2014 年服務、住、農林漁牧部門氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
4. 其他部門	17	17	15	14	15	14	16
a. 服務業	8	8	7	5	7	5	7
b. 住宅	2	2	2	2	2	2	2
c. 農林漁牧	7	6	6	6	7	7	7
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
4. 其他部門	14	14	14	15	16	16	17
a. 服務業	5	6	7	7	7	7	8
b. 住宅	2	2	3	3	3	2	2
c. 農林漁牧	6	5	5	6	6	6	7
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
4. 其他部門	18	17	15	13	14	13	12
a. 服務業	8	8	8	8	8	8	8
b. 住宅	2	2	2	2	2	2	2
c. 農林漁牧	7	6	4	3	3	2	2
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
4. 其他部門	12	12	12	12			
a. 服務業	7	7	7	8			
b. 住宅	2	2	2	2			
c. 農林漁牧	2	3	2	3			

表 3.2.26 燃料燃燒二氧化碳排放量計算結果比較

年	參考方法統計結果 (千公噸) (A)	部門方法統計結果 (千公噸) (B)	計算方法差異 (%) $C = (A/B) * 100 - 100$
1990	109,533.30	109,490.64	0.04%
1991	118,933.87	118,413.79	0.44%
1992	126,210.27	126,056.16	0.12%
1993	137,922.17	135,211.94	2.00%
1994	144,475.19	142,982.21	1.04%
1995	151,648.33	150,437.10	0.81%
1996	159,796.88	158,104.09	1.07%
1997	173,561.85	170,598.56	1.74%
1998	186,690.56	181,294.23	2.98%
1999	194,005.09	190,259.92	1.97%
2000	213,524.63	209,364.42	1.99%
2001	216,506.66	213,038.66	1.63%
2002	226,636.49	221,092.24	2.51%
2003	232,891.34	230,679.62	0.96%
2004	245,896.41	238,517.16	3.10%
2005	249,977.99	245,204.45	1.95%
2006	256,905.31	252,070.01	1.92%
2007	263,982.46	255,870.85	3.17%
2008	248,796.94	244,634.64	1.70%
2009	237,012.39	232,204.27	2.07%
2010	255,290.93	248,278.60	2.83%
2011	261,761.48	253,449.13	3.28%
2012	254,817.36	248,639.27	2.48%
2013	255,851.80	249,110.07	2.71%
2014	259,879.31	251,038.10	3.52%

3.2.7 國際運輸燃料

1. 統計範疇

依據國家清冊分類，我國國際運輸燃料部分統計範疇包括國際空運與國際海運燃料使用的排放。

2. 方法論議題

(1) 燃料燃燒二氧化碳排放計算方法與程序

請參照 3.2 節計算方法。

(2) 排放係數

請參照 3.2 節使用排放係數。

(3) 活動數據

請參考附件二能源平衡表統計數據，其中「國際空運」為國際航空；「國際海運」為國際海運。

(4) 燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

臺灣國際運輸燃料 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 6,551 千公噸二氧化碳，其後呈現逐年持續成長至 1999 年達 17,589 千公噸二氧化碳，其後互有增長，至 2011 年排放量達 11,075 千公噸二氧化碳，2013 年增加至 10,466 千公噸二氧化碳，2014 年又增加至 10,905 千公噸二氧化碳，較 2013 年增加 4.19%；排放占比以國際空運 65.88% 為高，國際海運則占 34.12%，詳見圖 3.2.32、圖 3.2.33 與表 3.2.28。

B. 甲烷

臺灣國際運輸燃料 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放量為 5 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年持續成長至 1999 年達 13 千公噸二氧化碳當量，其後互有增長，至 2011 年排放量降至 6 千公噸二氧化碳當量，至 2014 年又下降至 5 千公噸二氧化碳當量；排放占比以國際海運 74.24% 為最高，國際空運則占 25.76%，詳見圖 3.2.34、圖 3.2.35 與表 3.2.29。

表 3.2.27 臺灣燃料燃燒排放源分類統計範疇 - 國際運輸

運輸		所有運輸活動油料燃燒之排放
1.A.3	a. 空運	包括起飛與著陸國際空運（服務業、私人、農業等）的排放，不包括 1A3e 機場陸地運輸之排放，而且也不包括機場固定燃燒源的排放。
	i. 國際空運	關於國際航空燃料使用的排放。
	d. 水運	包括螺旋槳水上工具，如水翼船等的排放。
	i. 國際海運	包括懸掛所有旗幟用於國際運輸之航海船隻。




圖 3.2.32 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料燃燒二氧化碳排放量趨勢




圖 3.2.33 臺灣 2014 年國際運輸燃料燃料燃燒二氧化碳排放占比

表 3.2.28 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料二氧化碳排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
國際運輸燃料	6,551	6,516	8,682	8,762	9,989	11,434	11,484
a. 國際空運	1,701	1,927	2,376	2,749	3,375	3,879	4,146
b. 國際海運	4,850	4,589	6,306	6,013	6,614	7,555	7,338
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
國際運輸燃料	13,016	14,214	17,589	16,499	13,203	13,211	14,969
a. 國際空運	4,289	4,558	5,035	5,094	4,982	5,249	5,177
b. 國際海運	8,727	9,656	12,554	11,405	8,221	7,962	9,792
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
國際運輸燃料	13,810	13,873	14,021	13,135	11,451	10,466	11,571
a. 國際空運	5,909	6,120	6,372	6,295	5,556	5,251	5,925
b. 國際海運	7,901	7,753	7,649	6,840	5,895	5,215	5,646
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
國際運輸燃料	11,075	9,958	10,466	10,905			
a. 國際空運	5,910	6,212	6,586	7,184			
b. 國際海運	5,165	3,746	3,880	3,721			




圖 3.2.34 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料燃料燃燒甲烷排放量趨勢

C. 氧化亞氮

臺灣國際運輸燃料 1990 年按部門方法計算之燃料燃燒氧化亞氮總排放量為 25 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年持續成長至 1999 年達 71 千公噸二氧化碳當量，其後互有增長，至 2011 年排放量下降至 61 千公噸二氧化碳當量，2012 年下降至 60 千公噸二氧化碳當量，2013 年則增加至 64 千公噸二氧化碳當量，2014 年又增加至 69 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 7.22%；排放占比以國際空運 87.41% 為高，國際海運則占 12.59%，詳見圖 3.2.36、圖 3.2.37 與表 3.2.30。

(5) 完整性

請參照 3.2 節完整性論述。

3. 不確定性與時間序列的一致性

請參照 3.2 節不確定性與時間序列的一致性。

4. QA/QC 及查證

請參照 3.2 節 QA/QC 及查證方法。

5. 特定排放源的重新計算

請參照 3.2 節特定排放源的重新計算規劃。

6. 特定排放源的改善計畫

請參照 3.2 節特定排放源改善計畫。




圖 3.2.35 臺灣 2014 年國際運輸燃料燃料燃燒甲烷排放占比

表 3.2.29 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
國際運輸燃料	5	5	7	6	7	8	8
a. 國際空運	0	0	0	0	1	1	1
b. 國際海運	5	4	6	6	6	7	7
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
國際運輸燃料	9	10	13	12	9	9	10
a. 國際空運	1	1	1	1	1	1	1
b. 國際海運	8	9	12	11	8	8	10
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
國際運輸燃料	9	9	9	8	7	6	7
a. 國際空運	1	1	1	1	1	1	1
b. 國際海運	8	8	7	7	6	5	5
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
國際運輸燃料	6	5	5	5			
a. 國際空運	1	1	1	1			
b. 國際海運	5	4	4	4			




圖 3.2.36 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料燃料燃燒氧化亞氮排放量趨勢




圖 3.2.37 臺灣 2014 年國際運輸燃料燃料燃燒氧化亞氮排放占比

表 3.2.30 臺灣 1990 至 2014 年國際運輸燃料氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
國際運輸燃料	25	27	34	37	43	50	52
a. 國際空運	14	16	20	23	28	32	35
b. 國際海運	11	11	15	14	15	17	17
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
國際運輸燃料	56	60	71	69	61	62	66
a. 國際空運	36	38	42	42	42	44	43
b. 國際海運	20	22	29	26	19	18	23
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
國際運輸燃料	68	69	71	68	60	56	62
a. 國際空運	49	51	53	52	46	44	49
b. 國際海運	18	18	18	16	14	12	13
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
國際運輸燃料	61	60	64	69			
a. 國際空運	49	52	55	60			
b. 國際海運	12	9	9	9			

3.2.8 燃料的原料與非能源使用

1. 統計範疇

依據國家清冊分類，我國非能源消費統計範疇包括工業、轉變及能源部門、運輸部門石化原料與其他等，現行燃料部分則包含固態、液態燃料為主。

2. 方法論議題

(1) 非能源使用燃料燃燒二氧化碳排放扣減量計算方法與程序

請參照 3.2 節計算方法。

(2) 排放係數

請參照 3.2 節使用排放係數。

(3) 活動數據

請參考附件二能源平衡表之非能源消費統計數據。

(4) 燃料燃燒溫室氣體排放統計結果

A. 二氧化碳

臺灣非能源使用燃料燃燒溫室氣體排放扣減量，1990 年按部門方法計算之燃料燃燒二氧化碳總排放量為 13,835 千公噸二氧化碳，其後呈現逐年增加趨勢至 2004 年達 48,801 千公噸二氧化碳，其後逐年或有增減，2010 年扣減量為 67,009 千公噸二氧化碳，2012 年扣減量為 62,002 千公噸二氧化碳，2013 年扣減量為 66,469 千公噸二氧化碳，2014 年扣減量為 67,672 千公噸二氧化碳，較 2013 年增加 1.81%。

B. 甲烷

臺灣非能源使用燃料燃燒溫室氣體排放扣減量，1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放扣減量為 15 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年增加趨勢，至 2004 年為 51 千公噸二氧化碳當量，2010 年達 68 千公噸二氧化碳當量，2011 年扣減量為 59 千公噸二氧化碳當量，2012 年扣減量為 63 千公噸二氧化碳當量，2013 年扣減量為 66 千公噸二氧化碳當量，2014 年扣減量為 67 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 1.52%。

C. 氧化亞氮

臺灣非能源使用燃料燃燒溫室氣體排放扣減量，1990 年按部門方法計算之燃料燃燒甲烷總排放扣減量為 34 千公噸二氧化碳當量，其後呈現逐年增加趨勢，至 2010 年為 161 千公噸二氧化碳當量，2011 年扣減量為 139 千公噸二氧化碳當量，2012 年扣減量為 149 千公噸二氧化碳當量，2013 年扣減量為 156 千公噸二氧化碳當量，2014 年扣減量為 158 千公噸二氧化碳當量，較 2013 年增加 1.58%。

(5) 完整性

請參照 3.2 節完整性論述。

3. 不確定性與時間序列的一致性

請參照 3.2 節不確定性與時間序列的一致性。




圖 3.2.38 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用燃料燃燒二氧化碳扣減量趨勢

4. QA/QC 及查證

請參照 3.2 節 QA/QC 及查證方法。

5. 特定排放源的重新計算

請參照 3.2 節特定排放源的重新計算規劃。

6. 特定排放源的改善計畫

請參照 3.2 節特定排放源改善計畫。

3.3 燃料逸散性排放

1. 統計範疇

依據國家清冊分類，我國逸散性排放指的是故意的或不經意的人為氣體排放，特別是來自於生產、製程、傳輸、儲存、及燃料的使用，亦包括非生產活動的燃燒排放，臺灣目前尚未統計此類活動。

表 3.2.31 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用二氧化碳扣減量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
非能源消費	13,835	15,048	15,759	17,373	18,587	20,608	21,225
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	13,835	15,048	15,759	17,373	18,587	20,608	21,225
運輸部門	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
非能源消費	21,430	23,092	24,054	26,638	39,257	41,004	46,412
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	21,430	23,092	24,054	26,638	39,257	41,004	46,412
運輸部門	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
非能源消費	48,801	47,950	49,074	61,093	60,228	63,524	67,008
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	48,801	47,950	49,074	61,093	60,228	63,524	67,008
運輸部門	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
非能源消費	58,824	62,002	66,469	67,672			
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	58,824	62,002	66,469	67,672			
運輸部門	0	0	0	0			
其他	0	0	0	0			




圖 3.2.39 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用燃料燃燒甲烷扣減量趨勢

表 3.2.32 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用甲烷扣減量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
非能源消費	15	16	17	19	20	22	22
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	15	16	17	19	20	22	22
運輸部門	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
非能源消費	22	24	25	28	41	43	50
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	22	24	25	28	41	43	50
運輸部門	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
非能源消費	51	50	51	63	61	64	68
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	51	50	51	63	61	64	68
運輸部門	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
非能源消費	59	63	66	67			
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	59	63	66	67			
運輸部門	0	0	0	0			
其他	0	0	0	0			




圖 3.2.40 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用燃料燃燒氧化亞氮扣減量趨勢

表 3.2.33 臺灣 1990 至 2014 年非能源使用氧化亞氮扣減量

(單位：千公噸二氧化碳當量)


溫室氣體排放源和吸收匯類別	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
非能源消費	34	37	38	43	46	50	51
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	34	37	38	43	46	50	51
運輸部門	15	16	16	18	27	30	30
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
非能源消費	52	56	58	66	96	101	116
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	52	56	58	66	96	101	116
運輸部門	33	30	32	37	77	76	86
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
非能源消費	120	118	120	148	144	150	161
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	120	118	120	148	144	150	161
運輸部門	94	91	92	117	119	125	134
其他	0	0	0	0	0	0	0
溫室氣體排放源和吸收匯類別	2011	2012	2013	2014			
非能源消費	139	149	156	158			
工業、轉變及能源部門 (石化原料用)	139	149	156	158			
運輸部門	114	124	131	134			
其他	0	0	0	0			

參考文獻

1. IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, 2006.
2. 行政院環境保護署，中華民國環境保護統計年報，2015。
3. 經濟部能源局，能源平衡表，2015。



第四章 工業製程及產品使用部門 (CRF Sector 2)

- 
- 4.1 部門概述
 - 4.2 礦業（非金屬製程）
 - 4.3 化學工業
 - 4.4 金屬製程
 - 4.5 燃料及溶劑使用的非能源產品
 - 4.6 電子工業
 - 4.7 破壞臭氧層物質之替代品使用
 - 4.8 其他產品之製造與使用
 - 4.9 其他
- 

第四章 工業製程及產品使用部門 (CRF Sector 2)

4.1 部門概述

有關臺灣工業製程及產品使用部門之溫室氣體排放情形，其排放源類別如表 4.1.1 所示，計 2.A「礦業（非金屬製程）」、2.B「化學工業」、2.C「金屬製程」、2.D「非能源產物燃料溶劑使用」、2.E「電子工業」、2.F「破壞臭氧層物質之替代品使用」、2.G「其他產品之製造與使用」、2.H「其他」等八項分類，估算二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物（Hydrofluorocarbons, HFCs）、全氟碳化物（Perfluorocarbons, PFCs）、六氟化硫（Sulfur Hexafluoride, SF₆）、三氟化氮（Nitrogen Trifluoride, NF₃）等七項溫室氣體種類。

臺灣 2014 年工業製程及產品使用部門排放量約 23,733 千公噸二氧化碳當量，以溫室氣體種類區分，主要排放為二氧化碳占 73.1%，其次為氧化亞氮占 6.4%、

六氟化硫占 5.7%、全氟碳化物占 5.5%、氫氟碳化物占 4.3%，如圖 4.1.1 所示；以排放源類別區分，主要排放源為礦業（非金屬製程）占 36.8%、金屬工業占 29.8%，如圖 4.1.2 所示。

臺灣 1990 至 2014 年工業製程部門排放量如表 4.1.2 及圖 4.1.3 所示，其中 2014 年溫室氣體排放量 23,733 千公噸二氧化碳當量，相較 2013 年 25,275 千公噸二氧化碳當量，減少 1,542 千公噸二氧化碳當量，約下降 6.1%。

4.2 礦業（非金屬製程）（2.A）

2.A「礦業（非金屬製程）」為工業製程及產品使用部門中排放量最高分類，其中又以 2.A.1「水泥生產」為排放量最高排放項目，與 2.A.2「石灰（氧化鈣）生產」、2.A.3「玻璃生產」、2.A.4「其他使用碳酸鹽製程」及 2.A.5「其他」等共計五項，主要排放溫室氣體種類為二氧化碳。2014 年礦業（非金屬製程）排放量約 8,728 千公噸二氧化碳當量，約占工業製程及產品使用部門 36.8%，1990 至 2014 年排放量如表 4.2.1 及圖 4.2.1 所示。

表 4.1.1 工業製程及產品使用部門次分類

排放源分類		CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃		
2.A 礦業 (非金屬製程)	2.A.1 水泥生產	○								
	2.A.2 石灰（氧化鈣）生產	生石灰生產	○							
		白雲石灰生產	NO							
	2.A.3 玻璃生產	○								
	2.A.4 其他使用碳酸鹽製程	製陶	NA							
		其他蘇打粉（純鹼）使用	○							
		其他	非冶鐵之氧化鎂生產	NO						
			石灰石 白雲石	○ ○						
	2.A.5 其他	○								
		玻璃纖維製品生產	○							
2.B 化學工業	2.B.1 氨生產	NO								
	2.B.2 硝酸生產			○						
	2.B.3 己二酸生產			NO						
	2.B.4 己內醯胺、乙二酸、乙醛酸生產			○,NO						
	2.B.5 電石生產	NO,○	NO							
	2.B.6 二氧化鈦生產	NO,○								
	2.B.7 碳酸鈉（純鹼）（蘇打）生產	NO,○								
	2.B.8 石化及碳黑生產	甲醇	NO,○							
		乙烯		○						
		氯乙烯	○	○						
		環氧乙烷	○	○						
		丙烯腈	○	○						
		碳煙 其他	○ ○	○ ○						
2.B.9 含氟化物生產				IE,NO,○						
2.B.10 其他		○								



表 4.1.1 工業製程及產品使用部門次分類

排放源分類		CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	
2.C 金屬製程	2.C.1 鋼鐵生產	高爐鋼胚	○	○	○				
		電弧爐鋼胚	○						
	2.C.2. 鐵合金生產	○	○						
	2.C.3. 原鋁生產	NO							
	2.C.4. 鎂生產						NE, ○		
	2.C.5. 鉛生產	NE, ○							
2.D 燃料及溶劑使用的非能源產品	2.D.1 合成潤滑油使用	○							
	2.D.2 石臘使用	○							
	2.D.4 其他	印刷油墨化學原料製造							
		塗料化學製造程序							
		製鞋業							
		纖維織物印染業使用							
印刷電路板製造程序									
2.E 電子工業	2.E.1 積體電路或半導體			NE, ○	NE, ○	NE, ○	NE, ○	NE, ○	
	2.E.2 TFT 平面顯示器			NE, ○		○	○	○	
	2.E.3 光電 (太陽能板)				IE	IE	IE		
	2.E.4 熱傳流體	NA							
	2.E.5 其他	NA							
2.F 破壞臭氧層物質之替代品使用	2.F.1 冷凍及空調	冷凍及固定式空調			NE, ○				
		移動式空調			NE, ○				
	2.F.2 發泡劑				NE				
	2.F.3 滅火劑				○				
	2.F.4 氣膠產品 (推進劑及溶劑)				NE				
	2.F.5 溶劑 (非氣膠)				NE				
2.F.6 其他應用									
2.G 其他產品之製造與使用	2.G.1 電子設備					IE	IE		
	2.G.2 其他產品使用 SF ₆ 及 PFCs					IE, ○	IE, ○		
	2.G.3 使用 N ₂ O 之產品	NE				NE	NE		
	2.G.4 其他					NE	NE		
2.H 其他	紙漿及造紙工業								
	食品及飲料工業	啤酒	○						
		肉、魚及家禽							
		砂糖							
		植物油及動物油							
		動物飼料							

- 說明：
- 本表僅針對聯合國政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 於 2006 年出版 2006 IPCC 國家溫室氣體排放清冊指南 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 以下簡稱 2006 IPCC 指南) 建議統計分類中, 其溫室氣體排放種類屬規範之七類氣體進行呈現, 並於各小節中詳細說明該分類製程、計算方法、及採用係數等; 其他雖屬指南建議統計分類, 如硫酸、溶劑使用等 12 項, 其排放溫室氣體種類因屬非甲烷揮發性有機物 (Non-Methane Volatile Organic Compounds, NMVOCs)、二氧化硫 (Sulphur Dioxide, SO₂) 等無法轉換或未受規範之溫室氣體, 無法納入溫室氣體排放統計結果, 故暫不進行呈現及說明。
 - 表格內容標示說明：
 - 灰底：指南未建議納入統計該氣體；
 - ○：已納入統計該氣體；
 - NO：我國該分類項目無生產或使用, 如停產；
 - IE：該分類項目排放量已作估計, 但列在清冊中其他分類項目；
 - NE：未調查估計該分類項目。
 - 部分項目標註兩項, 表示 1990 至 2013 年期間分類統計項目狀態改變, 如因純鹼生產所產生之二氧化碳, 於 2000 年停產後便無排放量, 故標註為“○,NO”。

生質能部分，考量生物固碳效果，生質燃料燃燒溫室氣體排放不包括在本部門排放總量，然仍進行數據揭露。至於廢棄物燃燒作為能源使用之排放，則須計算在本分類中；另依據 2006 IPCC 指南分類，用於國際空運與海運燃料的排放不應計算在國內排放總量內，應該分開予以計算。

4.2.1 水泥生產 (2.A.1)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查水泥生產過程中所產生之二氧化碳，製程係以石灰石加入黏土、矽砂、鐵渣等副原料混合製成生料，並將生料送入旋窯煅燒及燒結再生成熟料，加入石膏研磨後製成水泥，其中二氧化碳主要來自煅燒過程排放。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

A.1990 至 1993 年

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，因部分工廠已歇業無法調查取得熟料數據，以水泥產量及熟料進出口量推算熟料產量，再透過排放係數計算二氧化碳排放量。1990 至 1993 年國內生產水泥類型多為卜特蘭 I 型，水泥中熟料含量約 95%，計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = [\sum_i (\text{生產 } i \text{ 類水泥重量} \times i \text{ 類水泥的熟料比例}) - \text{熟料進口量} + \text{熟料出口量}] \times i \text{ 類水泥中熟料的排放係數}$$

B.1994 至 2014 年

參照 2006 IPCC 指南建議方法 2，活動數據採較水泥




圖 4.1.1 臺灣 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體種類排放占比




圖 4.1.2 臺灣 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放占比



表 4.1.2 臺灣 1990 至 2014 年工業製程及產品使用部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

部門 年份	礦業 (非金屬製程)	化學工業	金屬製程	燃料及溶劑使用的非 能源產品	電子工業	破壞臭氧層物質之 替代品使用	其他產品之製造 與使用	其他
1990	10,584	734	3,275	0.00006	NE	NE	IE	2
1991	10,698	896	3,737	0.00006	NE	NE	IE	2
1992	11,854	895	3,475	0.00006	NE	NE	IE	2
1993	13,879	1,672	3,889	0.00007	NE	NE	IE	2
1994	13,259	1,942	3,775	0.00009	NE	NE	IE	2
1995	12,766	2,005	3,885	0.00008	NE	NE	IE	2
1996	12,645	2,493	4,014	0.00008	NE	NE	IE	2
1997	13,394	2,882	5,046	0.00008	NE	NE	IE	2
1998	11,564	3,478	5,818	0.00009	NE	NE	IE	2
1999	10,746	3,008	5,333	0.00009	129	NE	IE	2
2000	10,486	4,100	5,734	0.00008	143	NE	IE	2
2001	9,974	4,531	4,960	0.00007	3,971	NE	IE	2
2002	10,648	4,232	5,123	0.00008	5,544	NE	1,943	2
2003	10,270	4,174	6,426	0.00009	6,212	401	1,943	2
2004	10,691	4,057	6,519	0.00011	6,841	682	2,053	2
2005	11,257	2,541	6,129	0.00010	5,986	996	1,503	2
2006	11,014	2,527	8,412	0.00007	6,423	896	770	2
2007	10,369	2,685	8,272	0.00007	6,024	922	953	2
2008	9,289	2,273	7,888	0.00007	3,987	928	895	2
2009	8,467	2,550	6,632	0.00006	3,463	812	703	2
2010	8,616	2,798	8,187	0.00005	3,929	770	295	2
2011	9,577	2,858	7,754	0.00004	3,787	881	282	2
2012	9,333	2,553	8,410	0.00004	3,169	783	186	2
2013	9,866	2,389	7,949	0.00005	4,115	812	142	2
2014	8,728	2,369	7,069	0.00006	4,714	828	24	2

備註：NE，代表未調查估計該分類項目；如考量該項目使用量小，故未進行調查；NO，代表我國無生產或使用，如停產；IE，代表該分類項目排放量已作估計，但列在清冊中其他分類項目。




表 4.2.1 臺灣 1990 至 2014 年礦業（非金屬製程）排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
2.A.1 水泥生產	9,093	9,535	10,333	11,676	11,129	10,930	10,611	10,644	9,975
2.A.2 石灰（氧化鈣）生產	286	317	362	350	346	337	413	422	430
2.A.3 玻璃生產	9	9	11	11	13	13	12	12	12
2.A.4 其他使用碳酸鹽製程	1,192	833	1,141	1,832	1,759	1,471	1,592	2,292	1,122
2.A.5 其他	4	4	7	9	12	15	17	23	26
總計	10,584	10,698	11,854	13,879	13,259	12,766	12,645	13,394	11,564
年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2.A.1 水泥生產	9,262	8,824	9,086	9,774	9,313	9,546	9,977	9,812	9,484
2.A.2 石灰（氧化鈣）生產	359	364	323	356	367	348	314	300	267
2.A.3 玻璃生產	11	12	10	11	11	12	13	13	17
2.A.4 其他使用碳酸鹽製程	1,086	1,252	513	465	533	737	906	839	550
2.A.5 其他	27	34	42	43	46	48	47	49	51
總計	10,746	10,486	9,974	10,648	10,270	10,691	11,257	11,014	10,369
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
2.A.1 水泥生產	8,504	7,865	8,105	8,512	7,996	8,030	7,088		
2.A.2 石灰（氧化鈣）生產	166	184	227	225	202	286	184		
2.A.3 玻璃生產	15	10	13	13	11	11	10		
2.A.4 其他使用碳酸鹽製程	557	372	228	777	1,074	1,493	1,399		
2.A.5 其他	47	37	43	50	50	47	47		
總計	9,289	8,467	8,616	9,577	9,333	9,866	8,728		




圖 4.2.1 臺灣 1990 至 2014 年礦業（非金屬製程）排放量趨勢

產量精準之熟料產量，並透過排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{水泥熟料產量 (噸)} \times \text{水泥熟料排放係數 (噸二氧化碳 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

透過水泥專家諮詢會決議，2006 IPCC 指南建議之排放係數 (0.520 噸二氧化碳 / 噸熟料生產) 符合臺灣水泥生產情況，以其作為我國水泥熟料之排放係數。

(3) 活動數據

1990 至 2013 年由水泥公會提供會員廠活動數據，進出口量來自國貿局進出口統計，2014 年起則由環保署國家溫室氣體登錄平台取得排放清冊，如表 4.2.2 所示。

(4) 排放量

水泥製程二氧化碳排放量與熟料產量 (經濟發展及產業政策) 有關，排放量 1997 年後因亞洲金融風暴而逐漸下降，2002 年因第 11 家水泥廠投產，故排放量增加，2006 年後因各廠減產及 2009 年金融風暴，排放量逐漸下降，如表 4.2.3 及圖 4.2.2 所示。

(5) 完整性

水泥熟料產量為水泥公會提供，包含國內全部生產熟料之水泥廠商，計算結果為完整國內廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國水泥生產製程排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

表 4.2.2 臺灣 1990 至 2014 年水泥熟料產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	17,478	18,325	19,861	22,442	21,391	21,007	20,393	20,457	19,172	17,802	16,961	17,464	18,787
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	17,900	18,347	19,175	18,858	18,229	16,344	15,116	15,578	16,360	15,369	15,433	13,623	

表 4.2.3 臺灣 1990 至 2014 年水泥生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	9,093	9,535	10,333	11,676	11,129	10,930	10,611	10,644	9,975	9,262	8,824	9,086	9,774
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	9,313	9,546	9,977	9,812	9,484	8,504	7,865	8,105	8,512	7,996	8,030	7,088	




圖 4.2.2 臺灣 1990 至 2014 年水泥生產排放量趨勢

參照 2006 IPCC 指南及經過水泥專家諮詢會邀請國內主要廠商代表檢視比對國內情況，結論如下：

A.1990 至 1993 年：因活動數據來源為僅能得到「水泥」項目，無法得知精確水泥「類型」比例；故假定國內所有的水泥產品都是卜特蘭水泥，不確定性為 35%；熟料的貿易數據不確定性為 10%，排放係數與 1994 至 2014 年相同，不確定性為 8.5%，合併不確定性約 43%。

B.1994 至 2014 年：因水泥生產活動數據各廠均有利用生熟比及質量平衡，精密的調整過最適之熟料量，且有經第三方認證，故可取不確定性為 2%；另外，各廠有進行石灰（CaO）的熟料化學分析且合理假設 CaO 全部來源為石灰石（CaCO₃），排放係數之不確定性為 3.6%，合併不確定性為 4.2%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 1993 年因部分工廠已歇業無法調查取得熟料數據，依據方法一採水泥產品計算二氧化碳排放量，1994 至 2014 年使用方法二，時間序列未一致，但資料來源及排放係數皆一致，並經時間序列檢核，方法一和方法二兩者趨勢一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

活動數據屬於民間提供，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.2.3 所示。




圖 4.2.3 工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計 QA/QC 流程（活動數據 - 民間來源）

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程部門溫室氣體排放量調查專家諮詢會 - 水泥生產檢視」，無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.2.2 生石灰（氧化鈣）生產（2.A.2）

1. 排放源及匯分類的描述：

本項統計生產生石灰（CaO）及白雲石灰（CaO·MgO）製程所產生的二氧化碳氣體；其中，因我國無白雲石灰製程，故本項僅統計生石灰生產之二氧化碳排放量。

二氧化碳主要來自原料石灰石（CaCO₃）於石灰窯中，高溫煅燒形成氧化鈣的過程中排放，其生成反應式如下：



2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以生石灰產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{生石灰產量 (噸)} \times \text{生石灰排放係數 (噸二氧化碳 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

採用行政院環境保護署計畫(2000)¹建置之排放係數 0.706 噸二氧化碳 / 噸生石灰生產，該排放係數係根據國內生石灰產量、製程實況及原料石灰石純度 90% 等實際情況推估求得。

(3) 活動數據

國內生石灰產量引用自經濟部統計處工業生產統計年報，如表 4.2.4 所示。

(4) 排放量

生石灰生產製程二氧化碳排放量與產量有關，自 1998 年達 430 千公噸二氧化碳當量高點後，整體有下降趨勢，2014 年排放量為 184 千公噸二氧化碳當量，如表 4.2.5 及圖 4.2.4 所示。

(5) 完整性

經濟部工業統計年報調查對象為全國廠商，屬於國家級統計數據，經計算之結果可代表臺灣生石灰生產製程排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

參照 2006 IPCC 指南，生石灰生產活動數據不確定性為 15%，排放係數為 15%，合併不確定性則為 21%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

表 4.2.4 臺灣 1990 至 2014 年生石灰產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	405	449	512	496	490	477	585	598	609	509	516	458	504
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	520	493	445	425	378	356	260	322	318	287	405	261	

表 4.2.5 臺灣 1990 至 2014 年生石灰生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	286	317	362	350	346	337	413	422	430	359	364	323	356
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	367	348	314	300	267	166	184	227	225	202	286	184	




圖 4.2.4 臺灣 1990 至 2014 年生石灰生產排放量趨勢

¹ 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

活動數據屬於官方數據，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.2.5 所示。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.2.3 玻璃生產 (2.A.3)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查玻璃生產過程中所產生之二氧化碳。二氧化碳主要來自玻璃原料石灰石 (CaCO_3)、白雲石 ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)、與純鹼 (Na_2CO_3) 之採掘過程及高溫化學反應。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，活動數據採經濟部統計處工業生產統計年報平板玻璃產量，並透過排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 玻璃產量 (噸) × 玻璃排放係數 (噸二氧化碳 / 噸產量)

(2) 排放係數

採 2006 IPCC 指南建議之排放係數，即 0.2 噸二氧化碳 / 噸玻璃生產，並考慮回收玻璃使用率 (86.77%)，故採用之排放係數為 $0.2 \times (1 - 0.8677) = 0.02646$ 。

(3) 活動數據

活動數據為經濟部統計處工業生產統計年報平板玻璃產量，如表 4.2.6 所示。

(4) 排放量

玻璃製程二氧化碳排放量與玻璃產量有關，排放量 1995 年後因亞洲金融風暴而逐漸下降，2001 年降至最低後逐漸上升至 2007 年最高點 17 千公噸二氧化碳當量，並於 2009 年金融風暴後排放量再度降至最低，近兩年排放量維持約 11 千公噸二氧化碳當量，如表 4.2.7 及圖 4.2.6 所示。

(5) 完整性

玻璃產量為經濟部統計處工業生產統計年報公布數值，為我國主要廠商製程產量，故計算結果為國內主要廠商製程排放量，可代表我國玻璃生產製程排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性




圖 4.2.5 工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計 QA/QC 流程 (活動數據 - 官方數據)

參照 2006 IPCC 指南，估算排放量採方法 1，以玻璃產量質量計算活動數據，並無使用其他單位估算（例如：片），故活動數據不確定性為 5%，排放係數不確定性可能受碎玻璃影響，故設定為 60%，合併不確定性則為 60%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2013 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經工業製程部門溫室氣體排放量調查專家小組會議檢視，無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.2.4 其他使用碳酸鹽製程 (2.A.4)

4.2.4.1 製陶 (2.A.4.a)

二氧化碳產生於製陶材料中碳酸鹽的煅燒，以及將石灰石用作熔劑，此部分活動數據尚無法分類出碳酸鹽使用量，故暫時無法估算。

4.2.4.2 其他蘇打粉 (純鹼) 使用 (2.A.4.b)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項統計純鹼使用產生的二氧化碳氣體，純鹼用途廣泛，工業常使用於玻璃、肥皂、造紙及水處理等製程。

表 4.2.6 臺灣 1990 至 2014 年平板玻璃產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
玻璃產量	355	355	426	421	491	509	442	441	437	432	457	376	403
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
玻璃產量	412	458	484	509	632	580	379	479	479	399	405	391	

表 4.2.7 臺灣 1990 至 2014 年玻璃生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	9	9	11	11	13	13	12	12	12	11	12	10	11
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	11	12	13	13	17	15	10	13	13	11	11	10	




圖 4.2.6 臺灣 1990 至 2014 年玻璃生產排放量趨勢

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以純鹼使用量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下，其中，使用量計算方法詳見活動數據敘述。

$\text{二氧化碳排放量} = \text{純鹼使用量 (噸)} \times \text{純鹼使用排放係數 (噸二氧化碳 / 噸使用量)}$

(2) 排放係數

引用行政院環境保護署計畫 (2005)² 以質量平衡推估之排放係數 0.415 噸二氧化碳 / 噸純鹼使用。

(3) 活動數據

純鹼使用量計算方法為生產量加上進口量，並扣除出口量；其中，生產量係引用自經濟部統計處工業生產統計年報（國內唯一生產廠商東南鹼業於 2000 年停止生產），進出口量則來自國貿局進出口統計，如表 4.2.8。

(4) 排放量

純鹼使用 1990 至 1993 年排放量約維持 100 千公噸二氧化碳當量，1994 至 2000 年上升，約維持 120 千公噸二氧化碳當量，2000 年因純鹼停產，排放量逐漸下降，2003 年因進口量少，排放量也隨之降低，2004 年後進口量增加，排放量再度上升，如表 4.2.9 及圖 4.2.7 所示。

表 4.2.8 臺灣 1990 至 2014 年純鹼使用量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	238	236	246	250	297	291	286	294	286	293	301	286	251
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	172	270	274	278	271	113	219	268	275	259	248	236	

表 4.2.9 臺灣 1990 至 2014 年純鹼使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	99	98	102	104	123	121	119	122	119	122	125	119	104
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	71	112	114	115	113	113	91	111	114	108	103	98	




圖 4.2.7 臺灣純鹼使用 1990 至 2014 年排放量趨勢

2 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

(5) 完整性

經濟部統計處工業統計年報、國貿局進出口統計調查對象皆為全國為對象，屬於國家級統計數據，經計算之結果可代表我國純鹼使用排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 IPCC 2006 版指南，活動數據來自系統化之調查結果，不確定性建議值為 5%，排放係數不確定性建議值因指南未提供，暫無法納入計算，故參考日本工業製程與產品部門本項之不確定性，活動數據不確定性為 7.1%，排放係數不確定性為 15%，合併不確定性為 17%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.2.4.3 非冶鐵之氧化鎂生產 (2.A.4.c)

依據經濟部工業局（民生化工組）提供資料，國內已無生產氧化鎂。

4.2.4.4 其他 (2.A.4.d)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項統計使用石灰石 (CaCO_3) 與白雲石 ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) 所產生的二氧化碳氣體，石灰石與白雲石主要應用於工業製程，如煉鋼製程中燒結程序及造紙製程中皆會加入石灰石或白雲石作為熔劑，以去除雜質。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以石灰石與白雲石使用量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式分別如下，其中，使用量計算說明詳見活動數據。

二氧化碳排放量 = 石灰石使用量 (噸) × 石灰石使用排放係數 (噸二氧化碳 / 噸使用量)

二氧化碳排放量 = 白雲石使用量 (噸) × 白雲石使用排放係數 (噸二氧化碳 / 噸使用量)

(2) 排放係數

採用行政院環境保護署計畫 (2000)³ 建置之二氧化碳排放係數，該係數係根據質量平衡、石灰石及白雲石純度 90% 等實際情況建置，分別為 0.396 噸二氧化碳 / 噸石灰石使用、0.429 噸二氧化碳 / 噸白雲石使用。

(3) 活動數據

石灰石與白雲石 1990 至 2014 年使用量如表 4.2.10 所示；其中，2003 及 2004 年白雲石因鋼鐵公司使用量大於產銷量及進口量，計算結果為負值，故該年度使用量修正為 0 千公噸。

A.1990 至 2000 年

石灰石 1990 至 2000 年因鋼鐵公司未建立排放清冊，無法依原方法計算其使用量，故改引用行政院環境保護署「固定空氣污染源資料庫」中石灰石銷售量；其中，於資料庫系統中之石灰石銷售量包含「大理石」銷售量，故石灰石使用量恐為高估值。

白雲石 1990 至 2000 年未修正活動數據計算方法，僅忽略扣除鋼鐵公司使用量。

B.2001 至 2014 年

2001 至 2014 年石灰石與白雲石使用量計算方法相同，皆以銷售量加上進口量扣除出口量及鋼鐵製程使用量，以避免重複計算；其中，銷售量引用經濟部統計處工業生產統計年報，進出口量來自國貿局進出口統計，鋼鐵製程使用量則引用鋼鐵公司排放清冊。

(4) 排放量

石灰石與白雲石使用之 1990 至 2014 年排放量如表 4.2.11 及圖 4.2.8 所示。

³ 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

A.1990 至 2000 年

由於活動數據來源差異，造成石灰石使用 1990 至 2000 年排放量整體高於 2001 至 2014 年，而 1990 至 2000 年排放趨勢無一致性，僅 1993 至 1996 年間約介於 1,500 千公噸二氧化碳當量。

1990 至 2000 年白雲石使用因未扣除鋼鐵製程使用量，整體二氧化碳排放量略高於 2001 至 2014 年，1990 至 1993 年間排放量約介於 110 千公噸二氧化碳當量，並於 1994 年後下降，1997 年後排放量上升維持約 70 至 100 千公噸二氧化碳當量。

B.2001 至 2014 年

石灰石使用之二氧化碳排放量遠高於白雲石使用，其中石灰石排放量 2002 至 2005 年為上升趨勢，2006 年後下降，2008 至 2009 年金融海嘯期間降至最低，而近年排放量又再度上升。而白雲石使用歷年排放趨勢較無一致性，排放量整體低於 50 千公噸二氧化碳當量，但於金融風暴後大幅上升。

(5) 完整性

本項目活動數據皆係以全國為調查對象，但因活動數據來源變更，石灰石使用 1990 至 2000 年二氧化碳排放量整體高於 2001 至 2014 年，對調查結果已造成影響。

表 4.2.10 臺灣 1990 至 2014 年石灰石與白雲石使用量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
石灰石	2,725	1,570	2,346	4,075	3,871	3,232	3,633	5,267	2,350	2,187	2,725	866	825
白雲石	262	265	255	267	239	164	82	197	170	229	110	120	80
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
石灰石	1,345	1,579	1,917	1,792	1,028	976	701	116	1,219	1,657	2,500	2,819	
白雲石	0	0	79	32	72	136	8	165	421	722	931	430	

表 4.2.11 臺灣 1990 至 2014 年石灰石與白雲石使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
石灰石	1,079	622	929	1,614	1,533	1,280	1,439	2,086	931	866	1,079	343	327
白雲石	112	114	109	115	103	70	35	85	73	98	47	52	34
總計	1,192	735	1,038	1,728	1,636	1,350	1,474	2,170	1,004	964	1,127	394	361
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
石灰石	533	619	759	710	407	387	278	46	483	656	990	1,116	
白雲石	NO	NO	34	14	31	58	3	71	181	310	400	185	
總計	533	619	793	724	438	445	281	117	663	966	1,390	1,301	

備註：NO，代表我國該分類項目無生產或使用。




圖 4.2.8 臺灣 1990 至 2014 年石灰石與白雲石使用排放量趨勢

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，活動數據來自系統化之調查結果，不確定性建議值為 5%，排放係數不確定性建議值因指南未提供，暫無法納入計算，故參考日本工業製程與產品部門本項之不確定性，石灰石使用之活動數據不確定性為 9.2%，排放係數不確定性為 16.5%，合併不確定性為 19%；白雲石使用之活動數據不確定性為 9.2%，排放係數不確定性為 3.4%，合併不確定性為 10%。

(2) 時間序列的一致性

因無法依 2001 至 2014 年方法取得 1990 至 2000 年活動數據，兩段時間區間活動數據來源不同，故時間序列無一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.2.5 其他 (2.A.5)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項統計使用玻璃纖維製品（含棉、紗、紗束、切股、切股氈）生產所產生的二氧化碳氣體，二氧化碳主要來自玻璃原料石灰石（CaCO₃）、白雲石（CaMg（CO₃）₂）、與純鹼（Na₂CO₃）之採掘過程及高溫化學反應。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以玻璃纖維製品生產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{玻璃纖維製品生產量 (噸)} \times \text{玻璃纖維製品生產排放係數 (噸二氧化碳 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

採用行政院環境保護署計畫（2000）⁴ 建置之二氧化碳排放係數，為 0.19 噸二氧化碳 / 噸玻璃纖維製品生產。

(3) 活動數據

由經濟部統計處工業生產統計年報提供玻璃纖維製品生產量，玻璃纖維製品 1990 至 2014 年生產量如表 4.2.12 所示。

(4) 排放量

玻璃纖維製品二氧化碳排放量與產量有關，排放量由 1990 年逐年上升至 2007 年後因金融風暴而逐漸下降，近 3 年約維持在 50 千公噸二氧化碳當量，玻璃纖維製品生產之 1990 至 2014 年排放量如表 4.2.13 及圖 4.2.9 所示。

表 4.2.12 臺灣 1990 至 2014 年玻璃纖維製品生產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
玻璃纖維製品生產量	18	18	39	45	61	78	90	123	136	143	179	220	225
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
玻璃纖維製品生產量	242	252	250	259	270	248	195	226	264	262	248	250	

表 4.2.13 臺灣 1990 至 2014 年玻璃纖維製品生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
玻璃纖維製品生產量	4	4	7	9	12	15	17	23	26	27	34	42	43
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
玻璃纖維製品生產量	46	48	47	49	51	47	37	43	50	50	47	47	

4 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

(5) 完整性

經濟部統計處工業統計年報調查對象為全國廠商，屬於國家級統計數據，經計算之結果可代表我國玻璃纖維製品生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3.1-3 (1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3 化學工業 (2.B)

「化學工業」排放量較其他分類低，分類項目包括「氨生產」(2.B.1)、「硝酸生產」(2.B.2)、「己二酸生產」(2.B.3)、「己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產」

(2.B.4)、「電石生產」(2.B.5)、「二氧化鈦生產」(2.B.6)、「碳酸鈉(純鹼)(蘇打)生產」(2.B.7)、「石化及碳黑生產」(2.B.8)、「含氟化物生產」(2.B.9)、「其他」(2.B.10)等共計 10 項，排放溫室氣體種類包含二氧化碳、甲烷、氧化亞氮及全氟碳化物等共計四項。2013 年總部門排放量約 2,389 千公噸二氧化碳當量，約占工業製程及產品使用部門 9.0%，1990 至 2013 年排放量如表 4.3.1 及圖 4.3.1 所示。

4.3.1 氨生產 (2.B.1)

本項目為統計氨化學生產製程二氧化碳排放量，調查活動數據為「液氨產量」，經詢問酸鹼工業同業公會(以下簡稱「酸鹼公會」)，國內無廠商製造生產液氨，故本項目無溫室氣體排放。

4.3.2 硝酸生產 (2.B.2)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項調查硝酸製程所產生之氧化亞氮，國內採氨氧化法製程，以無水氨為原料，經觸媒氧化、冷凝後再以水吸收成硝酸，其中，氧化亞氮主要來自於吸收塔產生之尾氣。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以硝酸產量及排放係數計算氧化亞氮排放量。計算公式如下：




圖 4.2.9 臺灣 1990 至 2014 年玻璃纖維製品生產排放量趨勢



表 4.3.1 臺灣 1990 至 2014 年化學工業排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
2.B.1 氮生產	NO								
2.B.2 硝酸生產	166	177	159	165	152	175	186	207	199
2.B.3 己二酸生產	NO								
2.B.4 己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產	NO	175	167	136	165	170	0	167	184
2.B.5 電石生產	43	42	43	43	43	42	42	42	40
2.B.6 二氧化鈦生產	NO	NO	NO	NO	36	80	103	126	113
2.B.7 碳酸鈉(純鹼)(蘇打)生產	12	12	10	8	8	7.95	8	6	4
2.B.8 石化及碳黑生產	523	500	525	571	688	735	855	860	857
2.B.9 含氟化物生產	NO	NO	NO	755	855	801	1,305	1,477	2083
2.B.10 其他	2	2	2	2	2	2	2	2	2
總計	734	734	734	1,672	1,942	2,005	2,493	2,882	3,478
年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2.B.1 氮生產	NO								
2.B.2 硝酸生產	148	104	165	187	187	191	210	188	216
2.B.3 己二酸生產	NO								
2.B.4 己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產	164	521	548	556	644	643	750	781	780
2.B.5 電石生產	34	23	0	18	12	0	0	NO	NO
2.B.6 二氧化鈦生產	128	139	139	146	165	170	177	191	206
2.B.7 碳酸鈉(純鹼)(蘇打)生產	4	4	NO						
2.B.8 石化及碳黑生產	921	989	1106	1162	1222	1338	1397	1361	1473
2.B.9 含氟化物生產	1609	2319	2567	2157	1937	1710	NO	NO	NO
2.B.10 其他	4	5	6	6	6	6	6	6	9
總計	3,008	4,100	4,531	4,232	4,174	4,057	2,541	2,527	2,685
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
2.B.1 氮生產	NO								
2.B.2 硝酸生產	196	190	206	203	194	154	207		
2.B.3 己二酸生產	NO								
2.B.4 己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產	587	816	964	992	822	626	521		
2.B.5 電石生產	NO								
2.B.6 二氧化鈦生產	200	211	233	216	134	181	206		
2.B.7 碳酸鈉(純鹼)(蘇打)生產	NO								
2.B.8 石化及碳黑生產	1281	1323	1386	1440	1394	1418	1,425		
2.B.9 含氟化物生產	NO								
2.B.10 其他	8	9	10	8	9	10	10		
總計	2,273	2,550	2,798	2,858	2,553	2,389	2,369		

備註：1.NO，代表我國該分類項目無生產或使用，如停產；2.NE，代表未調查估計該分類項目。




圖 4.3.1 臺灣 1990 至 2014 年化學工業排放量趨勢

氧化亞氮排放量 = 硝酸產量 (噸) × 硝酸排放係數 (噸氧化亞氮 / 噸產量)

(2) 排放係數

根據行政院環境保護署計畫 (2000)⁵，國內硝酸廠無針對氧化亞氮進行分析，計畫建議採用 AP-42 係數，為 5.31 公斤氧化亞氮 / 噸硝酸生產。

(3) 活動數據

酸鹼公會僅可提供 2001 至 2014 年硝酸產量，故 1990 至 2000 年活動數據改引用經濟部統計處工業生產統計年報，經比對後確認兩方來源產量數據一致，硝酸 1990 至 2014 年產量如表 4.3.2 所示：

(4) 排放量

硝酸生產排放量自 1990 年排放 166 千公噸二氧化碳當量逐步上升至 1997 年 207 千公噸二氧化碳當量，1998

年受亞洲金融海嘯影響而逐漸下降，2001 年起排放量回升後約介於 180 至 210 千公噸二氧化碳當量，如表 4.3.3 及圖 4.3.2 所示。

(5) 完整性

經濟部統計處工業生產統計年報以全國為調查對象，酸鹼公會則係提供會員廠資料，但已確認兩方數據來源數據一致，經計算之結果完整性無缺失問題。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

參照 2006 IPCC 指南，硝酸生產活動數據不確定性為 5%，排放係數為 10%，合併不確定性則為 11%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2000 及 2001 至 2014 年數據來源不同，但已確認兩方數據一致，無影響時間序列一致性。

表 4.3.2 臺灣 1990 至 2014 年硝酸產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	111	119	107	111	102	118	125	139	134	99	70	111	126
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	126	128	141	126	145	132	128	138	136	130	103	139	

表 4.3.3 臺灣硝酸生產 1990 至 2014 年排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	166	177	159	165	152	175	186	207	199	148	104	165	187
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	187	191	210	188	216	196	190	206	203	194	154	207	




圖 4.3.2 臺灣 1990 至 2014 年硝酸生產排放量趨勢

5 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。



4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

活動數據 1990 至 2000 年屬於官方數據，2001 至 2014 年則屬民間提供，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.3.3 所示。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.3 己二酸生產 (2.B.3)

本項目為統計己二酸生產製程氧化亞氮排放量，經詢問酸鹼公會，國內無生產己二酸，故本項目無氧化亞氮排放。

4.3.4 己內醯胺、乙二醛、乙醛酸生產 (2.B.4)

經詢問臺灣區石油化學同業公會（以下簡稱石化公會），國內僅己內醯胺生產，無乙二醛及乙醛酸之相關生產資料，故本項目僅針對「己內醯胺生產」進行詳述。

1. 排放源及匯分類的描述：

己內醯胺的所有製程均以甲苯或苯為基礎，主要用於生產尼龍-6 纖維和塑膠單體。例如 DSM/HPO 製程係

以苯為原料，再以硫酸為催化劑進行貝克曼重組，是目前應用最廣泛的製程。製程二氧化碳、二氧化硫和 NMVOC 在管理良好工廠中排放量不大，主要排放溫室氣體是氧化亞氮。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

1990 至 2007 年排放量採 2006 IPCC 指南建議方法 1，以活動數據乘排放係數計算。

2008 至 2014 年因國內廠商提供清冊，則參照方法 3，直接量測氧化亞氮排放，故無計算公式。

(2) 排放係數

1990 至 2007 年排放量採本土排放係數 0.0102 噸氧化亞氮 / 噸產量計算。2008 至 2014 年參照 2006 IPCC 指南建議方法 3，直接量測氧化亞氮排放，故無排放係數。

(3) 活動數據

1990 至 2007 年活動數據為國內廠商提供己內醯胺生產量。2008 至 2014 年參照 2006 IPCC 指南建議方法 3，直接量測氧化亞氮排放，故無活動數據。

(4) 排放量

己內醯胺生產排放量由 1990 減少至 2014 年 521 千公噸二氧化碳當量，己內醯胺生產之 1990 至 2014 年排放量如表 4.3.4 及圖 4.3.4 所示。




圖 4.3.3 工業製程及產品使用部門溫室氣體排放統計 QA/QC 流程（活動數據 - 官方數據、民間來源）

(5) 完整性

本項目活動數據皆係以國內唯一兩家己內醯胺生產廠商提供，統計之排放量可代表國內己內醯胺生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，排放量彙整自國內生產廠商清冊，整體合併不確定性為 10.77%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2007 年與 2008 至 2014 年統計方法不同，但兩段時間區間活動數據來源相同，故時間序列呈一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.5 電石生產 (2.B.5)

1. 排放源及匯分類的描述：

電石包含碳化矽 (SiC) 及碳化鈣 (CaC₂)，原料為用於矽砂、石英及石油焦，其生產過程中會產生二氧化碳、甲烷、一氧化碳、二氧化硫等氣體排放，本項僅統計二氧化碳及甲烷。碳化矽為重要人造研磨劑，碳化鈣用於乙炔生產、氨脲製造及電弧爐煉鋼中之還原劑。國內碳化矽已停產，原生產碳化鈣之台塑公司也於 2004 年停產，故以下僅描述碳化鈣生產。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以碳化鈣產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式分別如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{碳化鈣產量 (噸)} \times \text{碳化鈣排放係數 (噸二氧化碳 / 噸生產量)}$$

表 4.3.4 臺灣 1990 至 2014 年己內醯胺生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	NO	175	167	136	165	170	0	167	184	164	521	548	556
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	644	643	750	781	780	587	816	964	992	822	626	521	

備註：NO，代表我國該分類項目無生產或使用。




圖 4.3.4 臺灣 1990 至 2014 年己內醯胺生產排放量趨勢



(2) 排放係數

依據行政院環境保護署計畫(2000)⁶，碳化鈣排放係數為 1.09 噸二氧化碳 / 噸碳化鈣生產。

(3) 活動數據

國內碳化鈣已停產，原生產碳化鈣之臺灣塑膠工業股份有限公司(以下簡稱台塑)也於 2001 年停產，碳化鈣生產量由台塑提供，如表 4.3.5。

(4) 排放量

碳化鈣使用 1990 至 1998 年排放量約維持 42 千公噸二氧化碳當量，1999 年後逐漸下降，2001 年後停產，如表 4.3.6 及圖 4.3.5 所示。

(5) 完整性

數據來自國內唯一生產碳化鈣廠商，經計算之結果可代表我國碳化鈣使用排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，活動數據為工廠級數據，其不確定性為 5%；排放係數之不確定性因考量製程中石油焦揮發，IPCC 建議不確定性為 10%，合併總不確定性為 11%。

表 4.3.5 臺灣 1990 至 2014 年碳化鈣產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
碳化鈣產量	39	39	40	39	40	39	39	39	37	31	21	NO	NO
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
碳化鈣產量	NO												

備註：NO，代表碳化鈣於 2001 年起停產，故無排放源發生。

表 4.3.6 臺灣 1990 至 2014 年碳化鈣使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
碳化鈣排放量	43	42	43	43	43	42	42	42	40	34	23	NO	NO
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
碳化鈣排放量	NO												

備註：NO，代表碳化鈣於 2001 年起停產，故無排放源發生。




圖 4.3.5 臺灣 1990 至 2000 年碳化鈣使用排放量趨勢

⁶ 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.6 二氧化鈦生產 (2.B.6)

1. 排放源及匯分類的描述：

二氧化鈦 (TiO₂) 是常見白色色素之一。主要用途是油漆製造，其次是造紙、塑膠、墨水等，二氧化鈦產品通常指二氧化鈦類，範圍適用鈦礦渣、合成金紅石 (>90 % 二氧化鈦)、金紅石型二氧化鈦。本項統計國內以氯化金紅石方法生產二氧化鈦所造成之二氧化碳排放。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以活動數據乘排放係數計算，計算公式如下所示：

二氧化碳排放量 = 二氧化鈦產量 (噸) × 二氧化鈦排放係數 (噸二氧化碳 / 噸生產量)

表 4.3.7 臺灣 1990 至 2014 年二氧化鈦產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
二氧化鈦產量	NO	NO	NO	NO	27	59	77	94	84	95	104	103	109
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
二氧化鈦產量	123	127	132	143	154	149	157	174	161	100	135	154	

備註：NO，代表二氧化鈦於 1990 至 1993 年未生產，故無排放源發生。

表 4.3.8 臺灣 1990 至 2014 年二氧化鈦生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
二氧化鈦排放量	NO	NO	NO	NO	36	80	103	126	113	128	139	139	146
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
二氧化鈦排放量	NO												

備註：NO，代表二氧化鈦於 1990 至 1993 年未生產，故無排放源發生。

(2) 排放係數

採用 2006 IPCC 指南建議係數 1.34 噸二氧化碳 / 噸二氧化鈦生產。

(3) 活動數據

1990 至 2014 年二氧化鈦產量由國內唯一一家廠商 (臺灣杜邦) 提供，二氧化鈦 1990 至 1993 年未生產，1994 年起由 27 千公噸逐年增加至 2010 年達 174 千公噸後呈現波動狀態，2014 年產量為 154 千公噸，如表 4.3.7。

(4) 排放量

二氧化鈦生產由 1993 年持續上升至 2010 年 233 千公噸二氧化碳當量，2014 年排放量為 206 千公噸二氧化碳當量，約占總部門排放量 0.8%，如表 4.3.8 及圖 4.3.6 所示。

(5) 完整性

二氧化鈦產量數據由國內唯一一家廠商提供，經計算之結果可代表我國二氧化鈦生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3.(1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.7 碳酸鈉（純鹼 / 蘇打）生產（2.B.7）

1. 排放源及匯分類的描述：

本項統計純鹼製程產生的二氧化碳氣體，製程依原料不同區分為天然礦物製造及人工合成兩種；東南鹼業為過去國內唯一純鹼生產廠商，使用製程為人工合成方式，係以二氧化碳、鹽水、石灰石、焦炭及氨水等原料經一連串化學反應生成純鹼。

2. 方法論議題：

（1）計算方法

參照 2006IPCC 指南建議方法 1，以純鹼產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{純鹼產量（噸）} \times \text{純鹼排放係數（噸二氧化碳 / 噸產量）}$$

（2）排放係數

根據行政院環境保護署計畫（2000）⁷，由於二氧化碳為純鹼製程原料之一，且東南鹼業工廠另外生產碳酸氫鈉（NaHCO₃）吸收過量二氧化碳，排放係數理論為 0 噸二氧化碳 / 噸純鹼生產，但為避免低估純鹼生產排放量，仍引用 IPCC 2006 版建議排放係數 0.097 噸二氧化碳 / 噸純鹼生產。

（3）活動數據

純鹼產量引用自經濟部統計處工業生產統計年報，如表 4.3.9 所示，國內唯一生產廠商東南鹼業已於 2000 年停止生產。




圖 4.3.6 臺灣 1990 至 2014 年二氧化碳生產排放量趨勢

表 4.3.9 臺灣 1990 至 2014 年純鹼生產產量

（單位：千公噸）

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	128	119	100	83	84	82	82	60	44	39	44	NO	NO
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	NO												

⁷ 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

(4) 排放量

由於純鹼製程中二氧化碳為原料之一，可回流再利用於製程中，故二氧化碳排放量較其他項目低，其排放量自1990年起統計即為逐漸下降趨勢，至2000年後完全停產後無排放量，如表4.3.10及圖4.3.7所示。

(5) 完整性

經濟部統計處工業統計年報調查對象為全國廠商，屬於國家級統計數據，經計算之結果可代表我國純鹼生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據2006 IPCC版指南，活動數據來自系統化之調查結果，不確定性建議值為5%，排放係數不確定性建議值因指南未提供，暫無法納入計算，故總部門排放量不確定性為5%。

(2) 時間序列的一致性

1990至2014年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.8 石化及碳黑生產 (2.B.8)

石油化工以化石燃料或石油提煉產品做為原料，本節包含甲醇、乙烯、氯乙烯和丙烯腈生產估算排放說明。另外，碳黑為非石化產品，但因碳黑生產過程中使用化石原料，故納入此節說明。

4.3.8.1 甲醇 (2.B.8.a)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查甲醇製程產生之甲烷，其來源與其他石化產品製程類似，主要來自於設備元件逸散及製程尾氣，

表 4.3.10 臺灣 1990 至 2014 年純鹼生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	12.39	11.51	9.72	8.01	8.17	7.95	7.94	5.83	4.23	3.80	4.22	NO	NO
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

備註：NO，代表純鹼於2001年起停產，故無排放源發生。




圖 4.3.7 臺灣 1990 至 2000 年純鹼生產排放量

但尾氣會回流作為燃料，因此排放量較低，故甲烷主要排放源仍為製程逸散。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 IPCC 指南建議方法 1，以甲醇產量及排放係數計算甲烷排放量。計算公式如下：

甲烷排放量 = 甲醇產量 (噸) × 甲醇排放係數 (公噸甲烷 / 噸產量)

(2) 排放係數

參照行政院環境保護署計畫 (2000)⁸ 建議之排放係數 2.0 公斤甲烷 / 噸甲醇生產，即我國高雄市環保局根據甲醇廠生產實況推估建置。

(3) 活動數據

甲醇產量由石化公會提供，相關廠商已於 1999 年起停產，如表 4.3.11 所示：

(4) 排放量

甲醇排放量較其他石化產品項目低，且無一致性趨勢，1999 年因廠商停產後便無排放量，如表 4.3.12 及圖 4.3.8 所示。

(5) 完整性

甲醇產量由石化公會提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國甲醇生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3. (1)。

表 4.3.11 臺灣 1990 至 2014 年甲醇產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	38	5	NO	13	25	49	46	47	22	NO	NO	NO	NO
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	NO												

備註：NO，代表甲醇於 1999 年起停產，故無排放源發生。

表 4.3.12 臺灣 1990 至 2014 年甲醇生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	1.58	0.22	NO	0.55	1.03	2.07	1.92	1.97	0.93	NO	NO	NO	NO
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	NO												

備註：NO，代表甲醇於 1999 年後停產，故無排放源發生。




圖 4.3.8 臺灣 1990 至 1998 年甲醇生產排放量趨勢

⁸ 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

(2) 時間序列的一致性

1990~2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.1-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.8.2 乙烯 (2.B.8.b)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查乙烯製程所產生之甲烷，製程主要為乙烷經裂解、蒸餾、壓縮、去乙烷及精餾後得到乙烯，甲烷主要來自於設備元件逸散及製程尾氣，但尾氣一般會經壓縮後導回作為燃料，因此排放量較低，其甲烷主要排放源仍為製程逸散。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 IPCC 指南建議方法 1，以乙烯產量及排放係數計算甲烷排放量。計算公式如下：

$$\text{甲烷排放量} = \text{乙烯產量 (噸)} \times \text{乙烯排放係數 (公斤甲烷 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

採用行政院環境保護署計畫 (2000)⁹ 建置係數 0.01078 公斤甲烷 / 噸乙烯生產；此係數係以全廠排放量及乙烯產量求得全廠排放係數後，依據甲烷所占比例進行 speciate 系統區分甲烷排放量後求得。

(3) 活動數據

由石化公會提供乙烯產量，如表 4.3.13 所示：

(4) 排放量

我國乙烯產量雖大，但其排放量相較其他項目仍屬較低，其排放趨勢為階段成長；1990 至 1998 年介於 33 至 41 千公噸二氧化碳當量，1999 年台塑六輕投入生產，2001 年上升至 111 千公噸二氧化碳當量，2007 年六輕四期完工，2007 年排放量再上升至 158 千公噸二氧化碳當量，2010 受到金融海嘯影響下降至 134 千公噸二氧化碳當量，2011 年後於 160 至 180 千公噸間變化，約占總部門排放量 0.05%，如表 4.3.14 及圖 4.3.9 所示。

(5) 完整性

乙烯產量由石化公會提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國乙烯生產排放量。

表 4.3.13 臺灣 1990 至 2014 年乙烯產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	779	709	734	742	889	874	910	959	935	1,296	1,592	2,584	2,393
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	2,900	2,864	2,900	2,888	3,666	3,623	3,852	3,929	3,522	3,748	3,925	4,182	

表 4.3.14 臺灣 1990 至 2014 年乙烯生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	33	30	32	32	38	38	39	41	40	56	68	111	103
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	125	123	125	124	158	156	181	134	175	161	169	180	

9 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

參照 IPCC 「良好作法指南 (Good Practice Guidance)」及不確定性管理 (Uncertainty Management)¹⁰ (以下簡稱 2000 GPG)，乙烯生產活動數據不確定性為 5%，排放係數為 77%，合併不確定性則為 77%；因乙烯生產造成之溫室氣體排放量占總部門不到 0.1%，故對整體不確定性影響極低。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.8.3 氯乙烯 (2.B.8.c)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查氯乙烯製程所產生之二氧化碳及甲烷，製程主要為乙烯與氯產生二氯乙烷，二氯乙烷裂解產生

氯乙烯單體，二氧化碳主要來自於氧氯化過程中產生的副產物。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以氯乙烯產量及排放係數計算二氧化碳及甲烷排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{氯乙烯產量 (噸)} \times \text{氯乙烯排放係數 (噸二氧化碳 / 產量噸數)}$$

$$\text{甲烷排放量} = \text{氯乙烯產量 (噸)} \times \text{氯乙烯排放係數 (噸甲烷 / 產量噸數)}$$

(2) 排放係數

採用 2006 IPCC 指南建議係數 0.196 噸二氧化碳 / 氯乙烯生產噸數及 0.0000226 噸甲烷 / 氯乙烯生產噸數。

(3) 活動數據

由石化公會提供氯乙烯產量，如表 4.3.15 所示：

(4) 排放量

氯乙烯生產排放量與產量有關，氯乙烯由 1990 年 149 千公噸二氧化碳當量逐年上升至 2005 年 399 千公噸二氧化碳當量，之後於 300 至 450 千公噸二氧化碳當量排放量間震盪，約占總部門排放量 1.3%，如表 4.3.16 及圖 4.3.10 所示。

(5) 完整性

氯乙烯產量由石化公會提供，計算結果為國內主要




圖 4.3.9 臺灣 1990 至 2014 年乙烯生產排放量趨勢

¹⁰ IPCC, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000.

廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國氯乙烯生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

參照 2006 IPCC 指南建議，活動數據若為「產量」，建議不確定性為 20%；考量氯乙烯生產中氧氯化及直接氧化之特性，IPCC 建議二氧化碳排放係數不確定性為 20%、甲烷排放係數不確定性為 10%，故氯乙烯二氧化碳排放總不確定性為 28%，甲烷排放總不確定性為 22%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

無改善計畫。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.8.4 環氧乙烷 (2.B.8.d)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查環氧乙烷 (C₂H₄O) 製程所產生之二氧化碳及甲烷，製程主要為乙烯經催化與氧氣反應產生環氧乙烷，二氧化碳主要來自於製造過程的副產物。環氧乙烷主要用途為製造乙二醇、乙二醇醚、酒精及胺的原料。

表 4.3.15 臺灣 1990 至 2014 年氯乙烯產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
氯乙烯產量	665	593	641	764	851	802	1,013	927	1,018	1,288	1,415	1,452	1,557
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
氯乙烯產量	1,718	1,763	1,783	1,609	1,810	1,633	1,773	1,758	1,685	1,817	1,900	1,822	

表 4.3.16 臺灣 1990 至 2014 年氯乙烯生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
氯乙烯產量	118	105	113	135	151	142	179	164	180	228	250	257	275
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
氯乙烯產量	304	312	315	285	320	289	314	311	298	322	337	322	




圖 4.3.10 臺灣 1990 至 2014 年氯乙烯生產排放量趨勢

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以環氧乙烷產量及排放係數計算二氧化碳及甲烷排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 環氧乙烷產量 (噸) × 環氧乙烷排放係數 (噸二氧化碳 / 噸產量)

甲烷排放量 = 環氧乙烷產量 (噸) × 環氧乙烷排放係數 (噸甲烷 / 噸產量)

(2) 排放係數

採用 2006 IPCC 指南建議係數 0.59 噸二氧化碳 / 噸環氧乙烷生產及 0.002 噸甲烷 / 噸環氧乙烷生產。

(3) 活動數據

由經濟部工業局廢棄物管制中心提供環氧乙烷產量，

環氧乙烷生產量 1995 年之前因資料年代久遠無法追溯，1996 至 2014 年國內環氧乙烷產量如表 4.3.17 所示：

(4) 排放量

環氧乙烷排放量與產量有關，環氧乙烷排放量由 1996 年 18 千公噸二氧化碳當量逐年上升至 2011 年 157 千公噸二氧化碳當量後約維持 150 千公噸二氧化碳當量，約占總部門排放量 0.6%，如表 4.3.18 及圖 4.3.11 所示。

(5) 完整性

環氧乙烷產量由經濟部工業局廢棄物管制中心提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國環氧乙烷生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

表 4.3.17 臺灣 1990 至 2014 年環氧乙烷產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
環氧乙烷產量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	28	33	31	36	33	45	60
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
環氧乙烷產量	79	206	221	219	226	211	229	243	246	231	246	234	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。

表 4.3.18 臺灣 1990 至 2014 年環氧乙烷生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
環氧乙烷排放量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	18	21	20	23	21	29	39
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
環氧乙烷排放量	51	132	141	140	145	135	147	155	157	148	158	150	

備註：NE：為未調查估計該分類項目。




圖 4.3.11 臺灣 1996 至 2014 年環氧乙烷生產排放量趨勢

參照 2006 IPCC 指南建議，活動數據若為「產量」，建議不確定性為 10%；考量環氧乙烷生產中氧氯化及直接氧化之特性，IPCC 建議二氧化碳排放係數不確定性為 10%、甲烷排放係數不確定性為 60%，故環氧乙烷二氧化碳排放總不確定性為 14%，甲烷排放總不確定性為 61%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

如 4.2.2 (1) -3。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.8.5 丙烯腈 (2.B.8.e)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查丙烯腈製程所產生之二氧化碳及甲烷，製程主要為氨氣、氧氣與丙烯直接氨氧化後得到丙烯腈，二氧化碳主要來自於製造過程的副產物。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以丙烯腈產量及排放係數計算甲烷排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 丙烯腈產量 (噸) × 丙烯腈排放係數 (公噸二氧化碳 / 噸產量)

甲烷排放量 = 丙烯腈產量 (噸) × 丙烯腈排放係數 (公噸甲烷 / 噸產量)

(2) 排放係數

採用 2006 IPCC 指南建議係數 0.79 噸二氧化碳 / 噸丙烯腈生產及 0.00018 噸甲烷 / 噸丙烯腈生產。

(3) 活動數據

由石化公會提供丙烯腈產量，如表 4.3.19 所示：

(4) 排放量

我國丙烯腈排放趨勢為階段成長；1990 至 1998 約 100 千公噸二氧化碳當量，1999 年台塑六輕投入生產，2001 年後逐漸上升至 209 千公噸二氧化碳當量，2007 年六輕四期完工，2007 年排放量再上升至 299 千公噸二氧化碳當量，2008 受到金融海嘯影響下降至 257 千公噸二氧化碳當量，2011 年後逐年上升，至 2014 年達 332 千公噸，約占總部門排放量 1.4%，如表 4.3.20 及圖 4.3.12 所示。

(5) 完整性

丙烯腈產量由石化公會提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國丙烯腈生產排放量。

表 4.3.19 臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
丙烯腈產量	118	116	131	129	138	141	163	162	150	157	168	263	305
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
丙烯腈產量	317	341	348	376	407	324	371	413	375	399	413	418	

表 4.3.20 臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
丙烯腈排放量	94	92	104	103	109	112	129	129	119	125	133	209	243
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
丙烯腈排放量	252	271	276	299	323	257	294	328	298	317	328	332	

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

參照 2006 IPCC 指南建議，活動數據若為「產量」，建議不確定性為 60%；考量丙烯腈排放係數會製程中原料（丙烯）回收影響，IPCC 2006 建議二氧化碳排放係數不確定性為 60%、甲烷排放係數不確定性為 10%，故丙烯腈二氧化碳排放總不確定性為 85%，甲烷排放總不確定性為 61%，因其占總排放量比例低，影響總不確定性低。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

無改善計畫。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.8.6 碳煙 (2.B.8.f)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查碳煙製程所產生甲烷及二氧化碳，製程主要以乙炔、天然氣等原料經高溫熱裂解製造碳煙，其中，甲烷主要來自於製程尾氣排放。碳煙主要用於輪胎和橡膠產業。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以碳煙產量及排放係數計算二氧化碳及甲烷排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 碳煙產量 (噸) × 碳煙排放係數 (公噸二氧化碳 / 噸產量)

甲烷排放量 = 碳煙產量 (噸) × 碳煙排放係數 (公噸甲烷 / 噸產量)

(2) 排放係數

採用 2006 IPCC 指南建議係數 5.25 噸二氧化碳 / 噸碳煙生產及 0.00006 噸甲烷 / 噸碳煙生產。

(3) 活動數據

由石化公會提供碳煙產量，碳煙 1990 至 2014 年產量如表 4.3.21 所示：




圖 4.3.12 臺灣 1990 至 2014 年丙烯腈生產排放量趨勢

表 4.3.21 臺灣 1990 至 2014 年碳煙產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
碳煙生產產量	59	58	58	63	81	90	100	103	104	104	100	106	106
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
碳煙生產產量	104	106	114	109	112	94	82	97	108	94	90	93	

(4) 排放量

碳煙生產排放量自 1994 年起逐漸上升，至 1996 年後排放量維持約 470 千公噸二氧化碳當量以上，唯 2008 至 2009 年受金融海嘯影響略下降，2011 年後又再度提升至 511 千公噸二氧化碳當量，2012 年後維持於約 440 千公噸，如表 4.3.22 及圖 4.3.13 所示。

(5) 完整性

碳煙產量由石化公會提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國碳煙生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

參照 2006 IPCC 指南，碳煙生產活動數據不確定性為 5%，排放係數為 55%，合併不確定性則為 55%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.9 含氟化物生產 (2.B.9)

含氟化物生產包含副產品排放及逸散排放，主要排放氣體為氫氟碳化物、全氟碳化物及六氟化硫，分別詳述如下所示。

4.3.9.1 副產品排放 (2.B.9.a)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查生產一氯二氟甲烷 (HCFC-22 或 CHClF_2) 時 HFC-23 或 CHF 等副產品排放量。其中，國內僅台塑仁武廠生產 HCFC-22，排放副產品則為 HFC (HFC-23)，但已於 2004 年停產，本項僅針對 HCFC-22 副產品排放進行說明。

表 4.3.22 臺灣 1990 至 2014 年碳煙生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
碳煙生產排放量	278	273	276	296	381	427	474	489	491	490	516	500	503
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
碳煙生產排放量	491	499	540	514	528	444	387	458	511	446	427	440	



圖 4.3.13 臺灣 1990 至 2014 年碳煙生產排放量趨勢

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以 HCFC-22 產量及副產品 HFC-23 產生率（排放係數）計算 HFC 排放量。計算公式如下：

$$\text{HFC 排放量} = \text{HCFC-22 產量 (噸)} \times \text{HCFC-23 產生率 (\%)}$$

(2) 排放係數

本項排放係數為 HCFC-22 副產品 HFC-23 之產生率，引用行政院環境保護署計畫（2004）¹¹，根據實廠排放情形推估之產生率 1.4%，該係數排放已包含副產品及逸散排放的部分。

(3) 活動數據

1990 至 2013 年 HCFC-22 產量如表 4.3.23 所示，由台塑公司提供產量，HCFC-22 自 1993 年投產，並於 2004 年停產。

表 4.3.23 臺灣 1990 至 2014 年 HCFC-22 產量

（單位：噸）

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	NO	NO	NO	3,401	3,850	3,610	5,880	6,655	9,382	7,248	10,444	11,565	9,716
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	8,724	7,702	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

表 4.3.24 臺灣 1990 至 2014 年 HCFC-22 副產品（HFC-23）排放量

（單位：千公噸二氧化碳當量）

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	NO	NO	NO	597	676	634	1,032	1,168	1,647	1,272	1,833	2,030	1,705
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	1,531	1,352	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

備註：NO，代表我國該分類項目無生產或使用；國內唯一 HCFC-22 生產廠商台塑仁武廠僅於 1993 至 2004 年生產品。




圖 4.3.14 臺灣 1993 至 2004 年 HCFC-22 副產品（HFC-23）排放量趨勢

(4) 排放量

HCFC-22 副產品排放量如表 4.3.24 及圖 4.3.14 所示。HCFC-22 於 1993 至 2004 年生產品期間，副產品 HFC-23 排放量趨勢為先升後降，自 1993 年排放 597 千公噸二氧化碳當量逐步成長至 2001 年 2,030 千公噸二氧化碳當量；2001 年起因中國大陸經濟崛起，而逐漸減產，最終於 2004 年停產，之後便不再排放。

(5) 完整性

國內過去僅台塑公司生產 HCFC-22，計算結果可代表國內 HCFC-22 副產品排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3. (1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.3.9.2 逸散排放 (2.B.9.b)

本項主要調查含氟化物生產製程中 HFCs、PFCs、SF₆ 等逸散排放量。其中，國內僅台塑仁武廠生產 HCFC-22，調查其副產品 (HFC-23) 排放量時已將逸散排放納入統計，故本項 HFC 排放已列入「破壞臭氧層物質之替代品使用」項目之排放量統計中。

4.3.10 其他 (2.B.10)

以「苯乙烯生產」為其他類別之項目，以下對此項目做詳述。

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查苯乙烯製程所產生之甲烷，製程主要係以乙苯與蒸汽混合，經脫氫與精製後得苯乙烯單體，其中，苯乙烯甲烷來源與乙烯類似，主要來自於設備元件逸散及製程尾氣，但尾氣會導回做為燃料，因此排放量較低，甲烷主要排放源仍為製程逸散。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以苯乙烯產量及排放係數計算甲烷排放量。計算公式如下：

$$\text{甲烷排放量} = \text{苯乙烯產量 (噸)} \times \text{苯乙烯排放係數 (公噸甲烷 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

採用行政院環境保護署計畫 (2000)¹² 建置係數 0.1975 公斤甲烷 / 噸苯乙烯生產；此係數係以全廠排放量及苯乙烯產量求得全廠排放係數，並以甲烷所占比例進行 speciate 系統區分甲烷排放量後求得。

(3) 活動數據

由石化公會提供苯乙烯產量，如表 4.3.25 所示：

(4) 排放量

苯乙烯為乙烯下游產品之一，故兩者排放趨勢類似，皆呈現階段成長；1990 至 1998 年約維持 1.9 千公噸二氧化碳當量，1999 年六輕完工後增產，2001 至 2006 年排放量上升至 6.0 千公噸，2007 年六輕四期完工後，2007 至 2012 年排放量則維持約 9.0 千公噸二氧化碳當量左右，2014 年排放量上升至 9.8 千公噸，約占總部門排放量 0.04%，如表 4.3.26 及圖 4.3.15 所示。

(5) 完整性

苯乙烯產量由石化公會提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國苯乙烯生產排放量。

表 4.3.25 臺灣 1990 至 2014 年苯乙烯產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	1.1	1.3
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	1.3	1.3	1.3	1.2	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	2.0	2.0	

表 4.3.26 臺灣 1990 至 2014 年苯乙烯生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	1.8	1.8	1.6	1.8	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	4.0	5.2	5.7	6.2
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	6.2	6.2	6.2	6.0	9.0	8.3	9.4	9.5	8.4	8.9	10.1	9.8	

12 行政院環境保護署，臺灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3. (1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.1-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.4 金屬製程 (2.C)

2.C「金屬製程」為工業製程及產品部門中僅次於「礦業(非金屬製程)」之高排放分類，分類項目包括 2.C.1「鐵及鋼生產」、2.C.2「鐵合金生產」、2.C.3「原鋁生產」、2.C.4「鎂生產」、2.C.5「鉛生產」、2.C.6「鋅生產」等共計六項，統計溫室氣體種類包含二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、PFCs、及 SF₆ 等共計五項。2014 年總部門排放量 7,069 千公噸二氧化碳當量，占工業製程及產品使用部門 30.0%，1990 至 2014 年排放量如表 4.4.1 及圖 4.4.1 所示。

4.4.1 鐵鋼生產 (2.C.1)

4.4.1.1 一貫煉鋼

1. 排放源及匯分類的描述：

2006 IPCC 指南建議統計一貫煉鋼製程，包含燒結工場、煉鐵高爐工場及煉鋼轉爐工場等三項製程中所產生之二氧化碳及甲烷，二氧化碳排放主要來自各項投入原料（包含焦炭、各類副產品、石灰石等等）中碳成分釋出，另外，考量計算排放量完整性，氧化亞氮亦納入統計。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

A.1990 至 2000 年

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以一貫煉鋼之高爐鋼胚產量及排放係數計算二氧化碳當量排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{高爐鋼胚產量 (噸)} \times \text{高爐鋼胚排放係數 (公噸二氧化碳當量 / 噸產量)}$$

B.2001 至 2014 年

參照 2006 IPCC 指南建議方法 3，彙整國內鋼鐵公司溫室氣體排放清冊取得製程排放量；原統計方式應為原物料使用產生溫室氣體排放量（含作為氧化作用之爐氣）扣除產品、副產物、及燃料用途爐氣部分，但考量我國鋼鐵業者已將爐氣使用量提報納入能源部門統計中，為避免重複計算，本項一貫煉鋼製程溫室氣體排放量未包含爐氣部分。




圖 4.3.15 臺灣 1990 至 2014 年苯乙烯生產排放量趨勢

(2) 排放係數

1990 至 2000 年採用 2001 至 2009 年國內鋼鐵公司之高爐鋼胚製程排放量及產量推估所得排放係數 0.5002 噸二氧化碳當量 / 噸高爐鋼胚生產，此係數已包含二氧化碳、甲烷及氧化亞氮排放的部分。2001 至 2014 年彙整國內鋼鐵公司排放清冊取得排放量，故無排放係數。

(3) 活動數據

1990 至 2000 年由國內鋼鐵公司提供高爐鋼胚產量，2001 至 2014 年為彙整國內鋼鐵公司排放清冊取得排放量，故無活動數據。1990 至 2000 年產量如表 4.4.2 所示：

(4) 排放量

一貫煉鋼製程因早期為起步階段，故排放量呈上升趨勢，2004 至 2009 年間則受景氣影響呈現上下振盪，2010

表 4.4.1 臺灣 1990 至 2014 年金屬製程排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
2.C.1. 鐵及鋼生產	3,243	3,450	3,261	3,718	3,631	3,690	3,837	4,865	5,642
2.C.2. 鐵合金生產	33	287	215	171	144	195	177	181	175
2.C.3. 原鋁生產	NO								
2.C.4. 鎂生產	NE								
2.C.5. 鉛生產	NE								
2.C.6. 鋅生產	NE								
總計	3,275	3,737	3,475	3,889	3,775	3,885	4,014	5,046	5,818
年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2.C.1. 鐵及鋼生產	5,270	5,701	4,939	4,072	5,353	5,105	5,000	7,585	7,761
2.C.2. 鐵合金生產	63	33	21	25	30	NO	NO	NO	NO
2.C.3. 原鋁生產	NO								
2.C.4. 鎂生產	NE	NE	NE	1,027	1,027	1,357	1,063	770	440
2.C.5. 鉛生產	NE	NE	NE	NE	3	8	8	9	9
2.C.6. 鋅生產	NE	NE	NE	NE	14	50	58	49	62
總計	5,333	5,734	4,960	5,123	6,426	6,519	6,129	8,412	8,272
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
2.C.1. 鐵及鋼生產	7,514	6,342	7,874	7,563	8,239	7,851	6,966		
2.C.2. 鐵合金生產	173	0	26	3	10	20	24		
2.C.3. 原鋁生產	NO								
2.C.4. 鎂生產	144	235	212	134	109	55	56		
2.C.5. 鉛生產	8	6	7	7	6	5	6		
2.C.6. 鋅生產	48	49	42	47	47	18	18		
總計	7,888	6,632	8,187	7,754	8,410	7,949	7,069		

備註：NO，代表我國該分類項目無生產或使用；NE，代表未調查估計該分類項目。如考量該項目使用量小，故未進行調查。




圖 4.4.1 臺灣 1990 至 2014 年金屬製程排放量趨勢



年後由於經濟復甦，及國內第 2 家一貫煉鋼廠商投產，故排放量略為上升，2011 年受景氣影響而呈現波動，2014 年排放量為 6,147 千公噸二氧化碳當量。如表 4.4.3 及圖 4.4.2 所示。

(5) 完整性

1990 至 2000 年活動數據由鋼鐵公會提供，排放係數則由 2001 至 2009 當時國內唯一一家使用高爐製程之鋼鐵公司（中國鋼鐵公司）之產量與排放量推算，排放量計算結果可代表我國高爐鋼胚製程排放量。

2001 至 2014 年排放量彙整自國內所有採用高爐製程之鋼鐵公司排放清冊，其排放量可代表我國高爐鋼胚製程排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

2001 至 2005 年因該公司清冊未進行不確定性計算，故改採用 2006 IPCC 指南建議，活動數據為國家生產數據，其不確定性為 10%，排放係數為參考國內特定工廠值，其不確定性為 5%，合併不確定性則為 11%。2006 至 2014 年排放量之不確定性彙整自國內鋼鐵公司各年排放清冊，約為 5%，符合 2006 IPCC 指南建議之方法三不確定性範圍，1990 至 2014 年高爐鋼胚總排放不確定性如表 4.4.4 所示。

(2) 時間序列的一致性

計算方法則隨年代區間不同變更，1990 至 2000 年採

表 4.4.2 臺灣 1990 至 2000 年高爐鋼胚產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
產量	5,627	5,829	5,421	6,244	6,123	6,242	6,444	8,944	9,811	9,267	9,971

表 4.4.3 臺灣 1990 至 2014 年高爐鋼胚生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	2,815	2,916	2,712	3,123	3,063	3,122	3,223	4,174	4,907	4,635	4,987	4,223	3,270
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	4,512	4,205	4,095	6,606	6,721	6,500	5,542	7,187	6,639	7,482	7,045	6,147	




圖 4.4.2 臺灣 1990 至 2014 年高爐鋼胚生產排放量趨勢

表 4.4.4 臺灣 1990 至 2014 年高爐鋼胚生產排放量不確定性

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量不確定性	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	5%	5%
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量不確定性	5%	5%	5%	5.23%	3.90%	3.98%	4.24%	4.12%	4.03%	6.18%	5.17%	5.66%	

方法一，即以產量及排放係數計算排放量；2001 至 2014 年採方法三，即排放量則彙整自國內鋼鐵公司排放清冊。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.4.1.2 電弧爐鋼胚

1. 排放源及匯分類的描述：

本項調查電弧爐鋼胚製程中所產生之二氧化碳，二氧化碳排放主要來自生鐵、廢鐵及增碳劑等原料中碳成分釋出。電弧爐鋼胚製程主要以生鐵及廢棄鋼鐵製品為原料，加入增碳劑冶煉成各式碳鋼或合金鋼，冶煉過程並分為熔解、氧化及還原等。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以電弧爐鋼胚產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 電弧爐鋼胚產量 (噸) × 電弧爐鋼胚排放係數 (公噸二氧化碳 / 噸產量)

(2) 排放係數

1990-2012 年電弧爐使用方法一計算，排放係數以 2013 及 2014 年各廠溫室氣體排放量除各廠電弧爐鋼胚量之各廠係數加總後平均作為本土係數，碳鋼採用 0.104 公噸二氧化碳 / 產量噸數，不銹鋼為 0.110 公噸二氧化碳 / 產量噸數，合金鋼則為 0.037 公噸二氧化碳 / 產量噸數。

2013 及 2014 年採用廠商排放清冊，故無排放係數。

(3) 活動數據

1990 至 2012 年產量如表 4.4.5 所示，其中 1990 至 2012 年電弧爐鋼胚產量由臺灣鋼鐵公業同業公會（以下簡稱鋼鐵公會）提供，2010 年後因中龍鋼鐵公司投入一貫煉鋼生產，其一貫煉鋼及電弧爐煉鋼製程無法切割，經鐵與鋼專家諮詢會議討論後決議參考國際鋼鐵協會分類方法，於我國電弧爐鋼胚總量中扣除中龍鋼鐵生產之電弧爐鋼胚產量，做為 2010 至 2012 年我國電弧爐製程活動數據。

2013 至 2014 年使用方法三，係彙整自國內電弧爐廠商之排放清冊，故無活動數據。

(4) 排放量

電弧爐鋼胚排放量自 1990 年起呈成長趨勢，自 428 千公噸二氧化碳當量成長至 2007 年 1,040 千公噸二氧化碳當量，於 2008 至 2009 年金融海嘯下降，2010 年後扣除中龍鋼鐵所生產之電弧爐排放量，故 2013 年後電弧爐鋼胚排放量約維持在 800 千公噸二氧化碳當量，如表 4.4.6 及圖 4.4.3 所示。

表 4.4.5 臺灣 1990 至 2014 年電弧爐鋼胚產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	4,120	5,143	5,286	5,726	5,467	5,463	5,905	6,653	7,075	6,110	6,869	6,898	7,706
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	8,075	8,658	8,713	9,410	10,024	9,795	7,661	6,590	8,927	7,323			

表 4.4.6 臺灣 1990 至 2014 年電弧爐鋼胚生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	428	534	549	595	568	568	613	691	735	635	714	717	801
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	840	900	905	979	1,040	1,013	800	687	924	757	806	819	

(5) 完整性

1990 至 2012 係由鋼鐵公會提供之電弧爐鋼胚產量，屬全國電弧爐鋼胚總量，僅中龍鋼鐵公司電弧爐鋼胚產量併入一貫煉鋼製程計算，故計算結果可代表國內電弧爐鋼胚製程排放量。

2013 及 2014 係彙整國內主要電弧爐製程鋼鐵公司排放清冊，其彙整排放量可代表國內電弧爐鋼胚製程排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3. (1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.3.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.4.2 鐵合金生產 (2.C.2)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項調查鐵合金生產製程中所產生之二氧化碳，製程以礦石、焦炭及渣化物質於電弧爐高溫熔煉生產鐵合金，其中，當金屬氧化造成焦炭及電極棒之碳消耗減少，熔煉過程將產生一氧化碳，並經由轉化槽轉化為二氧化碳排放。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以鐵合金產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{鐵合金產量 (噸)} \times \text{鐵合金排放係數 (噸二氧化碳 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

採用 2006 IPCC 指南建議係數 3.9 噸二氧化碳 / 噸鐵合金生產。

(3) 活動數據

1990 至 2014 年產量如表 4.4.7 所示，2001 至 2014 年鐵合金產量由鋼鐵公會提供，但其無法提供 2000 年前數據，故改引用經濟部統計處工業生產統計年報，其中，鐵合金曾於 2004 至 2007 年停產。

(4) 排放量

鐵合金排放量自 1990 年 310.9 千公噸二氧化碳當量下降至 2003 年 30.0 千公噸二氧化碳當量，並於 2004 至




圖 4.4.3 臺灣 1990 至 2014 年電弧爐鋼胚生產排放量趨勢

2007 年間停產，2008 年起再度生產，排放量達 173.5 千公噸，2008 至 2014 年排放量起伏劇烈，2014 年排放量為 23.9 千公噸，1990 至 2014 年排放量如表 4.4.8 及圖 4.4.4 所示。

(5) 完整性

鋼鐵公會及經濟部統計處工業生產統計年報調查鐵合金產量，皆係以全國為調查對象，排放量計算結果可代表全國排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3. (1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2000 及 2001 至 2014 年數據來源不同，無時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.3.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.4.3 原鋁生產 (2.C.3)

本項目為統計原鋁生產排放二氧化碳及使用全氟碳化物之排放量，因國內鋁製造非自鋁礦提煉，故本項目無二氧化碳及全氟碳化物排放。

表 4.4.7 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	80	73	55	44	37	50	45	46	45	16	8	5	6
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	8	NO	NO	NO	NO	44	0.003	7	1	3	5	6	

備註：NO，代表無生產或使用，臺灣鐵合金生產廠商曾於 2004 至 2007 年停產。

表 4.4.8 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	32.8	287.3	214.7	171.0	144.2	195.1	177.0	181.3	175.3	62.9	32.8	20.7	24.9
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	30.1	NO	NO	NO	NO	173.5	0.012	26.3	2.6	9.9	19.9	23.9	

備註：NO，代表無生產或使用，臺灣鐵合金生產廠商曾於 2004 至 2007 年停產，故無排放量。




圖 4.4.4 臺灣 1990 至 2014 年鐵合金生產排放量趨勢

4.4.4 鎂生產 (2.C.4)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項調查鎂生產使用六氟化硫排放量，鎂合金為高活性材料，熔解時需以保護氣體防止燃燒，目前產業界使用乾燥空氣、二氧化碳、六氟化硫混合為保護氣體，其中，六氟化硫為惰性氣體，使用過程將全部排放，故使用量即為其排放量。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

依據行政院環境保護署計畫 (2012)¹³⁻¹⁴、調查所得排放量，係參照 2006 IPCC 指南建議方法 2，以鎂生產六氟化硫使用量為排放量，即臺灣鎂合金協會 (Taiwan Magnesium Association, TMA) 會員廠調查數據。

(2) 排放係數

由行政院環境保護署計畫 (2012) 提供排放量，係彙整自臺灣鎂合金協會取得使用量，為一實際值，故無排放係數需求。

(3) 活動數據

由行政院環境保護署計畫 (2012) 提供，係依會員廠經查證之實際使用量統計活動數據。

(4) 排放量

行政院環境保護署計畫 (2012) 表示，鎂生產於新製程普及後才大量使用六氟化硫，早期使用六氟化硫為實驗推廣，使用量非常少，故無進行調查，鎂生產排放量自 2004 年排放 1,357 千公噸二氧化碳當量，下降至 2014 年 56 千公噸二氧化碳當量，原因主要為鎂合金產業外移嚴重，加上廠商配合行政院環境保護署計畫推動進行減量工作，故排放量呈現明顯下降趨勢。以六氟化硫之溫暖化潛勢值 (Global Warming Potential, 以下簡稱 GWP) 23,900 將鎂生產六氟化硫使用量轉換為排放量，2002 至 2014 年排放量如表 4.4.9 及圖 4.4.5 所示。

(5) 完整性

行政院環境保護署計畫提供之排放量係由鎂合金協會調查，為會員廠排放量，排放量調查結果可代表全國鎂生產六氟化硫排放量。

表 4.4.9 臺灣 1990 至 2014 年鎂生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	1,027
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	1,027	1,357	1,063	770	440	144	235	212	134	109	55	56	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期鎂生產未大量使用六氟化硫，故未進行調查。




圖 4.4.5 臺灣 2002 至 2014 年鎂生產排放量趨勢

13 行政院環境保護署，碳捕集及封存技術與溫室氣體減量相關技術推動工作專案工作計畫，2012。

14 計畫名稱隨年度不同，此為 2012 年計畫名稱

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，排放量若由廠商提供，屬於經系統性調查結果，建議排放量不確定性為 5%，但為避免低估不確定性，假設其製程較不穩定，排放量總不確定性為 30%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2002 年無法取得排放量，已影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

鎂生產排放量由行政院環境保護署計畫（2012）提供，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.4.6 所示。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.4.5 鉛生產（2.C.5）

1. 排放源及匯分類的描述：

本項調查鉛生產二氧化碳排放量，國內鉛生產屬次級生產，其中，提煉鉛的次級產量為回收鉛的處理量，大部分來自廢鉛蓄電池，二氧化碳來自於廢鉛蓄電池及其他回收廢鉛經過粉碎、脫硫等熔煉過程中產生。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以鉛錠產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

$$\text{二氧化碳排放量} = \text{鉛錠產量 (噸)} \times \text{鉛錠排放係數 (公噸二氧化碳 / 噸產量)}$$

(2) 排放係數

依據 2006 IPCC 指南建議，源自次級原材料處理之排放係數為 0.2 噸二氧化碳 / 噸次級鉛生產。

(3) 活動數據

由經濟部工業局廢棄物管制中心提供國內鉛錠產量，2003 年前未進行調查，2003 至 2014 年排放量如表 4.4.10 所示。

(4) 排放量

國內鉛生產 2003 至 2014 年排放量如表 4.4.11 及圖 4.4.7 所示，鉛生產排放量與鉛產品使用及回收率有關，由 2003 年 3 千公噸二氧化碳當量上升至 2007 年 9 千公噸二氧化碳當量後下降，2014 年排放量為 6 千公噸二氧化碳當量，占總部門排放量約 0.03%。




圖 4.4.6 鎂生產排放統計 QA/QC 流程

(5) 完整性

鉛錠產量由經濟部工業局廢棄物管制中心提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國鉛生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，排放量若由廠商提供，屬於經系統性調查結果，建議排放量不確定性為 5%，但為避免低估不確定性，假設其製程較不穩定，排放量總不確定性為 30%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2002 年無法取得排放量，已影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.1-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.4.6 鋅生產 (2.C.6)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項調查鋅生產二氧化碳排放量，國內鋅生產屬次級生產，由各種材料中經過分離、燒結、熔煉及提煉過程中

表 4.4.10 臺灣 2003 至 2014 年鉛錠產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	NE												
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	14	40	40	44	45	41	32	33	35	28	25	28	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期鉛生產未進行調查。

表 4.4.11 臺灣 2003 至 2014 年鉛生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	NE												
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	3	8	8	9	9	8	6	7	7	6	5	6	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期鉛生產未進行調查。




圖 4.4.7 臺灣 2003 至 2014 年鉛生產排放量趨勢

回收金屬鋅，二氧化碳來自於過程中需使用含碳還原劑及產生高溫揮發性煙霧。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以鋅錠產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 鋅錠產量 (噸) × 鋅錠排放係數 (公噸二氧化碳 / 噸產量)

(2) 排放係數

依據 2006 IPCC 指南建議，源自次級原材料處理之排放係數為 1.72 噸二氧化碳 / 噸次級鋅生產。

(3) 活動數據

由經濟部工業局廢棄物管制中心提供國內鋅錠產量，

2003 年前未進行調查，2003 至 2014 年排放量如表 4.4.12 所示。

(4) 排放量

國內鋅生產 2003 至 2014 年排放量如表 4.4.13 及圖 4.4.8 所示，鋅生產排放量與鋅產品使用及回收率有關，由 2003 年 14 千公噸二氧化碳當量上升至 2007 年 62 千公噸二氧化碳當量後下降，至 2014 年排放量為 18 千公噸二氧化碳當量，占總部門排放量約 0.07%。

(5) 完整性

鋅錠產量由經濟部工業局廢棄物管制中心提供，計算結果為國內主要廠商製程排放量，經計算之結果可代表我國鋅生產排放量。

表 4.4.12 臺灣 1990 至 2014 年鋅錠產量

(單位：千公噸)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	NE												
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	8	29	34	28	36	28	28	24	27	27	11	10	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期鉛生產未進行調查。

表 4.4.13 臺灣 2003 至 2014 年鋅生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	NE												
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	14	50	58	49	62	48	49	42	47	47	18	18	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期鉛生產未進行調查。




圖 4.4.8 臺灣 2003 至 2014 年鋅生產排放量趨勢

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，排放量若由廠商提供，屬於經系統性調查結果，建議排放量不確定性為 5%，但為避免低估不確定性，假設其製程較不穩定，排放量總不確定性為 30%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2002 年無法取得排放量，已影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.1-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.5 非能源產物燃料溶劑使用 (2.D)

2.D「非能源產物燃料溶劑使用」排放量趨近於零，分類項目包括 2.D.1「合成潤滑油使用」、2.D.2「石臘使

用」、2.D.3「溶劑使用」及 2.D.4「其他」等共計四項，排放溫室氣體種類為二氧化碳及 MNVOC 等共計 2 項，但因 2006 IPCC 指南未提供 MNVOC 之 GWP 值，僅統計二氧化碳排放量。2014 年總部門排放量約 0.0554 噸二氧化碳當量，約占工業製程及產品使用部門 0.0%，1990 至 2014 年排放量如表 4.5.1 及圖 4.5.1 所示。因排放量趨近於零，故僅列整體排放量。

4.6 電子工業 (2.E)

「電子工業」為工業製程及產品部門中第三大之排放分類，分類項目包括 2.E.1「積體電路或半導體」、2.E.2「TFT 平面顯示器」、2.E.3「光電(太陽能板)」及 2.E.4「熱傳流體」等共計四項，統計溫室氣體種類包含 N₂O、HFC、PFC、NF₃ 及 SF₆ 等共計五項。2013 年總部門排放量約 4,115 千公噸二氧化碳當量，占工業製程及產品使用部門 15.9%，1998 年前因電子產業未大量生產，未統計其溫室氣體使用量，僅呈現 1999 至 2014 年排放量如表 4.6.1 及圖 4.6.1 所示。

4.6.1 積體電路或半導體 (2.E.1)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項為參照 2006 IPCC 指南及我國製造業特性新增之項目，主要調查積體電路及半導體使用氫氟碳化物、全

表 4.5.1 臺灣 1990 至 2014 年燃料及溶劑使用的非能源產品排放量

(單位：公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
2.D.1 合成潤滑劑使用	0.048	0.047	0.051	0.060	0.073	0.067	0.071	0.075	0.077
2.D.2 石臘使用	0.011	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.012	0.010	0.015
2.D.3 溶劑使用	NA								
2.D.4 其他	NA								
總計	0.059	0.057	0.062	0.072	0.086	0.080	0.083	0.084	0.09
年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2.D.1 合成潤滑劑使用	0.075	0.061	0.057	0.065	0.080	0.097	0.095	0.069	0.069
2.D.2 石臘使用	0.017	0.015	0.011	0.010	0.012	0.012	0.009	0.002	0.001
2.D.3 溶劑使用	NA								
2.D.4 其他	NA								
總計	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.07	0.07
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
2.D.1 合成潤滑劑使用	0.069	0.054	0.042	0.039	0.036	0.041	0.053		
2.D.2 石臘使用	0.001	0.004	0.004	0.001	0.002	0.006	0.002		
2.D.3 溶劑使用	NA								
2.D.4 其他	NA								
總計	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06		

備註：NA，代表不產生具體氣體的排放或吸收，故為不適用。




圖 4.5.1 臺灣 1990 至 2014 年非能源產物燃料溶劑使用排放量趨勢

表 4.6.1 臺灣 1998 至 2014 年電子工業排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
2.E.1. 積體電路或半導體	NE	NE	NE	3.7	5.0	5.2	5.6	4.3	4.8
2.E.2.TFT 平面顯示器	NE	NE	NE	0.3	0.5	1.0	1.3	1.7	1.6
2.E.3 光電 (太陽能板)	NE								
2.E.4 熱傳流體	NE								
總計	NE	0.1	0.1	4.0	5.5	6.2	6.8	6.0	6.4
年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2.E.1. 積體電路或半導體	4.4	2.5	2.3	2.4	2.5	1.8	2.6	3.5	
2.E.2.TFT 平面顯示器	1.6	1.5	1.2	1.6	1.3	1.4	1.5	1.2	
2.E.3 光電 (太陽能板)	NE								
2.E.4 熱傳流體	NE								
總計	6.0	4.0	3.5	3.9	3.8	3.2	4.1	4.7	

備註：NE，代表未調查估計該分類項目，其中，2000 年前因積體電路或半導體、TFT 平面顯示器使用量及光電（太陽能板）產量極少，未進行調查，因此不計算排放量；熱傳流體未調查統計。因 2006 IPCC 尚無正式公告之 GWP 值與半導體製程排放係數，世界半導體協會（World Semiconductor Council, WSC）亦未整合蒐集使用量與排放量，未來將 IPCC 與世界半導體協會之要求蒐集並提供數據。




圖 4.6.1 臺灣 1999 至 2014 年電子工業排放量趨勢



氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮、氧化亞氮所造成的排放量，調查氫氟硫化物種類為 HFC-23，全氟碳化物種類則為 CF₄、C₂F₆、C₃F₈、C₄F₈ 等。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

由行政院環境保護署計畫(2014)¹⁵ 提供排放量，係參照 2006 IPCC 指南建議方法 2b，依據氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、氧化亞氮及三氟化氮等氣體使用情形調查排放量，其採用臺灣半導體產業協會(Taiwan Semiconductor Industrial Association, TSIA) 會員廠之氣體使用量；會員廠排放量計算方法為原物料化學品使用量扣除回收與處理量，再參酌 2006 IPCC 指南規範進行推算求得，氧化亞氮由於 IPCC 指南尚無同等規定，使用量全數轉為排放量。

(2) 排放係數

由行政院環境保護署計畫(2014) 提供，各項排放係數參採 2006 IPCC 指南方法 2b 之表 6.3 及 IPCC 第四次評估報告的 GWP 計算。

(3) 活動數據

由行政院環境保護署計畫(2014) 提供，係依採購量配合 2006 IPCC 指南係數得到活動數據，且各項數據均委由第三者進行查證，並於世界半導體協會(World Semiconductor Council, WSC) 會議中討論並予揭露。

(4) 排放量

2000 年前因積體電路或半導體產業廠商家數少，氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫使用量低，亦無進口之關稅號列，故未進行統計。2001 至 2014 年積體電路或半導體主要排放溫室氣體種類為全氟碳化物，2001 年排放量為 3,711 千公噸二氧化碳當量，並逐年成長至 2004 年達到 5,559 千公噸二氧化碳當量，由於 TSIA 配合政府推動自願減量，導入安裝尾氣處理設施，亦同時以量測程序進行製程改善，以減少全氟碳化物的使用排放，使全氟碳化物排放量逐年降低，至 2014 年約排放 1,271 千公噸二氧化碳當量，佔總部門排放量約 5.4%，2001 至 2014 年排放量如表 4.6.2 及圖 4.6.2 所示。

(5) 完整性

行政院環境保護署計畫提供之排放量係由 TSIA 調查，

表 4.6.2 臺灣 2001 至 2014 年積體電路或半導體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
HFC-23	51	59	59	59	73	91	171
PFC-CF ₄	913	704	752	917	733	875	1,084
PFC-C ₂ F ₆	1,976	3,289	3,348	3,263	1,980	1,974	1,308
PFC-C ₃ F ₈	22	37	37	110	293	321	464
PFC-C ₄ F ₈	22	48	37	37	37	41	77
SF ₆	524	499	513	587	587	695	292
N ₂ O	NE	NE	NE	NE	NE	342	389
NF ₃	202	359	455	587	623	512	590
總計	3,711	4,994	5,199	5,559	4,237	4,850	4,375
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HFC-23	118	168	164	134	86	169	182
PFC-CF ₄	723	398	597	408	266	361	457
PFC-C ₂ F ₆	417	189	198	177	84	102	117
PFC-C ₃ F ₈	460	476	441	483	141	301	504
PFC-C ₄ F ₈	57	63	86	134	201	135	194
SF ₆	229	198	239	261	181	213	312
N ₂ O	360	333	482	466	558	626	685
NF ₃	136	198	156	306	295	687	1,075
總計	2,500	2,298	2,363	2,502	1,812	2,595	3,527

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期積體電路或半導體未大量生產，故無追溯調查 1990 至 2000 年排放量。另，N₂O 尚無 IPCC 公告之製程耗用率以及管末處理削減率，故迄今 TSIA 採用保守原則使用量 100% 全部排放申報，世界半導體協會已經開始討論其合宜性，將待其有結論之後配合之。

15 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

為國內主要廠商排放量，產能約占 95% 以上。調查結果可代表全國積體電路或半導體排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

排放量係彙整自 TSIA 會員廠，各廠皆依 2006 IPCC 指南之方法 2b 計算排放量，行政院環境保護署計畫建議排放量之總不確定性為 12%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2000 年產業規模小，且該時期製程尾氣破壞處理做法尚未建立國際標準，因此 IPCC 對此段時間亦無相關排放量估算公式與參數可供參考。我國在此期間相關

溫室氣體使用量極小，氣體種類使用與尾氣處理情境已無法回溯以評估排放量，會影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

排放量係彙整自 TSIA 會員廠，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.6.3 所示。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。




圖 4.6.2 臺灣 2001 至 2014 年積體電路或半導體排放量趨勢




圖 4.6.3 積體電路或半導體排放統計 QA/QC 流程



4.6.2 TFT 平面顯示器 (2.E.2)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項為依臺灣製造業特性，參照 2006 IPCC 指南新增之項目，主要調查 TFT 平面顯示器使用全氟碳化物、六氟化硫、氧化亞氮及三氟化氮所造成的排放量；其中，全氟碳化物主要調查種類為四氟化碳 (CF₄)。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

由行政院環境保護署計畫 (2014)¹⁶ 提供排放量，係參照 2006 IPCC 指南建議方法 2b，依據全氟碳化物、六氟化硫、氧化亞氮及三氟化氮等氣體使用情形調查排放量，其係採中華民國臺灣薄膜電晶體液晶顯示器 (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, TFT-LCD) 產業協會 (TTLA) 會員廠全氟碳化物、六氟化硫、氧化亞氮及三氟化氮等氣體使用量計算所得；會員廠排放量計算方法為原物料化學品使用量扣除回收與處理量，再參酌 2006 IPCC 指南規範進行推算求得。

(2) 排放係數

由行政院環境保護署計畫 (2014) 提供，各項排放係數參採 2006 IPCC 指南之方法 2b 之表 6.4 及 IPCC 第四次評估報告的 GWP 計算。

(3) 活動數據

由行政院環境保護署計畫 (2014) 提供，係依採購量配合 2006 IPCC 指南係數得到活動數據，且各項數據均委由第三者進行查證。

(4) 排放量

1999 年前因 TFT 平面顯示器廠商產業家數少，全氟碳化物及六氟化硫使用量低，故未進行統計。

TFT 平面顯示器主要排放溫室氣體種類為六氟化硫，TSIA 已配合政府推動自願減量，並推動製程調整、替代氣體等多項減量措施，但由於平面顯示器廠商近年來擴廠，致使六氟化硫下降趨勢較不明顯，自 2005 年排放 1,660 千公噸二氧化碳當量下降至 2014 年 1,185 千公噸二氧化碳當量，佔總部門排放量約 5.0%，1999 至 2014 年排放量如表 4.6.3 及圖 4.6.4 所示。

(5) 完整性

行政院環境保護署計畫提供之排放量係由 TTLA 調查，為國內主要廠商排放量，產能約占 98% 以上，調查結果可代表全國 TFT 平面顯示器排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

排放量係彙整自 TTLA 會員廠，各廠皆依 2006 IPCC 指南之方法 2b 計算排放量，該計畫建議排放量之整合不確定性為 12%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 1998 年無法取得排放量，已影響時間序列一致性。

表 4.6.3 臺灣 1999 至 2014 年 TFT 平面顯示器排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PFC-CF ₄	3	13	6	65	25	14	27	53	0
SF ₆	116	120	221	446	901	1,197	1,530	1,355	1,429
N ₂ O	NE	28	50						
NF ₃	11	9	33	39	86	72	103	138	170
總計	129	143	260	550	1,012	1,283	1,660	1,573	1,649
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
PFC-CF ₄	25	17	32	30	33	30	26		
SF ₆	1,376	1,040	1,409	1,078	1,171	1,311	964		
N ₂ O	56	42	63	101	99	133	101		
NF ₃	30	65	62	75	54	46	96		
總計	1,486	1,164	1,567	1,285	1,357	1,519	1,187		

備註：NE，代表未調查估計該分類項目，早期 TFT 平面顯示器未大量生產，故無追溯調查 2005 年前氧化亞氮排放量。

16 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

排放量係彙整自 TTLA 會員廠，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.6.5 所示。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.7 破壞臭氧層物質之替代品使用 (2.F)

2.F「破壞臭氧層物質之替代品使用」分類項目包含 2.F.1「冷凍及空調使用」、2.F.2「發泡劑」、2.F.3「滅火劑」、2.F.4「氣膠產品(推進劑及溶劑)」、2.F.5「溶劑(非氣膠)」、2.F.6「其他應用」等共計六項，統計溫室氣體種類為氫氟碳化物、全氟碳化物及六氟化硫等共計三項，2014 年共排放 828 千公噸二氧化碳當量，約占工業製程及產品使用部門 3.5%，因早期使用量較小，無統計調查記錄，故僅呈現 2003 至 2014 年排放量，如表 4.7.1 及圖 4.7.1 所示。




圖 4.6.4 臺灣 1999 至 2014 年 TFT 平面顯示器排放量趨勢




圖 4.6.5 積體電路或半導體排放統計 QA/QC 流程

4.7.1 冷凍及空調 (2.F.1)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查冷凍空調使用氫氟碳化物冷媒所造成的排放量，國內主要應用於汽車冷媒、冷凍空調設備，主要調查氫氟碳化物種類為 HFC-134a，及 2011 年新增之 HFC-32、HFC-125 等等冷媒使用量。另，近年來 HFC-410A、HFC-404A 等混合氫氟碳化物冷媒亦廣泛被使用於冷凍空調設備並成立調配中心，唯目前尚未將混合冷媒物等列入統計範疇。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

由破壞臭氧層物質之替代品使用 提供排放量，係參照 2006 IPCC 指南建議方法 2，以氫氟碳化物實際使用情形估算排放量；由於氫氟碳化物冷媒用途多，係依據機動車統計、冰箱生產及進口數量等設備資料，推估氫氟碳化物實際使用情形，並參考 2006 IPCC 指南所列汽車空調及電冰箱運轉時之洩漏率進行估算排放量。

(2) 排放係數

由行政院環境保護署計畫 (2014)¹⁷ 提供，係參照 2006 IPCC 指南，排放係數為氫氟碳化物使用時洩漏率；機動車、冰箱使用 HFC-134a 冷媒洩漏率分別為 10.0% 及 0.1%，HFC-32、HFC-125 則皆為 1.0%。

表 4.7.1 臺灣 2003 至 2014 年破壞臭氧層物質之替代品使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2.F.1 冷凍及空調	329	569	660	670	670	670	670
2.F.2 發泡劑	NE						
2.F.3 滅火劑	73	113	336	226	252	258	142
2.F.4 氣膠產品 (推進劑及溶劑)	NE						
2.F.5 溶劑 (非氣膠)	NE						
2.F.6 其他應用	NE						
總計	401	682	996	896	922	928	812
年	2010	2011	2012	2013	2014		
2.F.1 冷凍及空調	680	827	725	799	824		
2.F.2 發泡劑	NE	NE	NE	NE	NE		
2.F.3 滅火劑	90	54	58	13	4		
2.F.4 氣膠產品 (推進劑及溶劑)	NE	NE	NE	NE	NE		
2.F.5 溶劑 (非氣膠)	NE	NE	NE	NE	NE		
2.F.6 其他應用	NE	NE	NE	NE	NE		
總計	770	881	783	812	828		

備註：NE，代表未調查估計該分類項目，國內「發泡劑」、「溶劑」、「空氣微粒」及「其他應用」因使用量少，未調查估計。




圖 4.7.1 臺灣 2003 至 2014 年破壞臭氧層物質之替代品使用排放量趨勢

¹⁷ 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

(3) 活動數據

由行政院環境保護署計畫(2014)提供,係依據機動車、冰箱數量及平均填充量推估氫氟碳化物冷煤使用量。如表 4.7.2 所示。

(4) 排放量

以GWP值將氫氟碳化物使用量轉換為排放量,其中,HFC-134a為1,430、HFC-32為675,HFC-125則為3,500。

行政院環境保護署計畫(2014)表示,早期氫氟碳化物冷煤為推廣用途,使用量較少,故未進行調查。2003至2010年僅統計HFC-134a排放量,2011年HFC-32、HFC-125因使用量增加,故新增為統計項目。另外,因應蒙特婁議定書之管制時程,臺灣自1996年逐步凍結HCFC的消費量(非2006 IPCC指南建議估算溫室氣體種類),業者逐步改以(2006 IPCC指南建議估算溫室氣體種類)取代,故排放量自2003年329千公噸二氧化碳當量逐步上升,2005年至2010年約維持670千公噸二氧化碳當量,2011年後繼續增加至2014年達824千公噸二氧化碳當量,相較2003年排放量成長約150%。2003至

2014年排放量如表 4.7.3 及圖 4.7.2 所示。

(5) 完整性

行政院環境保護署計畫(2014)調查排放量過程中所引用資料,如氫氟碳化物海關進口、機動車統計資料、冰箱生產及進口數量等,皆係以全國為調查對象,經計算調查之結果可代表我國冷凍空調使用排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據2006 IPCC指南,排放量屬系統化之調查結果,則建議其不確定性為5%;經判定行政院環境保護署計畫係透過系統性調查方式建置相關數據,故設定本項排放量不確定性為5%。

(2) 時間序列的一致性

1990至2002年無法取得排放量,已影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.1-4。

表 4.7.2 臺灣 2003 至 2014 年冷凍空調使用氫氟碳化物使用量

(單位：千公噸)

年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
使用量	2.3	4.0	6.1	6.1	6.4	6.0	6.2	6.2	15.2	10.0	11.0	13.4

備註：NE，代表未調查估計該分類項目。早期氫氟碳化物冷煤使用量少，故未進行調查。

表 4.7.3 臺灣 2003 至 2014 年冷凍空調使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
排放量	329	569	660	670	670	670	672	680	827	725	799	824




圖 4.7.2 臺灣 2003 至 2014 年冷凍空調使用排放量趨勢

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.7.2 發泡劑 (2.F.2)

本項主要調查發泡劑使用氫氟碳化物所造成的排放量。經行政院環境保護署計畫 (2012)¹⁸ 表示，因國內氫氟碳化物較少應用於發泡劑，故未進一步調查相關氫氟碳化物排放，即無發泡劑使用之氫氟碳化物排放。

4.7.3 滅火藥劑 (2.F.3)

1. 排放源及匯分類的描述：

本項主要調查滅火劑填充使用氫氟碳化物所造成的排放量，即用於替代海龍 1301 滅火劑之 HFC-227ea 使用量。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

由行政院環境保護署計畫 (2014)¹⁹ 提供排放量，係

參照 2006 IPCC 指南建議方法 2，以氫氟碳化物實際使用情形估算排放量；國內 HFC-227ea 僅使用於滅火藥劑，故依據 HFC-227ea 進口量進行估算排放量。

(2) 排放係數

由行政院環境保護署計畫 (2014) 提供排放量，依實際使用量進行統計，為一實際值，無排放係數需求。

(3) 活動數據

由行政院環境保護署計畫 (2014) 提供，由於 HFC-227ea 僅用於滅火藥劑填充，且國內無生產滅火器氫氟碳化物藥劑，皆係由國外進口，故填充量係依據關稅總局進口量統計。

(4) 排放量

以 HFC-227ea 之 GWP 值 3,220 將填充量轉換為排放量，1990 至 2014 年排放量如表 4.7.4 及圖 4.7.3 所示。早期氫氟碳化物滅火藥劑為推廣用途，使用量較少，故未進行調查。滅火藥劑使用氫氟碳化物排放量與進口量有關，2003 至 2007 呈逐年上升趨勢，至 2008 年達 258 千公噸二氧化碳當量，2008 年後則為下降趨勢，自 258 千公噸二氧化碳當量降至 2014 年 4 千公噸二氧化碳當量，約佔總排放量 0.05%。

表 4.7.4 臺灣 2003 至 2014 年滅火劑使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
排放量	73	113	336	226	252	258	142	90	54	58	13	4




圖 4.7.3 臺灣 2003 至 2014 年滅火劑使用排放量趨勢

18 行政院環境保護署，碳捕集及封存技術與溫室氣體減量相關技術推動工作專案工作計畫，2012。

19 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

(5) 完整性

行政院環境保護署計畫(2014)調查排放量過程中所引用氫氟碳化物海關進出口資料，係以全國為調查對象，調查結果可代表我國滅火劑使用排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，排放量屬系統化之調查結果，則建議其不確定性為 5%；經判定行政院環境保護署計畫係透過系統性調查方式建置相關數據，故設定本項排放量不確定性為 5%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2002 年無法取得排放量，已影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.3.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.7.4 氣膠產品（推進劑及溶劑）（2.F.4）

本項主要調查發泡劑使用行政院環境保護署計畫

(2014) 調查排放量過程中所引用氫氟碳化物所造成的排放量。行政院環境保護署計畫(2014)²⁰表示，因國內行政院環境保護署計畫(2014)調查排放量過程中所引用氫氟碳化物較少應用於噴霧劑，故未進一步調查相關行政院環境保護署計畫(2014)調查排放量過程中所引用氫氟碳化物排放，即無噴霧劑使用之行政院環境保護署計畫(2014)調查排放量過程中所引用氫氟碳化物排放。

4.7.5 溶劑（非氣膠）（2.F.5）

本項主要調查清洗溶劑使用行政院環境保護署計畫(2014)調查排放量過程中所引用氫氟碳化物、全氟碳化物所造成的排放量。該計畫表示，因國內氫氟碳化物較少應用於清洗溶劑，故未進一步調查相關氫氟碳化物排放，即無清洗溶劑使用之氫氟碳化物排放。

4.7.6 其他應用（2.F.6）

無。

4.8 其他產品之製造與使用（2.G）

本章概述製造和使用電器設備和其他產品所產生六氟化硫和全氟碳化物排放估算統計，包含 2.G.1「電子設備」、2.G.2「電力設備中六氟化硫及全氟碳化物」、2.G.3「其他產品使用六氟化硫及全氟碳化物」及 2.G.4「使用氧化亞氮之產品」等共計四項，統計溫室氣體種類為全氟碳化物、六氟化硫及氧化亞氮等共計 3 項，2014 年共排放 23 千公噸二氧化碳當量，約占工業製程及產品使用部門 0.1%。其中，「電力設備中六氟化硫及全氟碳化物」因早期使用量較小，無統計調查記錄，故僅呈現 2002 至

表 4.8.1 臺灣 2002 至 2014 年其他產品之製造與使用排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
2.G.1. 電子設備	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE
2.G.2. 電力設備中的 SF ₆ 和 PFC 排放	1,943	1,943	2,053	1,503	770	953	895
2.G.3. 其他產品使用 SF ₆ 及 PFC	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2.G.4. 使用 N ₂ O 之產品	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
總計	1,943	1,943	2,053	1,503	770	953	895
年	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
2.G.1. 電子設備	IE	IE	IE	IE	IE	IE	
2.G.2. 電力設備中的 SF ₆ 和 PFC 排放	703	295	282	186	142	23	
2.G.3. 其他產品使用 SF ₆ 及 PFC	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
2.G.4. 使用 N ₂ O 之產品	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
總計	703	295	282	186	142	23	

備註：IE，代表該分類項目排放量已作估計，但列在清冊中其他分類項目，「電子設備」併入「積體電路或半導體」、「TFT 平面顯示器」計算。NE，代表未調查估計該分類項目，因「其他產品使用六氟化硫及全氟碳化物」及「使用氧化亞氮之產品」項目排放量低，故未進一步調查相關排放。

20 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

2014 年排放量，如表 4.8.1 所示。

4.8.1 電子設備 (2.G.1)

無法依 2006 IPCC 指南之方法別取得所需數據，故合併於「積體電路或半導體」、「TFT 平面顯示器」計算。

4.8.2 電力設備中的六氟化硫及全氟碳化物 (2.G.2)

1. 排放源及匯分類的描述：

依據臺灣製造業特性，參照 2006 IPCC 指南新增之項目，主要調高壓斷路器及其他開關絕緣氣體使用六氟化硫所造成的排放量，主要調查對象為電力事業，分別為台電公司電力設備自然洩漏或維修測試，以及民營電廠於製造電力設備時為確保絕緣效果於測試時使用所排放的六氟化硫。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

由行政院環境保護署計畫 (2014)²¹ 提供排放量，係參照 2006 IPCC 指南建議方法 2，以六氟化硫實際使用情形求得排放量，來源為台電公司建立之「六氟化硫申報管理系統」登錄平台，民營電廠排放量則係依據六氟化硫採購量以及 2006 IPCC 指南建議洩漏率進行估算。

(2) 排放係數

由行政院環境保護署計畫 (2014) 提供排放量，依實際補充量進行統計，為一實際值，無排放係數需求。

(3) 活動數據

由行政院環境保護署計畫 (2014) 提供排放量，係依實際使用量進行統計活動數據。

(4) 排放量

以六氟化硫之 GWP 值 22,800 將六氟化硫使用量轉換為排放量，1990 至 2014 年排放量如表 4.8.2 及圖 4.8.1 所示。

早期高壓斷路器使用多氯聯苯作為絕緣氣體，六氟化硫僅為推廣用途，使用量少，故未調查使用量。2002 至 2014 年高壓斷路器及其他開關絕緣氣體六氟化硫排放量呈現明顯下降趨勢，自 2002 年排放 1,943 千公噸二氧化碳當量下降至 2014 年 23 千公噸二氧化碳當量，因台電公司六輸計畫結束，2014 年排放量僅約 2013 年之 16%。

(5) 完整性

行政院環境保護署計畫提供之排放量係以台電公司及全國民營電廠調查為調查對象，調查結果可代表全國高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

根據 2006 IPCC 指南，排放量屬系統化之調查結果，

表 4.8.2 臺灣 1990 至 2014 年高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SF ₆	1,943	1,943	2,053	1,503	770	953	895	702	295	282	186	142	23




圖 4.8.1 臺灣 1990 至 2014 年高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放量趨勢

21 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

則建議其不確定性為 5%；經判定行政院環境保護署計畫係透過系統性調查方式建置相關數據，故設定本項排放量不確定性為 5%。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2001 年無法取得排放量，已影響時間序列一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

排放量行政院環境保護署計畫提供，QA/QC 工作係參照 2006 IPCC 指南原則執行以掌握數據品質，執行流程如圖 4.8.2 所示。

5. 特定排放源的重新計算

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

4.8.3 其他產品使用六氟化硫及全氟碳化物 (2.G.3)

本項主要調查軍事應用、加速裝置、隔音窗戶、醫藥應用等等使用全氟碳化物及六氟化硫所造成的排放量。行政院環境保護署計畫 (2014)²² 表示，因國內此項目使用較少，故未進一步調查相關排放，即無其他產品使用全氟

碳化物及六氟化硫之排放。

4.8.4 使用氧化亞氮產品 (2.G.4)

本項主要調查軍醫藥應用、壓力噴劑、氧化劑、氣囊膨脹使用之疊氮化鈉生產等使用氧化亞氮所造成的排放量。行政院環境保護署計畫 (2014)²³ 表示，因國內此項目使用較少，故未進一步調查相關排放，即使用氧化亞氮產品之排放。

4.9 其他 (2.H)

2.H「其他製程」為工業製程及產品部門中排放趨勢最穩定之分類，分類項目僅 1 項 2.H.1「食品和飲料」，主要排放溫室氣體種類為二氧化碳。2014 年總部門排放量約 2 千公噸二氧化碳當量，約占工業製程及產品使用部門 0.01%，1990 至 2014 年排放量如表 4.9.1 所示。

4.9.1 食品及飲料工業 (2.H.1)

本分類調查項目產品包含酒類及食物生產等，「肉、魚及家禽」、「砂糖」、「植物油及動物油」、「動物飼料」統計氣體種類為 NMVOC，故這些項目僅統計活動數據，未納入統計，僅「啤酒生產」項目排放二氧化碳，故以下僅針對此項目進行說明。

4.9.1.1 啤酒 (2.H.1.a)




圖 4.8.2 高壓斷路器及其他開關絕緣氣體排放統計 QA/QC 流程

22、23 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。

1. 排放源及匯分類的描述：

啤酒生產係以麥芽、白米及啤酒花等原料，經糖化、發酵、貯酒、過濾及包裝等，其中，過濾階段需添加二氧化碳以符合產品標準，二氧化碳即來自此過程中排放。

2. 方法論議題：

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1，以啤酒產量及排放係數計算二氧化碳排放量。計算公式如下：

二氧化碳排放量 = 啤酒產量（公石）× 啤酒排放係數（公斤二氧化碳 / 公石產量）

(2) 排放係數

引用李占雙（2003）²⁴ 根據工廠實況推估之排放係數 0.45 公斤二氧化碳 / 公石啤酒生產。

(3) 活動數據

啤酒產量引用自經濟部統計處工業生產統計年報，1990 至 2014 年產量如表 4.9.2 所示。

(4) 排放量

啤酒產量如表 4.9.3 及圖 4.9.1 所示，因歷年產量穩定，

排放量亦維持穩定趨勢，每年約排放 1.5 至 2 千公噸二氧化碳當量。

(5) 完整性

經濟部統計處工業統計年報調查對象為全國廠商，屬於國家級統計數據，計算結果可代表我國啤酒生產排放量。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

同 4.2.3-3. (1)。

(2) 時間序列的一致性

1990 至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同 4.2.2-4。

5. 特定排放源的重新計算

表 4.9.1 臺灣 1990 至 2014 年其他製程排放量

（單位：千公噸二氧化碳當量）

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
2.H.1 食品和飲料	2.05	2.03	1.99	2.08	2.05	1.87	1.75	1.66	1.91
總計	2.05	2.03	1.99	2.08	2.05	1.87	1.75	1.66	1.91
年	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
2.H.1 食品和飲料	1.83	1.78	1.75	1.46	1.53	1.70	1.74	1.85	1.77
總計	1.83	1.78	1.75	1.46	1.53	1.70	1.74	1.85	1.77
年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
2.H.1 食品和飲料	1.73	1.83	1.74	1.69	1.82	1.70	1.67		
總計	1.73	1.83	1.74	1.69	1.82	1.70	1.67		

表 4.9.2 臺灣 1990 至 2014 年啤酒產量

（單位：千公石）

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
產量	4,557	4,507	4,416	4,633	4,553	4,163	3,882	3,680	4,234	4,073	3,964	3,881	3,235
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
產量	3,404	3,784	3,865	4,100	3,944	3,838	4,064	3,877	3,759	4,035	3,780	3,701	

24 李占雙，啤酒生產過程中 CO₂ 管理探討，拓璞科技開發責任有限公司，中國大陸，2003。

表 4.9.3 臺灣 1990 至 2014 年啤酒生產排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
排放量	2.05	2.03	1.99	2.08	2.05	1.87	1.75	1.66	1.91	1.83	1.78	1.75	1.46
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
排放量	1.53	1.70	1.74	1.85	1.77	1.73	1.83	1.74	1.69	1.82	1.70	1.67	




圖 4.9.1 臺灣 1990 至 2014 年啤酒生產排放量趨勢

經「工業製程與產品使用部門溫室氣體排放統計專家諮詢會」檢視無重新計算之建議，故無修正。

6. 特定排放源的改善計畫

無改善計畫。

參考文獻

1. IPCC, Guide lines for National Green house Gas Inventories, 2006。
2. Center for Global Environmental Research, National Greenhouse Gas Inventory report of Japan, 2014。
3. 經濟部統計處，2014 年工業生產統計年報，2015 年 3 月。
4. 財政部關稅總局，進出口統計資料庫。
5. 台灣區石油化學同業公會，台灣區石化公會年報，2015。
6. 台灣區鋼鐵工業同業公會，鋼鐵資訊，2015。
7. 行政院環境保護署，溫室氣體創新減量技術先期評估與政策建置工作計畫，2014。
8. 行政院環境保護署，碳捕集及封存技術與溫室氣體減量相關技術推動工作專案工作計畫，2012。
9. 行政院環境保護署，建立非二氧化碳溫室氣體管理制度與減量技術專案計畫，2011。
10. 行政院環境保護署，推動產業非二氧化碳溫室氣體排放減量，2009。
11. 行政院環境保護署，推動含氟溫室氣體產業排放減量，2008。
12. 行政院環境保護署，破壞臭氧層物質與含氟溫室氣體管理策略規劃專案，2006。
13. 行政院環境保護署，台灣地區工業製程、溶劑及其他產品使用之溫室氣體排放推估計畫，2000。
14. 李占雙，啤酒生產過程中二氧化碳管理探討，拓璞科技開發責任有限公司，中國大陸，2003。



第五章 農業部門 (CRF SECTOR 3)

- 
- 5.1 部門概述
 - 5.2 畜禽腸胃發酵
 - 5.3 畜禽糞尿處理
 - 5.4 水稻種植
 - 5.5 農耕土壤
 - 5.6 草原的焚燒
 - 5.7 農作物殘渣燃燒
 - 5.8 石灰處理
 - 5.9 尿素使用
 - 5.10 其他含碳肥料
 - 5.11 其他
- 
- 

第五章 農業部門 (CRF SECTOR 3)

5.1 部門概述

有關農業部門溫室氣體排放清冊之統計工作，係依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2006 年出版國家溫室氣體排放清冊指南（2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gases Inventories，以下簡稱 2006 IPCC 指南）第四卷所述，農業部門溫室氣體排放共分為：3.A「畜禽腸胃發酵」、3.B「畜禽糞尿處理」、3.C「水稻種植」、3.D「農業土壤」、3.E「草原焚燒」、3.F「作物殘體燃燒」、3.G「石灰處理」、3.H「尿素施用」。本文計算二氧化碳當量所使用之甲烷與氧化亞氮之溫暖化潛勢（Global Warming Potential, 以下簡稱 GWP）分別為 25 與 298²。

其中畜牧產業之排放源有「畜禽腸胃發酵」（甲烷）及「畜禽糞尿處理」（甲烷及氧化亞氮），其計算範疇係指人類所飼養的家畜及家禽，至於野生動物因生態過於複雜不予列計。農糧產業之排放源主要有來自農地的「水稻種植」（甲烷及氧化亞氮）、「作物殘體燃燒」（甲烷及氧化亞氮）及來自土壤施肥的「農業土壤」（氧化亞氮）、「石灰處理」（二氧化碳）與「尿素施用」（二氧化碳），至於「草原焚燒」因臺灣地理環境極少草原故不列入計算。上述農糧與畜牧產業於生產活動中使用燃料部分則在能源部門計算。

臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量及其趨勢如表 5.1.1 及圖 5.1.1 所示，自 1990 年起即呈現逐年下降趨勢，主要因臺灣加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）及經貿自由化、衝擊國內農業生產造成耕地面積及畜禽飼養減少等因素，另三段式家畜糞尿處理、合理化施肥推廣落實亦有助溫室氣體之減量。其中禽畜部門排放量在 1996 年後連續 2 年較大幅度下降，係口蹄疫大量豬隻死亡，飼養頭數銳減之故。臺灣 2014 年農業部門溫室氣體排放源占比如圖 5.1.2，農業土壤 49.1% 為最大占比，其他如畜禽腸胃發酵占 20.6%、畜禽

糞尿處理占 8.6%、水稻種植占 20.1%、尿素施用占 1.4%、作物殘體燃燒占 0.2%。

5.2 畜禽腸胃發酵（3.A）

畜禽腸胃發酵是指人類飼養的家畜及家禽，消化過程中腸胃發酵所產生的甲烷量，草食動物腸胃發酵所產生的甲烷量大於雜食動物所產生者，而草食動物中反芻類所產生的甲烷量又較非反芻類大。

1. 排放源及匯分類的描述

甲烷是動物腸胃發酵的副產物，在消化的過程中透過微生物將碳水化合物分解成較小的分子，然後被血液所吸收，以提供動物體所需的養分；惟微生物分解作用中同時會產生甲烷等氣體，又以反芻動物產生之甲烷最多。雖然反芻動物腸胃發酵所產生的甲烷量遠大於非反芻動物者，惟臺灣地處亞熱帶，加以並無宗教之束縛，畜禽飼養以豬及雞為主，牛、羊等反芻動物飼養量相對少，鹿及馬飼養頭數更少，另因境內河川溪流密布，鴨鵝等水禽飼養極具本土特色。

在腸胃發酵生成甲烷之研究方面，家禽之研究為臺灣特色，因此 2006 IPCC 指南雖未估算家禽類，臺灣仍將自 1998 年起之研究成果計入，其研究並細分為家禽 - 白色肉雞、家禽 - 有色肉雞、家禽 - 蛋雞、家禽 - 鵝及家禽 - 肉鴨；至於乳牛之研究排放係數雖大於 IPCC，但與畜牧大國使用之本土係數反較相近。因此臺灣畜禽類腸胃發酵甲烷排放量之估算方法，亦大致依據 2006 IPCC 指南之原則如表 5.2.1，係統計國內飼養量大或有研究者，如牛、山羊、豬、雞、鵝及鴨，至於鹿及馬之排放量分別未達總排放量之 5%，而綿羊、駱駝、駱馬及騾臺灣並無商業飼養，故均不計入。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

依據 2006 IPCC 指南，臺灣畜禽腸胃發酵甲烷排放量的計算方法，已投入本土研究多年者，採用方法 3（Tier 3），如乳牛及家禽，係本土個別畜種的腸胃發酵甲烷排放係數乘以該畜種年度活動數據的加總，至於尚無或尚

1 IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use, Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management, 2006.

2 IPCC, Climate Change 2007, the Fourth Assessment Report (AR4) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007.

未確認本土腸胃發酵甲烷排放係數者，則採用方法 1 (Tier 1)，如水牛及豬，係以 2006 IPCC 指南設定該畜種之腸胃發酵甲烷排放係數乘以該畜種年度活動數據的加總。

公式 5.2.1 畜禽腸胃發酵甲烷之排放量

$$\text{畜禽腸胃發酵甲烷之排放量} = \text{EF} \times \text{各類畜禽年度活動數據} \times (\text{Gg}/10^6 \text{kg})$$

表 5.1.1 臺灣 1990 至 2014 年農業部門溫室氣體排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	二氧化碳 (CO ₂)		甲烷 (CH ₄)					氧化亞氮 (N ₂ O)				農業部門溫室氣體排放量總計
	3.G 石灰處理	3.H 尿素施用	3 農業部門排放總量	3.A 畜禽腸胃發酵	3.B 畜禽糞尿管理	3.C 水稻種植	3.F 作物殘體燃燒	3 農業部門排放總量	3.B 畜禽糞尿管理	3.D 農耕土壤	3.F 作物殘體燃燒	
1990	NE	141.6	1,872.6	669.6	205.9	959.5	37.6	1,896.9	48.1	1,837.2	11.6	3,911.1
1991	NE	145.9	1,900.7	731.0	236.5	908.4	24.8	1,933.5	50.0	1,875.8	7.7	3,980.1
1992	NE	139.1	1,863.6	737.6	233.7	844.7	47.6	1,866.5	52.1	1,799.7	14.7	3,869.1
1993	NE	130.6	1,862.8	775.4	240.5	825.3	21.7	1,896.8	53.6	1,836.5	6.7	3,890.3
1994	NE	134.9	1,832.0	788.7	247.2	775.2	20.9	1,883.4	59.1	1,817.8	6.5	3,850.3
1995	NE	151.0	1,854.9	822.2	258.8	766.5	7.4	1,871.6	61.1	1,808.2	2.3	3,877.5
1996	NE	150.8	1,839.3	822.2	265.7	744.5	6.9	1,906.8	67.0	1,837.7	2.1	3,896.9
1997	NE	133.7	1,722.8	731.7	219.2	764.7	7.1	1,710.1	70.0	1,637.9	2.2	3,566.6
1998	NE	127.0	1,622.5	673.7	191.9	751.3	5.6	1,609.0	71.0	1,536.3	1.7	3,358.5
1999	NE	118.5	1,644.1	694.4	204.8	738.0	6.9	1,582.9	72.2	1,508.6	2.1	3,345.5
2000	NE	130.8	1,618.1	692.4	209.8	702.1	13.8	1,793.7	72.7	1,716.7	4.3	3,542.6
2001	NE	94.2	1,565.0	659.6	201.1	689.2	15.1	1,719.5	70.6	1,644.2	4.7	3,378.7
2002	NE	93.2	1,479.2	635.8	193.9	636.6	12.9	1,729.1	70.5	1,654.6	4.0	3,301.4
2003	NE	82.5	1,394.3	625.7	192.3	567.4	8.9	1,597.0	70.8	1,523.5	2.7	3,073.8
2004	NE	83.5	1,319.9	614.2	193.1	504.9	7.7	1,710.4	69.4	1,638.6	2.4	3,113.8
2005	NE	62.3	1,386.9	622.8	195.3	560.8	7.9	1,598.0	71.2	1,524.4	2.4	3,047.2
2006	NE	59.5	1,367.9	613.8	194.6	551.1	8.4	1,628.8	72.3	1,553.9	2.6	3,056.2
2007	NE	57.5	1,340.9	608.7	185.0	542.7	4.6	1,594.6	70.8	1,522.4	1.4	2,993.1
2008	NE	56.8	1,299.2	584.4	179.7	529.0	6.1	1,514.0	71.7	1,440.4	1.9	2,870.0
2009	NE	55.5	1,281.5	571.0	175.0	530.4	5.0	1,547.0	71.0	1,474.4	1.6	2,884.0
2010	NE	53.8	1,274.3	578.5	176.4	514.1	5.3	1,528.1	70.5	1,456.0	1.6	2,856.2
2011	NE	52.8	1,301.1	589.6	180.1	526.0	5.4	1,468.6	70.7	1,396.2	1.7	2,822.5
2012	NE	54.9	1,300.0	582.9	172.1	539.6	5.4	1,496.5	70.7	1,424.1	1.7	2,851.3
2013	NE	45.4	1,304.0	579.2	166.3	555.3	3.3	1,431.6	71.3	1,359.3	1.0	2,781.0
2014	NE	39.9	1,286.0	566.3	163.6	552.4	3.6	1,427.1	73.1	1,352.9	1.1	2,752.9

備註：1. 依據 2006 IPCC 指南計算。

2. 溫室氣體排放量統計基準，係依中華民國國家標準 CNS14064-1,Q1005-1 溫室氣體全球暖化趨勢 (GWPs) 值換算為二氧化碳當量 (CO₂e)，二氧化碳 (CO₂)：甲烷 (CH₄)：氧化亞氮 (N₂O)=1：25：298。

3. 2005 年以前之統計資料未包含金門縣及連江縣 (因其自行統計未併入臺灣地區)。

4. NE：未估算。




圖 5.1.1 臺灣 1990 至 2014 年臺灣農業部門排放量趨勢

其中，甲烷排放量：腸胃發酵甲烷排放量（Gg/年）

EF：某畜種腸胃發酵的排放係數

使用的畜禽種類分別為：

產乳牛（[泌乳牛]+[乾乳牛]）、其他牛（[未產女牛]+[乳用牛-乳公牛]+[肉用牛-乳公牛]+[肉用牛-黃牛及雜種牛]+[役用牛-黃牛及雜種牛]）、水牛、山羊（[肉羊]+[乳羊]）、豬（所有豬）、白色肉雞、有色肉雞、蛋雞（[蛋雞]+[蛋種雞]+[肉種雞]）、鵝及肉鴨。

（2）排放係數

臺灣自 1998 年起，進行一系列畜禽溫室氣體排放的研究，並於 2001 年經由相關專家召開研究結果的審查，確立乳牛、雞、鴨及鵝腸胃發酵的甲烷排放係數本土值，至於豬隻因係高度經濟動物，與其他國家豬隻品種與性能表現均大致相同，因此直接採用 2006 IPCC 指南的預設值；另山羊部分因無國內研究，亦採用 IPCC 的設定值；而鹿及馬之排放量未及總排放量之 5%，不予計入。而排放係數的單位則與活動數據的估算方式一致，生命週期大於 1 年或全年飼養量均一者，其排放係數的單位為每年每頭（隻）腸胃發酵的甲烷排放量；至如白色肉雞、有色肉雞、鵝及鴨等生命週期僅數月或全年飼養量較不一致者，其排放係數單位則為每個生命週期每隻腸胃發酵的甲烷排放量。有關臺灣畜禽腸胃發酵排放甲烷之係數詳表 5.2.1。

依據近年臺灣酪農飼養環境及使用芻料之改變，分別測定其腸胃發酵之甲烷排放量（如表 5.2.2），檢討修正國內荷蘭乳牛的甲烷排放量，產乳牛排放係數為 125.1 kg/頭，其他牛則維持 64.2 kg/頭（如表 5.2.3），至於家禽的排放係數引用說明如表 5.2.4。

（3）活動數據

依據 2006 IPCC 指南，畜禽活動數據一般為當年底的在養頭隻數，惟對於生命週期僅數月的畜種，如白色肉雞、有色肉雞、鵝及鴨，則以當年度總生產隻數為其活動數據，臺灣估算畜禽腸胃發酵溫室氣體排放量中所採用的活動數據亦遵循此法，如產乳牛、其他牛、豬、水牛、山羊、蛋雞的活動數據即為該畜種當年底的在養量，至白色肉雞、有色肉雞、鵝及鴨，由於臺灣畜禽統計調查結果並未發布家禽之年生產隻數，爰以與年生產隻數相當的年屠宰隻數為該家禽的活動數據。

（4）排放量

臺灣 1990 年至 2014 年畜牧產業之畜禽腸胃發酵甲烷排放量，1990 年適逢國內畜牧業蓬勃發展，因此畜禽飼養量逐年攀升，畜禽腸胃發酵甲烷排放量隨之增加，到 1996 年達到高峰，畜禽腸胃發酵甲烷排放量亦是；1997 年國內養豬業發生口蹄疫，自此國內畜禽飼養量陡降，2001 年起臺灣為加入世界貿易組織（WTO）提前開放國外畜禽產品進口，畜產市場國際化後，均使國內畜禽飼養量下滑迄今，其間雖有短暫市場現象略有波動，惟整體而言，仍呈現逐年遞減趨勢，因此畜禽腸胃發酵之甲烷排放量亦是自 2001 年以後逐年遞減趨勢。

臺灣畜禽腸胃發酵的甲烷排放量，為包含產乳牛、其他牛、水牛、山羊、豬、白色肉雞、有色肉雞、蛋雞、鵝及鴨等 10 種主要畜種，先分別計算其腸胃發酵甲烷排放係數乘以該畜種年度活動數據得到該畜種當年度的腸胃發酵甲烷排放量，再予以加總所得。




圖 5.1.2 臺灣 2014 年農業部門溫室氣體各排放源占比



表 5.2.1 臺灣畜禽腸胃發酵排放甲烷之係數表

	細分類		溫室氣體類別	排放係數 (EF)			
				係數	單位	來源	說明
腸胃發酵	牛 (Cattle)	產乳牛 (Dairy cattle)	甲烷	125.1	kg /head/yr	本土值	IPCC 為 68
		非產乳牛 (Non-Dairy cattle)		64.3			IPCC 為 47
	豬 (Swine)		甲烷	1.5	kg /head/yr	IPCC	
	水牛 (Buffalo)		甲烷	55	kg /head/yr	IPCC	
	山羊 (Goats)		甲烷	5	kg /head/yr	IPCC	
	家禽 (Poultry)		甲烷	1.587 × 10 ⁻⁵	kg /bird/life cycle	本土值	IPCC 資料不足無法計算
白色肉雞		8.482 × 10 ⁻⁵		kg /bird/life cycle	本土值		
有色肉雞		1.061 × 10 ⁻²		kg /head/yr	本土值		
蛋雞		1.50 × 10 ⁻³		kg /bird/life cycle	本土值		
鵝		2.071 × 10 ⁻³		kg /bird/life cycle	本土值		

表 5.2.2 國產牧草飼糧對荷蘭乳牛乾物採食量與瘤胃發酵甲烷排放量之影響

牛群	盤固草	狼尾草	青貯玉米料	平均
泌乳牛				
乳量, kg/head/day	22.7	18.2	21.3	20.7
採食量, kg/head/day	18.1	19.1	19.0	18.7
甲烷排放量, g/head/day	440	414	375 (-12%)	411
乾乳牛				
採食量, kg/head/day	6.2	6.3	9.4	7.3
甲烷排放量, g/head/day	243	189 (-23%)	250	227
生長女牛				
採食量, kg/head/day	4.4	3.1	4.1	3.9
甲烷排放量, g/head/day	193	164	167 (-13%)	176

表 5.2.3 臺灣荷蘭乳牛瘤胃發酵甲烷排放量推估

項目	產乳牛 (泌乳牛、乾乳牛)	生長女牛
頭數比例	55% (43%, 12%)	45%
每年排放係數, kg /head/yr	125.1	64.2

(資料來源：李春芳，個人通訊，行政院農業委員會畜產試驗所營養組，2014年12月19日「畜牧業溫室氣體清冊更新專家諮詢會」會議紀錄)

表 5.2.4 臺灣畜禽腸胃發酵排放甲烷係數引用說明表

	細分類	溫室氣體類別	單位	引用說明
腸胃發酵	白色肉雞 ³	甲烷	kg /bird/life cycle	依文獻於不同情境下之係數： 1. 冷季 (< 15°C) : 2.04 × 10 ⁻⁵ ; 2. 溫季 (15-25°C) : 1.626 × 10 ⁻⁵ ; 3. 熱季 (> 25°C) : 1.079 × 10 ⁻⁵ ; 計算出平均排放係數：1.587 × 10 ⁻⁵
	有色肉雞 ⁴	甲烷	kg /bird/life cycle	依文獻於不同情境下之係數： 1. 冷季 (< 15°C) : 1.2615 × 10 ⁻⁴ ; 2. 熱季 (> 25°C) : 4.349 × 10 ⁻⁵ ; 計算出平均排放係數：8.482 × 10 ⁻⁵
	蛋雞 ⁵	甲烷	kg /head/yr	將產蛋雞在 12 個月呼吸室試驗期間之腸內發酵釋放量換算成每隻每日釋放量，對應時間作圖，並計算線下總面積，以不換羽期之數據推估得到甲烷腸內發酵氣體排放量為 1.061 × 10 ⁻² kg /head/yr。
	鵝 ⁶	甲烷	kg /bird/life cycle	直接引用排放係數：1.50 × 10 ⁻³ 。
	肉鴨 ⁷	甲烷	kg /bird/life cycle	直接引用排放係數：2.071 × 10 ⁻³ 。

3 黃大駿、王淑音，臺灣地區白色肉雞產業之溫室氣體排放，中國畜牧學會會誌，29 (1) : 65-75，2000。

4 黃大駿，臺灣地區肉雞產業溫室氣體排放之探討，中國文化大學碩士論文，2000。

5 王淑音、馬維君、黃大駿，臺灣地區蛋雞產業之腸內發酵溫室氣體排放估測，中國畜牧學會會誌，31 (3) : 221-230，2002。

6 王淑音、謝憲蔚、王思涵、陳盈豪，應用呼吸室測定鵝之腸內發酵溫室氣體排放係數，中國畜牧學會會誌，32 (1) : 43-50，2003。

7 蔡明宏、陳筱薇、黃楷翔、林政緯、王淑音，肉鴨腸內發酵溫室氣體排放係數，中國畜牧學會會誌，32 (4) : 151，2003。

表 5.2.5 臺灣 1990 年至 2014 年畜禽活動數據

(單位：頭(家畜)/千隻(家禽))

年	細分類	產乳牛	其他牛 ^a	水牛 ^a	山羊 ^a	豬 ^a	白色肉雞 ^b	有色肉雞 ^b	蛋雞 ^a	鵝 ^b	鴨 ^b
1990		46,342	86,020	21,876	206,366	8,565,250	74,415	135,664	25,875	4,777	38,269
1991		49,433	84,805	18,618	214,946	10,089,137	91,504	126,692	26,484	4,628	34,739
1992		53,295	87,955	16,623	247,093	9,754,460	104,247	136,831	27,821	5,683	38,794
1993		57,652	91,460	16,489	365,632	9,844,920	123,161	147,906	28,716	6,397	43,540
1994		58,812	90,549	14,909	400,674	10,065,552	133,495	149,933	31,970	8,521	38,904
1995		66,377	85,565	12,883	430,238	10,508,502	149,451	150,756	32,987	7,744	40,510
1996		62,846	89,055	11,213	428,175	10,698,366	159,983	164,084	36,470	7,078	39,628
1997		65,281	91,508	9,601	442,552	7,966,887	185,280	180,072	39,275	7,503	39,010
1998		66,514	90,329	8,556	402,544	6,538,596	189,535	175,215	40,386	7,955	33,603
1999		66,175	89,884	9,189	363,135	7,243,194	185,077	175,328	40,874	7,464	33,159
2000		66,140	87,793	7,767	315,045	7,494,954	191,202	173,627	41,086	6,503	32,075
2001		65,125	80,851	6,531	284,105	7,164,605	189,288	161,987	39,941	6,330	30,158
2002		64,517	79,572	5,370	249,729	6,793,941	188,667	164,406	39,976	6,178	29,065
2003		59,467	84,491	4,912	241,027	6,778,799	190,127	156,508	40,224	6,402	29,084
2004		54,615	85,216	4,962	249,362	6,818,970	207,440	145,809	39,343	6,510	30,546
2005		53,198	83,725	4,101	267,753	7,194,768	167,032	143,492	40,366	6,450	31,821
2006		52,313	82,145	3,538	272,038	7,091,822	181,848	138,954	41,048	6,723	36,039
2007		53,171	89,382	3,452	254,715	6,640,047	177,413	135,530	40,315	5,873	35,024
2008		52,628	81,461	3,599	235,062	6,443,311	178,676	122,974	40,955	5,149	29,982
2009		53,230	80,546	3,862	212,766	6,145,950	190,498	121,136	40,610	4,593	27,634
2010		55,296	80,862	3,844	204,854	6,185,952	191,993	123,849	40,269	4,700	28,546
2011		57,196	83,489	3,627	190,440	6,256,546	200,707	130,838	40,371	5,130	28,808
2012		59,145	83,864	3,177	167,103	6,004,717	186,994	118,759	40,452	4,929	27,253
2013		60,500	84,387	2,511	160,850	5,806,237	183,586	102,974	40,937	5,160	32,460
2014		60,103	83,199	2,437	157,778	5,545,010	196,131	109,010	42,079	5,549	36,786

備註：1.^a 為年底在養頭/隻數，^b 為當年總生產量。2. 資料來源：中華民國農業統計年報⁸及畜禽統計調查結果⁹，行政院農業委員會。

3. 2005 年以前之統計資料未包含金門縣及連江縣（因其自行統計未併入臺閩地區）

表 5.2.6 臺灣 1990 年至 2014 年畜禽腸胃發酵之甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	細分類	產乳牛	其他牛	水牛	山羊	豬	白色肉雞	有色肉雞	蛋雞	鵝	鴨	合計
1990		144.93	138.28	30.08	25.08	321.20	0.03	0.29	6.86	0.18	1.98	669.62
1991		154.60	136.32	25.60	26.87	378.34	0.04	0.27	7.02	0.17	1.80	731.04
1992		166.68	141.39	22.86	30.91	365.79	0.04	0.29	7.38	0.21	2.01	737.56
1993		180.31	147.02	22.67	45.70	369.18	0.05	0.31	7.62	0.24	2.25	775.36
1994		183.93	145.56	20.50	50.08	377.46	0.05	0.32	8.48	0.32	2.01	788.72
1995		207.59	137.55	17.71	53.78	394.07	0.06	0.32	8.75	0.29	2.10	822.22
1996		196.55	143.16	15.42	53.52	401.19	0.06	0.35	9.67	0.27	2.05	822.24
1997		204.18	147.10	13.20	55.32	298.76	0.07	0.38	10.42	0.28	2.02	731.73
1998		208.02	145.20	11.76	20.32	245.20	0.08	0.37	10.71	0.30	1.74	673.70
1999		206.961	144.49	12.63	45.39	271.62	0.07	0.37	10.84	0.28	1.72	694.38
2000		206.85	141.13	10.68	39.38	281.06	0.08	0.37	10.90	0.24	1.66	692.35
2001		203.68	129.97	8.98	35.51	268.67	0.08	0.34	10.59	0.24	1.56	659.62
2002		201.78	127.91	7.38	31.22	254.77	0.07	0.35	10.60	0.23	1.50	635.83
2003		185.98	135.82	6.75	30.13	254.20	0.08	0.33	10.67	0.24	1.51	625.71
2004		170.81	136.98	6.82	31.17	255.71	0.08	0.31	10.44	0.25	1.58	614.15
2005		166.38	134.59	5.64	33.47	269.80	0.07	0.30	10.71	0.24	1.65	622.84
2006		163.61	132.05	4.86	34.00	265.94	0.07	0.29	10.89	0.25	1.87	613.84
2007		166.29	143.68	4.75	31.84	249.00	0.07	0.29	10.69	0.22	1.81	608.65
2008		164.59	130.95	4.95	29.38	241.62	0.07	0.26	10.86	0.19	1.55	584.44
2009		166.48	129.48	5.31	26.60	230.47	0.08	0.26	10.77	0.17	1.43	571.04
2010		172.94	129.99	5.29	25.61	231.97	0.08	0.26	10.68	0.18	1.48	578.46
2011		178.88	134.21	4.99	23.81	234.96	0.08	0.28	10.71	0.19	1.49	589.59
2012		184.98	134.81	4.37	20.89	225.18	0.07	0.25	10.73	0.18	1.41	582.87
2013		189.21	135.65	3.45	20.11	217.73	0.07	0.22	10.86	0.19	1.68	579.18
2014		187.97	133.74	3.35	19.72	207.94	0.08	0.23	11.16	0.21	1.90	566.31

8 行政院農業委員會，中華民國農業統計年報，2015。

9 行政院農業委員會，畜禽統計調查結果，2015。

(5) 完整性

已將臺灣目前主要且穩定飼養之畜禽種類均包括在內。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關畜禽腸胃發酵甲烷(3A)排放量之估算，其中活動數據部分係引用行政院農業委員會(以下簡稱農委會)逐年辦理普查之資料(農業統計年報)，依2006 IPCC指南設定不確定性為5%；預設排放係數因未提供不確定性；暫無法估算。至本土研究之排放係數及排放量之不確定性，尚待研究估算中。

(2) 時間序列的一致性

1990年至2014年排放係數、活動數據來源及計算方法皆維持一致。

4. 特定排放源的QA/QC及查證

活動數據主要來自行政院農業委員會(簡稱農委會)之農業統計調查資料，而農委會依據統計法、統計法施行細則及其他有關法令之規定特別訂頒「農情調查工作評鑑要點」，已建立完善之農情調查制度。QA/QC及查證流程為在準備農業部門畜牧部分(含3A及3B)溫室氣體排放清冊過程中，先安排專家諮詢及同行審議機制；畜牧部分清冊初稿完成後，再邀請專家學者所組成之審議小組，審議數據之正確性，並提供改善建議，經修正後再提送農委會所成立之農業部門溫室氣體專家審議會，經審查修正定稿後，完成農業部門溫室氣體排放清冊階段之QA/QC及查證。最後送行政院環境保護署併同其他部門之清冊，辦理國家溫室氣體排放清冊之QA/QC及查證程序。

5. 特定排放源的重新計算

以往產乳牛及其他牛腸胃發酵(3A)甲烷排放係數本土值分別為134.7公斤/頭/年及64.3公斤/頭/年，均係農委會畜產試驗所於1998年至2001年間參與前行政院國家科學委員會計畫團隊及農委會科技計畫團隊之研究結果，並依1996年IPCC指南修正版重新估算所得，惟鑑於近年來國內餵飼乳牛芻料之品項不同於20年前，在小地主大佃農政策推動下，青割玉米餵飼乳牛量大幅提高，致使腸胃發酵之甲烷排放量不同於90年代所提排放係數之計算基準。

農委會參考近年來之實測數據(如表5.2.2)，以及近年農業統計年報資料顯示國內泌乳牛、乾乳牛及生長女牛族群數為43%、12%及45%之比例，並於2014年下半年密集召開畜禽溫室氣體專家諮詢會研商，業依2014年12月19日「畜牧業溫室氣體清冊更新專家諮詢會」決議，修正產乳牛之腸胃發酵(3A)甲烷排放係數本土值為125.1公斤/頭/年，其他牛則維持64.3公斤/頭/年。

另查臺灣水牛飼養量極少，檢視國內研究資料並無水牛溫室氣體排放之相關研究，農委會業依2014年12月19日「畜牧業溫室氣體清冊更新專家諮詢會」決議，自2015年報告1990至2013年之清冊報告起，修正水牛腸胃發酵(3A.1)甲烷排放係數為2006 IPCC指南設定值之55公斤/頭/年。

6. 特定排放源的改善計畫

有關豬腸胃發酵甲烷排放之研究，以往雖因故研究中斷致一直引用2006 IPCC指南預設係數，惟養豬為臺灣主要畜牧經濟活動之一，而農委會畜試所歷時4年之國內豬隻活體溫室氣體排放量調查，已將摘要發表於2015年12月份中國畜牧學會會誌，顯示國內豬隻腸胃發酵甲烷排放係數為3.04公克/頭/日或1.11公斤/頭/年，將俟該研究報告完備後再予採用。

5.3 畜禽糞尿處理(3.B)

人類飼養的家畜及家禽，除於消化過程中因腸胃發酵產生甲烷外，其經排泄及排遺作用所產生的糞尿也會產生甲烷及氧化亞氮類之溫室氣體，尤以在人類將畜禽飼養視為國家重要經濟生產時，飼養之畜禽均已經育種改進為快速生長或生產之品種，日常代謝量大，致使糞尿量亦大，因此其產生之甲烷及氧化亞氮量亦不容忽視。

5.3.1 畜禽糞尿處理 - 甲烷

1. 排放源及匯分類的描述

臺灣地狹人稠，又位處亞熱帶，畜牧場尤以養豬、牛場，習以大量清水清潔畜舍並為畜舍及家畜降溫、散熱，自畜舍排出之糞尿通常已混入大量沖洗水，因此環保法規對畜牧場之管理係以處理廢水為導向，要求畜牧場處理至符合放流水後再放流出場外。反觀美加紐澳或歐盟等畜牧大國將動物糞尿視為再生資源，又因多處溫帶或採放牧，鮮少用水，故糞尿得以儲存或堆置方式暫處理，待種植作

物時，再施用於農地充當液肥。所以臺灣與其他國家在畜牧糞尿處理上，雖然過程中亦會產出溫室氣體甲烷及氧化亞氮，惟其產生量及排放方式截然不同。

臺灣自 2000 年起，飼養豬 200 頭以上、牛 50 頭以上之畜牧場均設置廢水處理設施，處理方式雖多，仍以三段式廢水處理系統（固液分離→厭氣發酵→好氣處理）為主。因此在畜禽糞尿處理上，豬、牛糞尿之本土係數是以三段式廢水處理之各處理階段實測值彙總所得。另山羊及水牛部分，臺灣飼養量較少，相關研究亦少，則使用 2006 IPCC 指南設定之排放係數。

至家禽之糞尿處理部分，多經不同程度之堆肥後施用於田間，研究顯示此等管理方式較其他畜牧大國逕自堆放田野、僅乾燥或粗放之堆肥管理，在溫室氣體排放上減量許多；另臺灣自 1998 年投入研究以來，研究人員在禽糞堆肥處理方面，亦發表多篇白色肉雞、有色肉雞及蛋雞之報告，並亦經農委會召開專家諮詢會議決議通過，因此臺灣仍以國內研究人員研究禽糞堆肥處理實測所得之本土係數估算。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

依據 2006 IPCC 指南，臺灣畜禽糞尿處理過程中甲烷排放量的計算方法，係個別畜種的糞尿處理甲烷排放係數乘以該畜種年度活動數據的加總。

公式 5.3.1 畜禽糞尿處理之甲烷排放量

畜禽糞尿處理之甲烷排放量 = EF × 各類畜禽年度活動數據 × (Gg/10⁶kg)

其中，甲烷排放量：某種性畜糞尿管理系統中的甲烷排放量 (Gg/year)

EF：某畜種糞尿管理的排放係數

使用的畜禽種類分別為：

產乳牛（[泌乳牛]+[乾乳牛]）、其他牛（[未產女牛]+[乳用牛-乳公牛]+[肉用牛-乳公牛]+[肉用牛-黃牛及雜種牛]+[役用牛-黃牛及雜種牛]）、水牛、山羊（[肉羊]+[乳羊]）、豬（所有豬）、白色肉雞、有色肉雞及蛋雞（[蛋雞]+[蛋種雞]+[肉種雞]）。

(2) 排放係數

臺灣自 1998 年起，進行一系列畜禽溫室氣體排放的研究，並於 2001 年經由相關專家召開研究結果的審查，確立乳牛、豬、肉雞及蛋雞糞尿處理過程中的甲烷排放係數本土值；另水牛及山羊部分因尚無國內研究，則採用 2006 IPCC 指南的預設值。而排放係數的單位則與活動數據的估算方式一致，生命週期大於 1 年或全年飼養量均一者，其排放係數的單位為每年每頭（隻）糞尿處理過程中的甲烷排放量；至如白色肉雞及有色肉雞等生命週期僅數月或全年飼養量較不一致者，其排放係數單位則為每個生命週期每隻糞尿處理中的甲烷排放量。有關臺灣畜禽糞尿處理排放甲烷之係數及引用說明詳表 5.3.1 及表 5.3.2。

(3) 活動數據

同表 5.2.5。

(4) 排放量

臺灣畜禽糞尿處理中甲烷排放量，除前開隨畜禽飼養量起伏，2001 年以後逐年遞減趨勢外，尚因臺灣自 1980 年代末期起環保法規開始管制養豬業，農政部門自 1991 年起全面輔導畜牧業處理廢水、糞便堆肥化，更是使畜禽糞尿處理中甲烷排放量呈現逐年遞減趨勢，如表 5.3.3 所示。

臺灣畜禽糞尿處理中甲烷排放量，為包含產乳牛、其他牛、水牛、山羊、豬、白色肉雞、有色肉雞及蛋雞等八種主要畜種，先分別計算其糞尿處理過程中甲烷排放係數

表 5.3.1 臺灣畜牧部門糞尿處理排放甲烷之係數表

	細分類		溫室氣體類別	排放係數 (EF)			
				係數	單位	來源	說明
腸胃發酵	牛 (Cattle)	產乳牛 (Dairy cattle)	甲烷	4.898	kg /head/yr	本土值	IPCC 為 23
		非產乳牛 (Non-Dairy cattle)		1		IPCC	
	水牛 (Buffalo)		甲烷	2	kg /head/yr	IPCC	
	山羊 (Goats)		甲烷	0.2	kg /head/yr	IPCC	
	豬 (Swine)		甲烷	0.768	kg /head/yr	本土值	IPCC 為 5
家禽 (Poultry)	a. 白色肉雞		甲烷	0.00476	kg /bird/life cycle	本土值	IPCC 為 0.02
	b. 有色肉雞			0.00476		本土值	IPCC 為 0.02
	c. 蛋雞			0.00999		本土值	IPCC 為 0.03



乘以該畜種年度活動數據得到該畜種當年度的糞尿處理甲烷排放量，再予以加總所得。

(5) 完整性

臺灣豬、牛糞尿處理多以三段式廢水處理方式管理，惟目前清冊僅計算各處理階段所排放之溫室氣體量，尚未將固液分離後所產出畜糞渣另行堆肥化之溫室氣體排放量計入。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關畜禽糞尿處理(3B)甲烷排放清冊之估算，其中活動數據係依據農委會逐年辦理普查(農業統計年報)，依2006 IPCC 指南設定不確定性為5%；預設排放係數因未提供不確定性；暫無法估算。至排放係數及排放量之不確定性尚待研究估算中。

表 5.3.2 臺灣畜禽糞尿處理排放甲烷係數引用說明表

	細分類	溫室氣體類別	單位	引用說明
腸胃發酵	產乳牛 ¹⁰	甲烷	kg/head/yr	依文獻於不同情境下之係數： 1. 月均溫 < 20°C：5.398；2. 月均溫介於 20~25°C：4.802；3. 月均溫介於 26~30°C：4.495；計算出平均排放係數：4.898
	豬 ¹¹	甲烷	kg/head/yr	依文獻於不同情境下之係數： 1. 月均溫 < 20°C：1.393；2. 月均溫介於 20~25°C：0.462；3. 月均溫介於 26~30°C：0.449；計算出平均排放係數：0.768
	肉雞 ¹² (白色肉雞、有色肉雞)	甲烷	kg/bird/life cycle	依文獻於不同情境下之係數： 冷季 (< 15°C)：4.480×10 ⁻⁵ ；溫季 (15-25°C)：3.245×10 ⁻³ ；熱季 (> 25°C)：1.25×10 ⁻² ；計算出平均排放係數：4.76×10 ⁻³
	蛋雞 ¹³	甲烷	kg/bird/yr	直接引用排放係數：0.00999

表 5.3.3 臺灣 1990 年至 2014 年畜禽糞尿處理之甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	細分類	產乳牛	其他牛	水牛	山羊	豬	白色肉雞	有色肉雞	蛋雞	合計
1990		5.67	2.15	1.09	1.03	164.45	8.86	16.14	6.46	205.87
1991		6.05	2.12	0.93	1.07	193.71	10.89	15.08	6.61	236.47
1992		6.53	2.20	0.83	1.24	187.29	12.41	16.28	6.95	233.71
1993		7.06	2.29	0.82	1.83	189.02	14.66	17.60	7.17	240.45
1994		7.20	2.26	0.75	2.00	193.26	15.89	17.84	7.98	247.19
1995		8.13	2.14	0.64	2.15	201.76	17.78	17.94	8.24	258.79
1996		7.70	2.23	0.56	2.14	205.41	19.04	19.53	9.11	265.70
1997		7.99	2.29	0.48	2.21	152.96	22.05	21.43	9.81	219.22
1998		8.14	2.26	0.43	2.01	125.54	22.55	20.85	10.09	191.88
1999		8.10	2.25	0.46	1.82	139.07	22.02	20.86	10.21	204.79
2000		8.10	2.19	0.39	1.58	143.90	22.75	20.66	10.26	209.84
2001		7.79	2.02	0.33	1.42	137.56	22.53	19.28	9.98	201.08
2002		7.90	1.99	0.27	1.25	130.44	22.45	19.56	9.98	193.85
2003		7.28	2.11	0.25	1.21	130.15	22.63	18.62	10.05	192.29
2004		6.69	2.13	0.25	1.25	130.92	24.69	17.35	9.83	193.10
2005		6.51	2.09	0.21	1.34	138.14	19.88	17.08	10.08	195.32
2006		6.41	2.05	0.18	1.36	136.16	21.64	16.54	10.25	194.59
2007		6.51	2.23	0.17	1.27	127.49	21.11	16.13	10.07	184.99
2008		6.44	2.04	0.18	1.18	123.71	21.26	14.63	10.23	179.67
2009		6.52	2.01	0.19	1.06	118.00	22.67	14.42	10.14	175.02
2010		6.77	2.02	0.19	1.02	118.77	22.85	14.74	10.06	176.42
2011		7.00	2.09	0.18	0.95	120.30	23.88	15.57	10.08	180.06
2012		7.24	2.10	0.16	0.84	115.29	22.25	14.13	10.10	172.11
2013		7.41	2.11	0.13	0.80	111.48	21.85	12.25	10.22	166.25
2014		7.36	2.08	0.12	0.79	106.46	23.34	12.97	10.51	163.64

10 Jung-Jeng Su, Bee-Yang Liu and Yuan-Chie Chang, Emission of greenhouse gas from livestock waste and wastewater treatment in Taiwan, Agriculture Ecosystem & Environment 95, pp.253-263, 2003.

11 同註 10。

12 王淑音、黃大駿、許皓豐，肉雞糞尿處理溫室氣體排放之推估，臺灣農業化學與食品科學，39(6)：415-422，2001。

13 王淑音，臺灣家禽溫室氣體糞尿處理策略，2010。

(2) 時間序列的一致性

1990 年至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法皆維持一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同章節 5.2 畜禽腸胃發酵 (3.A) 之說明。

5. 特定排放源的重新計算

無。

6. 特定排放源的改善計畫

由於目前清冊僅計算各處理階段所排放之溫室氣體量，尚未將第 1 段所產出畜糞渣另行堆肥化之溫室氣體排放量計入，未來將朝建立此部分本土係數及資料之方向努力。

5.3.2 畜禽糞尿處理 - 氧化亞氮

1. 排放源及匯分類的描述

大致與「5.3.1 畜禽糞尿處理 - 甲烷」之排放源相同。雖然臺灣在畜牧糞尿處理上與其他國家不同，因此溫室氣體之排放計算儘量以本土投入研究之產乳牛、豬及雞為主。至對山羊及水牛因臺灣飼養量少、且無相關研究，惟

因甲烷部分 2006 IPCC 指南有相對應之係數可採用，尚能納入上一節中合併採計；但有關本節氧化亞氮部分，2006 IPCC 指南之運算係透過一連串之設定糞尿處理方式、設定糞尿中氮含量，才帶出氧化亞氮之排放係數，臺灣山羊及水牛因飼養量少，缺乏相關前置研究，致無法帶出氧化亞氮排放係數，故現階段暫不採計。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

依據 2006 IPCC 指南，臺灣畜禽糞尿處理過程中氧化亞氮排放量的計算方法，係個別畜種的糞尿處理氧化亞氮排放係數乘以該畜種年度活動數據的加總。¹⁴

公式 5.3.2 畜禽糞尿處理之氧化亞氮排放量

畜禽糞尿處理之氧化亞氮排放量 = EF × 各類畜禽年度活動數據 × (Gg/10⁶kg)

其中，氧化亞氮排放：某種牲畜糞尿管理系統中的 N₂O 排放量 (Gg/year)

EF：某畜種糞尿管理的排放係數

使用的畜禽種類分別為：

產乳牛 ([泌乳牛]+[乾乳牛])、豬(所有豬)、白

表 5.3.4 臺灣畜牧部門糞尿處理排放氧化亞氮之係數表

腸胃發酵	細分類		溫室氣體類別	排放係數 (EF)			
				係數	單位	來源	說明
	牛 (Cattle)	產乳牛 (Dairy cattle)	氧化亞氮	0.011	kg /head/yr	本土值	
	豬 (Swine)		氧化亞氮	0.002	kg /head/yr	本土值	
	家禽 (Poultry)	a. 白色肉雞	氧化亞氮	6.43 × 10 ⁻⁶	kg /bird/life cycle	本土值	
		b. 有色肉雞		6.43 × 10 ⁻⁶	kg /bird/life cycle	本土值	
		c. 蛋雞		0.0055	kg /bird/yr	本土值	

表 5.3.5 臺灣畜禽糞尿處理排放氧化亞氮係數引用說明表

腸胃發酵	細分類	溫室氣體類別	單位	引用說明
	產乳牛 ¹⁵	氧化亞氮	kg /head/yr	依文獻於不同情境下之係數： 1. 月均溫 < 20°C：0.008；2. 月均溫介於 20~25°C：0.010；3. 月均溫介於 26~30°C：0.016；計算出平均排放係數：0.011
豬 ¹⁶	氧化亞氮	kg /head/yr	依文獻於不同情境下之係數： 1. 月均溫 < 20°C：0.002；2. 月均溫介於 20~25°C：0.001；3. 月均溫介於 26~30°C：0.001；計算出平均排放係數：0.002	
肉雞 ¹⁷ (白色肉雞、有色肉雞)	氧化亞氮	kg /bird/life cycle	依文獻於不同情境下之係數： 冷季 (< 15°C)：1.753 × 10 ⁻⁵ ；溫季 (15-25°C)：2.104 × 10 ⁻⁶ ；熱季 (> 25°C)：4 × 10 ⁻⁶ ；計算出平均排放係數：6.43 × 10 ⁻⁶	
蛋雞 ¹⁸	氧化亞氮	kg /bird/yr	直接引用排放係數：0.0055	

14 家禽類之估算方式係由文化大學動物科學系王淑音教授提供；豬和牛係由臺灣動物科技研究所蘇忠楨博士提供。

15, 16 同註 10。

17 同註 12。

18 同註 13。



色肉雞、有色肉雞及蛋雞（[蛋雞] + [蛋種雞] + [肉種雞]）。

（2）排放係數

臺灣自 1998 年起，進行一系列畜禽溫室氣體排放的研究，並於 2001 年經由相關專家召開研究結果的審查，確立產乳牛、豬及雞糞尿處理過程中的氧化亞氮排放係數本土值；至山羊、鵝及鴨部分因無國內研究，尚未計入。而排放係數的單位則與活動數據的估算方式一致，生命週期大於 1 年或全年飼養量均一者，其排放係數的單位為每年每頭（隻）糞尿處理過程中的氧化亞氮排放量；至如白色肉雞及有色肉雞生命週期僅數月且全年飼養量較不一致，其排放係數單位則為每個生命週期每隻糞尿處理中的氧化亞氮排放量。

（3）活動數據

同表 5.2.5。

（4）排放量

臺灣畜禽糞尿處理中氧化亞氮排放量，除前開隨畜禽飼養量起伏，2001 年以後逐年遞減趨勢外，尚因臺灣自 1980 年末期起環保法規開始管制養豬業，農政部門自 1991 年起全面輔導畜牧業處理廢水、糞便堆肥化，更是使畜禽糞尿處理中氧化亞氮排放量呈現逐年遞減趨勢。

臺灣畜禽糞尿處理過程中氧化亞氮排放量，為包含產乳牛、豬、白色肉雞、有色肉雞及蛋雞等五種主要畜種，先分別計算其糞尿處理過程中甲烷排放係數乘以該畜種年度活動數據得到該畜種當年度的糞尿處理氧化亞氮排放量，再予以加總所得。

（5）完整性

臺灣豬、牛糞尿處理多以三段式廢水處理方式管理，惟目前清冊僅計算各處理階段所排放之溫室氣體量，尚未將第 1 段所產出畜糞渣另行堆肥化之溫室氣體排放量計入。另對臺灣飼養量相對較少之山羊及水牛，除非未來飼養畜種有重大轉變，否則預期仍不會有相關研究。

3. 不確定性與時間序列的一致性

（1）不確定性

有關畜禽糞尿處理氧化亞氮排放清冊之估算，其中活動數據係依據農委會逐年辦理普查（農業統計年報），依 2006 IPCC 指南設定不確定性為 5%；預設排放係數因未提供不確定性；暫無法估算。至排放係數及排放量之不確定性尚待研究估算中。

（2）時間序列的一致性

1990 年至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法皆維持一致。

表 5.3.6 臺灣 1990 年至 2014 年臺灣畜禽糞尿處理之氧化亞氮排放量

（單位：千公噸二氧化碳當量）

年	細分類	產乳牛	豬	白色肉雞	有色肉雞	蛋雞	合計
1990		0.15	5.10	0.14	0.26	42.41	48.07
1991		0.16	6.01	0.18	0.24	43.41	50.00
1992		0.17	5.81	0.20	0.26	45.60	52.05
1993		0.19	5.87	0.24	0.28	47.07	53.64
1994		0.19	6.00	0.26	0.29	52.40	59.13
1995		0.22	6.26	0.29	0.29	54.07	61.12
1996		0.21	6.38	0.31	0.31	59.77	66.98
1997		0.21	4.75	0.36	0.35	64.37	70.03
1998		0.22	3.90	0.36	0.34	66.19	71.01
1999		0.22	4.32	0.35	0.34	66.99	72.22
2000		0.22	4.47	0.37	0.33	67.34	72.72
2001		0.21	4.27	0.36	0.31	65.46	70.62
2002		0.21	4.04	0.36	0.32	65.52	70.46
2003		0.19	4.04	0.36	0.30	65.93	70.83
2004		0.18	4.06	0.40	0.28	64.48	69.40
2005		0.17	4.29	0.32	0.27	66.16	71.22
2006		0.17	4.23	0.35	0.27	67.28	72.29
2007		0.17	3.96	0.34	0.26	66.08	70.81
2008		0.17	3.84	0.34	0.24	67.13	71.72
2009		0.17	3.66	0.37	0.23	66.56	70.99
2010		0.18	3.69	0.37	0.24	66.00	70.47
2011		0.19	3.73	0.38	0.25	66.17	70.73
2012		0.19	3.58	0.36	0.23	66.30	70.66
2013		0.20	3.46	0.35	0.20	67.10	71.30
2014		0.20	3.30	0.38	0.21	68.97	73.05

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同章節 5.2 畜禽腸胃發酵 (3.A) 之說明。

5. 特定排放源的重新計算

無。

6. 特定排放源的改善計畫

由於目前清冊僅計算畜禽物種於處理階段所排放之溫室氣體量，尚未將後段堆肥化之溫室氣體排放量計入，未來將朝建立此部分本土係數及資料之方向努力。另農委會持續於年度施政計畫中，研究探討畜牧場溫室氣體排放、減量及區域性沼氣發電模式等。

5.4 水稻種植 (3.C)

有機物在浸水的稻田中會因厭氧環境，被微生物分解而產生甲烷，產生之甲烷主要經由水稻植株擴散至大氣中。水稻田中的甲烷排放，主要影響因素包含氣候、土壤特性、水稻品種、灌溉管理、農耕操作、有機物質添加量、肥料型態與施用量等。陸稻因無浸水，土壤通氣較佳，無明顯的甲烷釋出，2006 IPCC 指南對於陸稻排放係數亦定為零。

1. 排放源及匯分類的描述

因臺灣地處亞熱帶至熱帶間，水稻可一年兩收，因此估算水稻甲烷排放時，在排放係數與活動數據皆分為兩期作進行估算。我國水稻種植方式目前主要耕作前 30 日內，開始淹水，栽種方式主要為插秧移植，灌溉採間歇灌溉管理，土壤乾燥排水一次以上，水稻稻桿多於聯合收穫機收割後，切碎置於田間，再以耕耘機將殘體耕入田間。因臺灣各地氣候、土壤、肥料和農業操作皆有其區域特性（農委會，1995¹⁹；Yang 等人，1994²⁰），在甲烷排放隨上述因子變異下，甲烷排放隨臺灣各地特性而有空間變異。因此本項估算，採用本土排放係數並參考相關文獻下，將臺灣分因地理特性，分為八個區域進行估算。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

臺灣已有多篇關於水稻田甲烷排放之研究，在考慮符合當地狀況的因素下，以方法 3 (Tier 3)，引用本土排放係數進行計算，水稻田之甲烷排放量計算方式如公式 5.4.1，由活動數據 - 水稻田耕作面積乘以排放係數，排放係數如表 5.4.1。

表 5.4.1 臺灣水稻種植各期作甲烷排放係數

地區	各期作甲烷排放係數		
	期作	原數值 ²¹ (mg CH ₄ /m ² /h)	期作排放係數 (kg CH ₄ /ha/season)
臺北、基隆	一期稻	2.12	69.2
	二期稻	4.85	144.3
宜蘭	一期稻	0.69	22.5
	二期稻	8.93	115.7
桃園、新竹	一期稻	0.89	29.0
	二期稻	4.15	123.5
苗栗	一期稻	2.92	95.3
	二期稻	13.70	115.7
臺中、彰化、南投	一期稻	2.87	93.7
	二期稻	3.29	97.9
雲林、嘉義、臺南	一期稻	1.79	58.4
	二期稻	7.66	115.7
高雄、屏東	一期稻	0.82	26.8
	二期稻	2.94	87.5
花蓮、臺東	一期稻	1.07	68.9
	二期稻	2.11	125.3

註：排放係數為引用來源數值，期作排放係數為實際計算數值。

19 行政院農業委員會，台灣農家要覽，1995。

20 Yang, S.S., Lin, C.C., Chang, E.H., Chung, R.S. and Huang, S.N.. Effect of fertilizer, soil type, growth season on methane production and emission in the paddy soils of Taiwan. J. Biomass Energy Soc. China 13: 68–87, 1994.

21 Yang, S. S., Lai, C. M., Chang, H. L., Chang, E.H., Wei, C. B., Estimation of methane and nitrous oxide emissions from paddy fields in Taiwan. Renewable Energy, 34:1916–1922, 2009.



公式 5.4.1 水稻種植中的甲烷排放

$$CH_{4\text{水稻}} = \sum_{i,j,k} (EF_i \times A_j \times 10^{-6})$$

EF_i = 各區各期水稻田排放係數，kg-CH₄/ha/season。
A_j = 各區各期水稻種植面積，ha/年。

(2) 排放係數

排放係數引用本土水稻之排放係數，如表 5.4.1 所示，因其彙整國內多筆代表性研究調查資料，作為估算農地溫室氣體排放量研究，文中將排放係數以一期作 136 天（約 110 至 140 天），二期作 124 天（約 90 至 130 天）將文獻中排放係數單位 mg CH₄/m²/h 換為期作排放係數 kg CH₄/ha/season。惟二期作之宜蘭、苗栗、雲林、嘉義、台南之排放係數偏高，依部會內專家委員意見，以其他地區平均值 3.89 mg CH₄/m²/h 計算，換算期作排放係數為 115.7 kg CH₄/ha/season。

(3) 活動數據

歷年種植面積係依據農委會編印「農業統計年報」之水稻生產記錄，依前述八分區，並分為兩期作，彙整如表 5.4.2。

(4) 排放量

將各區之排放係數分別乘上各區各期作之水稻種植面積，計算得到各區水稻田之甲烷排放量值，相加後為全年甲烷排放總量。歷年水稻種植甲烷排放量如表 5.4.3、圖 5.4.1 所示。因作物轉作政策、農業活動衰減等因素下，水稻田耕作面積逐年減少，水稻田甲烷排放量漸減，與 1990 年相比，甲烷排放量減少約 42%。近年則因休耕補助由原本的一年兩期改為一年一期活化休耕田，致水稻耕作面積略增，甲烷排放量略增。

(5) 完整性

在活動數據完整性，臺灣農業統計資料中雖註明包含

表 5.4.2 歷年各區水稻耕作面積

(單位：公頃)

年	臺北、基隆		宜蘭		桃園、新竹		苗栗		臺中、彰化、南投		雲林、嘉義、臺南		高雄、屏東		花蓮、臺東	
	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻	一期稻	二期稻
1990	3,852	1,672	14,224	5,183	34,184	31,080	13,983	13,230	66,717	62,129	77,490	66,066	18,601	19,537	13,242	13,071
1991	2,984	1,383	12,746	4,806	32,273	30,721	12,837	11,890	62,800	61,017	74,855	62,084	16,338	17,243	12,579	12,241
1992	2,422	912	12,858	3,097	31,436	29,165	11,966	11,602	61,156	58,199	62,564	58,556	14,657	14,151	12,414	11,994
1993	2,060	674	12,329	2,852	29,806	28,561	11,370	10,807	57,791	55,872	73,301	57,015	13,401	12,084	11,641	11,632
1994	1,444	587	12,402	1,815	24,986	25,898	11,114	10,516	54,978	53,199	65,420	54,483	14,074	11,346	11,898	11,676
1995	1,539	534	12,043	1,139	27,035	26,339	10,348	10,501	53,314	51,121	69,293	53,622	12,354	10,281	11,644	12,371
1996	1,102	500	11,921	1,000	22,662	25,328	10,018	9,838	51,725	49,994	60,829	54,585	11,868	10,624	12,682	13,086
1997	1,254	448	12,594	783	27,055	26,271	10,111	10,102	53,307	49,096	72,252	52,319	11,389	9,334	14,048	13,849
1998	1,114	409	12,374	536	26,434	24,605	9,783	9,702	51,995	48,335	72,383	52,371	11,385	9,196	14,099	13,919
1999	973	370	12,153	289	25,813	22,939	9,454	9,301	50,684	47,574	72,515	52,424	11,381	9,057	14,150	13,989
2000	910	354	11,942	161	24,544	20,009	9,520	7,992	48,920	45,633	73,045	48,840	11,913	7,986	14,262	13,570
2001	824	346	11,538	32	23,066	18,906	8,984	7,116	48,718	45,997	70,061	49,759	11,525	7,534	13,837	13,377
2002	738	304	10,531	27	18,609	13,940	7,615	6,873	47,974	43,657	67,764	45,485	10,867	5,947	13,786	12,723
2003	608	279	10,430	1	9,310	9,244	7,832	5,677	46,658	39,411	62,482	39,618	10,744	4,882	13,121	11,828
2004	574	302	9,623	3	4,625	7,674	5,754	5,022	44,800	38,558	46,958	34,296	10,158	3,713	12,822	12,133
2005	555	272	9,592	1	11,846	8,970	6,894	5,678	45,504	39,649	61,158	40,230	10,082	3,395	12,821	12,376
2006	479	234	9,587	2	9,735	7,790	6,537	5,258	44,882	38,251	61,690	41,214	9,130	2,513	13,208	12,679
2007	471	280	9,375	-	10,903	7,935	6,618	5,155	45,359	37,318	60,586	39,028	8,816	2,223	13,332	12,717
2008	451	269	9,186	-	10,328	7,514	6,099	5,085	43,244	36,634	56,998	39,313	8,710	2,093	13,316	13,051
2009	463	260	9,124	-	11,258	7,920	6,204	4,909	42,714	36,477	58,931	38,757	9,245	1,704	13,400	13,224
2010	438	264	9,376	6	11,370	8,087	4,985	4,621	42,702	37,142	47,371	37,998	9,430	1,837	14,269	13,967
2011	418	254	9,446	8	11,425	7,811	5,691	4,610	42,540	35,627	59,582	36,836	9,728	1,522	14,576	14,181
2012	396	254	9,993	1	11,144	7,767	5,694	4,822	42,754	36,078	61,408	39,509	10,420	1,335	14,853	14,336
2013	406	249	10,862	1	14,174	8,060	6,349	5,066	42,980	37,132	61,913	40,831	10,842	1,421	15,356	14,592
2014	394	243	10,943	0	15,632	7,912	6,570	4,974	43,025	35,784	64,184	39,468	10,251	1,549	15,604	14,519

註：資料來源為農業統計年報²²。

陸稻，但全國耕作面積不超過 10 公頃，差異小於 0.01%，故將之全視為水稻。

排放係數方面，水稻田甲烷排放雖受水稻品種、土壤理化性質、管理方式、前作作物種類與殘體量等多種因素影響，而我國水稻栽培在上述因素變異多，不易逐一評估其係數計算，故將其納為排放係數不確定度範圍內。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

依據文獻中各分區排放係數之標準差或範圍，及其引用之相關文獻，評估水稻田甲烷排放係數之不確定性，各區排放係數之不確定性彙整如表 5.4.4 所示。

在計算過程中因排放係數 ($\text{mg CH}_4/\text{m}^2/\text{h}$) 乘以不同期作之耕期換算為期作排放係數 ($\text{kg CH}_4/\text{ha}/\text{season}$)，一期作 136 天，二期作 124 天，而實際田間耕作期因氣候、人為因素、區域與品種等而有變異，一期約為 110 至 140 天；二期約 90 至 130 天。活動數據為水稻耕作面積，係農委會統計資料，依 2006 IPCC 指南設定不確定性定義為

表 5.4.3 歷年各區水稻田甲烷排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	臺北、基隆	宜蘭	桃園、新竹	苗栗	臺中、彰化、南投	雲林、嘉義、臺南	高雄、屏東	花蓮、臺東	總排放量
1990	12.70	23.00	120.79	71.59	308.32	304.29	55.18	63.74	959.61
1991	10.15	21.08	118.29	64.98	296.43	288.92	48.65	60.00	908.51
1992	7.48	16.20	112.88	62.07	285.68	260.77	40.76	58.94	844.78
1993	6.00	15.19	109.83	58.35	272.10	271.99	35.40	56.48	825.34
1994	4.62	12.23	98.11	56.90	258.97	253.16	34.23	57.06	775.28
1995	4.59	10.08	100.96	55.03	249.99	256.32	30.75	58.80	766.52
1996	3.71	9.60	94.66	52.33	243.51	246.75	31.18	62.82	744.56
1997	3.79	9.36	100.76	53.31	245.02	256.88	28.04	67.57	764.71
1998	3.40	8.52	95.17	51.37	240.08	257.22	27.73	67.87	751.36
1999	3.02	7.68	89.57	49.43	235.15	257.56	27.43	68.18	738.01
2000	2.85	7.19	79.60	45.80	226.27	247.97	25.44	67.06	702.18
2001	2.67	6.59	75.13	41.99	226.68	246.27	24.19	65.72	689.25
2002	2.38	6.01	56.55	38.03	219.21	230.55	20.28	63.59	636.59
2003	2.06	5.88	35.30	35.08	205.74	205.87	17.87	59.64	567.43
2004	2.08	5.43	27.05	28.24	199.30	167.80	14.92	60.08	504.89
2005	1.94	5.40	36.30	32.85	203.62	205.70	14.17	60.84	560.83
2006	1.67	5.40	31.12	30.79	198.74	209.33	11.61	62.45	551.11
2007	1.83	5.28	32.42	30.68	197.57	201.39	10.76	62.79	542.72
2008	1.75	5.17	30.70	29.24	190.95	196.97	10.41	63.81	529.00
2009	1.74	5.14	32.63	28.98	189.32	198.19	9.91	64.49	530.40
2010	1.71	5.30	33.23	25.24	190.92	179.11	10.33	68.32	514.15
2011	1.64	5.34	32.41	26.89	186.83	193.58	9.84	69.51	526.06
2012	1.60	5.63	32.07	27.51	188.44	203.98	9.89	70.48	539.60
2013	1.60	6.12	35.18	29.78	191.55	208.54	10.36	72.15	555.28
2014	1.56	6.16	35.78	30.04	188.35	207.92	10.25	72.34	552.40




圖 5.4.1 歷年水稻田甲烷排放量

5%。暖化潛勢（GWP）實際具有很大的不確定性，然在 IPCC 指南中已將其設定為固定的加權因子。

因多筆排放係數不確性大於 60%，部分參數非常態分佈，依據 IPCC 指南建議以蒙地卡羅方法進行評估，故利用 SimulAr 軟體以蒙地卡羅法，估算甲烷排放量不確性計算，各基本參數數值模擬次數為 1000 次。相關參與結果數如表 5.4.4 所示。由蒙地卡羅模擬方法估算水稻田甲烷排放量之不確定性為約 -48%，49%。

(2) 時間序列的一致性：

1990 年至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法皆維持一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

活動數據主要來自農委會之農業統計調查資料，而農委會依據統計法、統計法施行細則及其他有關法令之規定特別訂頒「農情調查工作評鑑要點」，已建立完善之農情調查制度 QA/QC 及查證流程為在準備農業部門農糧部分

（含 3.C、3.D、3.E、3.F、3.G、3.I、3.J）溫室氣體排放清冊過程中，先安排專家諮詢及同行審議機制；農糧部分清冊初稿完成後，再邀請專家學者所組成之審議小組，審議數據之正確性，並提供改善建議，經修正後再提送農委會所成立之農業部門溫室氣體專家審議會，經審查修正定稿後，完成農業部門溫室氣體排放清冊階段之 QA/QC 及查證。最後送行政院環境保護署併同其他部門之清冊，辦理國家溫室氣體排放清冊之 QA/QC 及查證程序。

由於甲烷使用本土排放係數，為了解本土調查係數之準確性，故列出與國外水稻田甲烷排放係數比較，如表 5.4.5 所示，排放係數雖略低於其他國家，但仍於差異範圍內，應與各國農業耕作方式差異有關。

5. 特定排放源的重新計算

無。

6. 特定排放源的改善計畫

目前計算引用之水稻田甲烷排放係數為 15 年前以密

表 5.4.4 各區水稻田甲烷排放係數參數與蒙地卡羅法之不確定性結果

地區	期作	活動數據不確定性	排放係數不確定性來源與值				排放量與不確定性		
			排放係數			耕作期差異	期作排放係數不確定性	排放量 (2014 年)	不確定性
			計算值	標準差	範圍				
		%	mg CH ₄ /m ² /h			天		千噸 CO ₂ e	
臺北、基隆	一期稻	5	2.12	1.38	0.76~2.74	110~140	-124%, 114%	0.68	-124%, 114%
	二期稻	5	4.85	1.70	-	100~130	-69%, 61%	0.88	-70%, 62%
宜蘭	一期稻	5	0.69	0.11	-	110~140	-34%, 25%	6.16	-33%, 25%
	二期稻	5	3.89	0.94	-	100~130	-55%, 41%	0	-
桃園、新竹	一期稻	5	0.89	0.05	-	110~140	-19%, 7%	11.35	-8%, 21%
	二期稻	5	4.15	1.32	-	100~130	-67%, 51%	24.43	-67%, 53%
苗栗	一期稻	5	2.92	0.83	-	110~140	-56%, 49%	15.65	-57%, 49%
	二期稻	5	3.89	0.94	-	100~130	-50%, 43%	14.39	-49%, 43%
臺中、彰化、南投	一期稻	5	2.87	2.95	0.05~7.06	110~140	-196%, 185%	100.76	-197%, 18%
	二期稻	5	3.29	3.15	0.40~11.13	100~130	-174%, 178	87.59	-176%, 178
雲林、嘉義、臺南	一期稻	5	1.79	0.75	1.07~2.82	110~140	-83%, 76%	93.75	-83%, 78%
	二期稻	5	3.89	0.94	-	100~130	-53%, 39%	114.17	-54%, 40%
高雄、屏東	一期稻	5	0.82	-	0.02~13.16	101~135	-53, 846%	10.25	-53, 850%
	二期稻	5	2.94	-					
花蓮、臺東	一期稻	5	2.11	1.46	-	110~140	-130%, 118%	26.87	-130%, 11%
	二期稻	5	4.21	2.64	-	100~130	-123%, 105%	45.48	-123%, 10%
總合								552.40	-48%, 49%

註：「宜蘭」、「苗栗」、「雲林、嘉義、台南」排放係數之計算值，依部會內審議建議，調整為其它地區之二期作平均值。其餘計算值、標準差、範圍等
資料來源：Yang 等人，2009²³

23 同註 21。

閉罩法進行調查資料 (Yang 等人, 2003)²⁸, 雖此方法在量測過程可能破壞自然狀態, 造成量測誤差, 但由於調查廣泛且資料多, 仍具有一定之代表性, 而為本清冊計算引用。目前農委會農業試驗所 (簡稱農試所) 已進行利用開放式甲烷分析儀調查水稻種植中產生之甲烷, 期望獲得更具代表性之排放係數, 以進行排放係數更新; 並與國外學者合作, 探討以模式模擬作為驗證之可能性。

5.5 農業土壤 (3.D)

氧化亞氮的排放分為直接排放及間接排放, 直接性氧化亞氮排放為農業活動則包括農地施用化學氮肥、有機氮肥、作物殘體的埋入或改變土地利用管理等, 這些農業活動使氮素進入土壤, 造成有效性氮的增加、脫氮量增加。間接性氧化亞氮排放共兩個途徑: 其一為管理土壤施用之肥料揮散氨 (NH_3) 和氮氧化物 (NO_x); 另一途徑為土壤中的氮素經淋洗和逕流移出。上述氮源, 最終以銨離子 (NH_4^+) 和硝酸離子 (NO_3^-) 型態再進入土壤和水中後, 產生氧化亞氮排放。

5.5.1 農業土壤的氧化亞氮直接排放

1. 排放源及匯分類的描述

直接性氧化亞氮排放為人為施用、土地利用與管理下之礦化作用變化, 藉增加有效性氮提升硝化和脫氮量, 進而增加氧化亞氮之排放量。

管理土壤中氧化亞氮之直接排放估算, 包括以下氮源: (1) 化肥 (F_{SN}); (2) 有機氮肥 (F_{ON}), 如動物糞肥、堆肥、污水污泥等; (3) 放牧動物之含氮排泄物 (F_{PRP}); (4) 作物殘留物 (F_{CR}), 含地上和地下部之固氮作物與

牧草等; (5) 礦質土壤因改變土地利用與管理, 土壤有機質礦化之氮損失 (F_{SOM}); (7) 有機土壤 (F_{OS}) 之排水和管理。

臺灣農地土壤有機質含量 3% 以上僅佔 8% (譚增偉等, 2005)²⁹, 一般耕地土壤有機質未達有機土壤基準 (>20%), 且無放牧動物牧草區之活動數據, 因此農耕有機土壤及牧草區動物排泄物此兩項項目不計入。臺灣目前農、畜牧等相關產業的的汙水或污泥少直接施至農地, 大多以廢棄物方式處理, 所以不在農地產生氧化亞氮排放 (直接氧化亞氮排放), 而其處理或流到環境中的氮源產生之氧化亞氮排放 (間接氧化亞氮排放), 皆歸屬廢棄物處理部門。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

農業土壤的氧化亞氮直接排放調查, 臺灣過去已進行許多研究, 包含不同作物氧化亞氮排放係數值, 然其以單位面積排放值為主, 無法完整表示長期農業活動下氮素使用量的變化, 故仍參照 2006 IPCC 指南之建議方法 1 (Tier 1) 進行估算, 並依臺灣農業耕作國情之活動數據不同進行調整。估算方式如公式 5.5.1 所示:

公式 5.5.1 管理土壤中氧化亞氮直接排放

$$\begin{aligned}
 N_2O_{\text{直接}} - N &= N_2O - N_{N \text{ 施用量}} + N_2O - N_{OS} + N_2O - N_{PRP} \\
 N_2O - N_{N \text{ 施用量}} &= \left\{ \begin{aligned} &[(F_{SN} + F_{ON} + F_{CR} + F_{SOM}) \times EF_1] + \\ &[(F_{SN} + F_{ON} + F_{CR} + F_{SOM})_{FR} \times EF_{1FR}] \end{aligned} \right\} \\
 N_2O - N_{OS} &= \left[\begin{aligned} &(F_{OS, CG, Temp} \times EF_{2CG, Temp}) + (F_{OS, F, Trop} \times EF_{2CG, Trop}) \\ &+ (F_{OS, Temp, NR} \times EF_{2F, Temp, NR}) + (F_{OS, F, Trop} \times EF_{2F, Trop}) \end{aligned} \right] \\
 N_2O - N_{PRP} &= [(F_{PRP, CPP} \times EF_{3PRP, CPP}) + F_{PRP, SO} \times EF_{3PRP, SO}]
 \end{aligned}$$

表 5.4.5 甲烷通量與排放量比較

國家	期作	排放係數 kg CH ₄ /ha	灌溉管理	係數分類
日本 ²⁵	單期	60 ~ 268	單次排水	土壤類型
義大利 ²⁶	單期	247~335	單次或多次排水	灌溉類型、播種方式
臺灣 ²⁷	1 期作	64 (23~95)	多次排水	地區
	2 期作	116 (88~144)		地區

註: 排放係數為範圍或中位數 (範圍)

25 Ministry of the Environment, Japan, National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan, 2014.

26 Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italian, Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2012 National Inventory Report, 2014.

27 同註 21。

28 Yang, S. S., Liu, C.M., Lai, C.M. and Liu, Y. L., Estimation of methane and nitrous oxide emission from paddy fields and uplands during 1990-2000 in Taiwan. Chemosphere 52: 1295-1305, 2003.

29 譚增偉、劉禎祺、陳桂暖, 土壤肥力與合理化施肥, 合理化施肥專刊, 行政院農業委員會農業試驗所, 43-62, 2005。



$N_2O_{直接-N}$ = 管理土壤中 N_2O-N 之年直接排放量，公噸 N_2O-N /年
 $N_2O-N_{N_{施用}}$ = 管理土壤中施用 N_2O-N 量之年直接排放量，公噸 N_2O-N /年
 N_2O-N_{OS} = 管理有機土壤中 N_2O-N 之年直接排放量，公噸 N_2O-N /年
 N_2O-N_{PRP} = 糞尿等排泄物於放牧土壤之年直接排放量，公噸 N_2O-N /年
 F_{SN} = 施用含氮化肥於土壤之年直接排放量，公噸 N /年
 F_{ON} = 施用有機氮肥量，公噸 N /年
 F_{CR} = 作物殘留物氮量，公噸 N /年
 F_{SOM} = 礦質土壤中礦化的年氮量，與土地利用或管理變化引起的土壤有機質中土壤碳的損失相關聯，公噸 N /年
 F_{OS} = 管理 / 排水有機土壤的年度面積，ha/年（下標 CG, F, Temp, Trop, NR 和 NP 分別指農田及草地、林地、溫帶、熱帶、富營養和貧營養）
 EF_1 = 氮投入引起的 N_2O 排放的排放係數，kg N_2O-N / kg N 投入
 EF_{1R} = 氮投入到水稻田引起的 N_2O 排放的排放係數，kg N_2O-N / kg N 投入
 EF_2 = 排水 / 管理有機土壤中氧化亞氮排放的排放係數，kg N_2O-N / ha / 年
 EF_{3PRP} = 放牧牲畜排泄堆積在草場、牧場和圍場上所引起的 N_2O 排放的排放係數，kg N_2O-N / kg N

因我國土壤有機質含量大於 20% 之比例低，與放牧畜養方式鮮少且無相關活動數據，故 N_2O-N_{OS} 、 N_2O-N_{PRP} 、 F_{OS} 此三項不列入計算。

N_2O-N 排放換算為氧化亞氮排放的計算公式如公式 5.5.2。

公式 5.5.2 N_2O-N 排放換算為氧化亞氮排放公式

$$N_2O \text{ 排放量} = N_2O-N \times 44/28$$

我國農業土壤中施用氮源，其因子包括化學肥料的施用氮量、來自動物糞肥或堆肥之有機氮量、作物殘體量所施用的氮量。以下進一步說明各項來源排放氮量之計算。

A. 化學肥料施氮量 (F_{SN})

即計算農地化學氮肥的施用量，化學氮肥總用量引用農業統計年報。因 2006 IPCC 清冊指南中，在氮肥施用產生之氧化亞氮排放區分水旱田，故需區分水旱田氮肥施用量。在農委會農糧署「稻穀生產成本調查報告」中，有臺灣各縣市水稻生產之化學與有機肥料施用調查資料。故引用報告中各期作平均氮肥施用量作為水田施氮量估算（本報告所引用水田施氮量資料由農糧署直接提供），因此水田總施氮肥施用量為 1、2 期作耕作面積乘以水稻種植面積而得。旱作氮肥施用量則由全國總化肥施氮量扣除水稻氮肥施用量而得。

B. 施用的有機氮肥 (F_{ON})

施用的有機氮肥 (F_{ON}) 係指土壤有機氮投入的量，使用公式 5.5.3 進行計算，包括施用的禽畜糞、施用到土壤中的污水污泥、施用到土壤中的堆肥以及與農產加工產生之廢棄物等。有關農業有機廢棄物，臺灣一般製成堆肥或直接施用於田間；而有關污水、汗水部分，目前農、畜牧等相關產業的污水或汗水多經處理後直接排放於地面水

體或以廢棄物處理，再利用於農地量少且未有統計資料，故未計算。

公式 5.5.3 施用到土壤的有機氮添加中的氮

$$F_{ON} = (F_{AM} + F_{SEW} + F_{COMP} + F_{OOA}) \times 0.78 \times 2.4\%$$

F_{ON} = 每年施用到土壤中的有機氮肥總量（不含放牧牲畜），公噸 N /年
 F_{AM} = 每年施用到土壤中的牲畜糞肥量，公噸 / 年
 F_{SEW} = 每年施用到土壤中的污泥、污水氮總量，公噸 / 年
 F_{COMP} = 每年施用到土壤中的堆肥氮總量，公噸 / 年
 F_{OOA} = 每年用作肥料的其它有機添加物的量，公噸 / 年
 0.78 = 乾物比。
 2.4% = 有機氮肥之氮含量。

在 1990 至 2000 年， F_{ON} 計算為農業統計年報中「堆肥」(F_{COMP}) 與「禽畜糞」(F_{AM}) 之總和，分別指菇類堆肥等、廐肥與禽畜糞等；2001 年後， F_{ON} 引用綠色國民所得帳之農業廢棄物排放帳的「堆肥」(F_{COMP}) 與「禽畜舍墊料」(F_{OOA}) 之總和，分別包含菇包、禽畜糞、蔬果殘渣等項目與稻殼等項目。各年度加總後，乘乾物比 0.78 再乘以氮含量 2.4% (0.4 至 4%)，代表施用的有機氮肥 (F_{ON})。

C. 作物殘體的氮素 (F_{CR})

本項計算返回土壤的作物殘體中的氮量，這可從地上或地下部殘體的作物產量統計資料和預設係數進行估算。因不同作物類型的殘體中產量比例、更新時間和氮含量均不同，應分別計算主要作物類型的殘餘氮量，然後總和所有作物類型的氮值。IPCC 指南建議至少將作物分為：(1) 非固氮穀物作物（例如玉米，水稻，小麥，大麥等）；(2) 固氮穀物和豆類（例如大豆，乾豆，鷹嘴豆，扁豆等）；(3) 根莖作物（例如，馬鈴薯，甜薯，木薯等）；(4) 固氮牧草作物（苜蓿，三葉草等）及 (5) 其它牧草。依 2006 IPCC 指南建議，作物的產量統計資料需按實地乾重或鮮重進行報告，根據實際農業操作情形可採用修正係數估算乾物質產量。各作物換算的合適性與修正方式取決於各國報告中採用的標準與耕作型式不同而異。

我國的農業殘體焚燒主要是以稻藁為主，其他如豆類、玉米、甘蔗等焚燒量判斷為零；稻藁使用流向，在綠色國民所得帳皆有估算之統計資料，包含作為堆肥或墊料等，故對於本項作物殘體之估算，水稻部分以對應活動數據 - 稻藁就地掩埋量計算。其餘作物殘體掩埋估算中，臺灣農業操作習慣是直接耕入田中，因此不做焚燒等其他項扣除。另參考農委會對於農地牧草，三年以上更新一次可

申領補助下，設定我國作為生產牧草之農地更新頻率為 3 年。我國田間綠肥皆有直接之活動數據，不再做殘體比例換算。正作物殘體量計算式如下：

公式 5.5.4 本土作物殘體產生的氮量

$$F_{CR\text{-}rice} = (Rice_{res} \times N_{rice})$$

$$F_{CR\text{-}i} = (Crop_i \times Dry_i \times R_{AGi} \times N_{AGi})$$

$$F_{CR\text{-}GFi} = (GF_i \times N_{GFi})$$

$$F_{CR\text{-}grass} = (Crop_i \times Dry_i \times R_{AGi} \times N_{AGi}) \times 1/3$$

$F_{CR\text{-}rice}$ = 水稻殘體掩埋氮量，公噸 N/ 年

$Rice_{res}$ = 水稻葉掩埋量，公噸 / 年

N_{rice} = 水稻葉氮含量，公噸 N/ 公噸

$F_{CR\text{-}i}$ = 作物類別 i 殘體氮量，公噸 N/ 年

$Crop_i$ = 作物類別 i 總產量，公噸 / 年

Dry_i = 作物類別 i 乾物比

R_{AGi} = 作物類別 i 殘體比

N_{AGi} = 作物類別 i 氮含量，公噸 N/ 公噸

$F_{CR\text{-}GFi}$ = 綠肥 i 殘體氮量，公噸 N/ 年

$F_{CR\text{-}grass}$ = 牧草殘體氮量，公噸 N/ 年

D. 土地利用變化或管理作法 (F_{SOM}) 引起的礦質土壤中土壤有機碳庫的損失所導致的礦化氮

F_{SOM} 系指土地利用變化或管理作法引起的礦質土壤中土壤有機碳的損失所導致氮的礦化量，土地利用變化和管理皆會對土壤有機碳儲量造成重要影響。當土壤氮因氧化而損失時，同時會有氮的礦化，而礦化的氮被成為氧化亞氮的氮源之一。

我國農地在農業操作下，土壤有機質含量呈現增加或維持平衡狀況（郭鴻裕等，1995³⁰；譚增偉等，2005³¹；譚增偉與陳桂暖，2011³²），因此假設長期維持農業土壤中的氮礦化量變化為零，不估算。

(2) 排放係數

排放係數主要引用 2006 IPCC 氧化亞氮排放相關預設值，部分活動數據轉換係數則使用本土係數，如表 5.5.1。

(3) 活動數據

A. 農地化學肥料使用 (Synthetic Fertilizers, F_{SN})

依據農業統計年報，化學肥料的項目包括硫酸銨、尿素、硝酸銨鈣、複合肥料（平均含氮量 17.3%，農糧署公務統計³⁷）四項。如表 5.5.2。

a. 水、旱田施氮量

本項計算農地化學氮肥的施用量，化學氮肥總用量引用農業統計年報。有關水、旱田氮肥施用量，引自農糧署「稻穀生產成本調查報告」³⁹中臺灣各縣市水稻生產之化學與有機肥料施用調查，以每期報告中各期作平均氮肥施用量作為水稻田單位面積施氮量估算，水稻田總施氮肥施用量為 1、2 期作耕作面積乘以各期水稻單位面積施氮量而得；旱作氮肥施用量則由全國總化氮肥量扣除水稻氮肥施用量取得。

表 5.5.1 農業土壤氧化亞氮直接排放相關係數

排放係數	預設值 ³³	本土值	不確定性範圍
礦肥施氮、有機添加物和作物殘渣以及土壤碳損失引起的礦質土壤中氮礦化的 EF_1 (kg N ₂ O-N/kg-N)	0.01		0.003 - 0.03
水稻田的 EF_{1FR} (kg N ₂ O-N/kg-N)	0.003		0.000 - 0.006
綿羊和其它牲畜的 $EF_{3PRP, SO}$ kg N ₂ O-N / kg-N	0.01		0.003 - 0.03
水稻田施氮肥量 (kg-N/ha)		參照表 5.5.4	
有機氮肥 (堆肥、禽畜糞肥) 乾物比 ³⁴		0.78	±10%
有機氮肥 (堆肥、禽畜糞肥) 中氮含量 (%) ^{35, 36}		2.4%	0.5 - 4%
植物殘渣比率與氮含量		參考表 5.5.6	

30 郭鴻裕、朱戩良、江志峰、吳懷國，臺灣地區土壤有機質含量及有機資材之施用狀況，有機質肥料合理施用技術研討會專刊，p.72-83，行政院農業委員會農業試驗所，1995。

31 同註 28。

32 譚增偉、陳桂暖，長期不同耕作制度及作物殘體管理對土壤有機質含量的影響，臺灣農業研究 60 (2)：115-124，2011。

33 IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4. Agriculture, Forestry and Other Land Use, Chapter 11: N₂O Emissions from Managed Soils, and CO₂ Emissions from Lime and Urea Application, 2006.

34 陳仁炫，有機質肥料的檢測與成分分析結果之解析，有機質肥料之特性與管理研習會專刊，p. 58-67，國立中興大學土壤調查試驗中心編印，2003。

35 行政院農業委員會，肥料要覽，2001。

36 行政院農業委員會農糧署，作物施肥手冊，2003。

37 行政院農業委員會農糧署。農糧統計\公務統計\臺灣地區肥料產銷量值，<http://www.afa.gov.tw/>

39 行政院農業委員會農糧署，稻穀生產成本調查報告，2015。



表 5.5.2 歷年化學肥料施用量與施氮量³⁸

(單位：公噸)

年	硫酸銨	尿素	硝酸銨鈣	複合肥料	施用氮量
1990	367,112	193,121	16,845	483,839	253,002
1991	376,766	198,997	15,400	543,933	267,840
1992	336,214	189,649	16,351	562,900	258,495
1993	361,734	178,109	16,525	584,112	262,251
1994	343,602	183,914	15,585	601,407	263,917
1995	342,137	205,923	16,469	575,883	269,495
1996	324,612	205,577	16,425	625,980	274,313
1997	272,703	182,367	16,425	534,509	236,912
1998	257,658	173,169	15,037	540,741	230,322
1999	246,312	161,544	15,577	543,246	223,133
2000	334,657	178,367	17,197	518,813	245,521
2001	341,877	128,509	17,300	570,688	233,097
2002	323,116	127,158	17,684	565,892	227,783
2003	186,731	112,438	6,630	624,439	200,289
2004	232,652	113,914	6,836	646,088	214,398
2005	240,192	84,968	6,360	636,019	200,829
2006	218,215	81,093	8,606	677,338	202,029
2007	226,243	78,358	6,691	659,178	198,932
2008	185,123	77,478	2,591	627,140	183,529
2009	195,301	75,636	1,019	652,013	188,808
2010	180,802	73,420	523	661,124	186,221
2011	158,733	71,966	438	653,388	179,562
2012	144,802	74,931	264	679,091	182,412
2013	122,277	61,856	166	713,367	177,578
2014	126,619	54,399	176	707,584	174,061

註：各肥料含氮量：硫酸銨：21%；尿素：46%；硝酸銨鈣：20%；複合肥料：17.3%，引自農糧署統計資料³¹。

表 5.5.3 歷年水稻田單位面積氮肥施用量

期作	化學氮肥施用量			
	一期作		二期作	
	施用量	不確定性	施用量	不確定性
年	kg-N/ha			
1990	155	128~173	162	140~189
1991	155	128~173	162	140~189
1992	164	131~184	162	135~187
1993	160	142~451	162	126~185
1994	164	128~191	173	128~203
1995	174	137~752	180	143~199
1996	174	128~191	180	132~203
1997	176	147~196	184	142~201
1998	179	136~215	186	151~210
1999	177	132~194	188	138~219
2000	189	138~220	154	61~203
2001	186	138~228	197	136~225
2002	189	145~218	197	156~231
2003	190	143~221	200	147~245
2004	189	135~238	206	141~239
2005	191	132~235	203	159~251
2006	192	136~240	198	149~247
2007	190	130~240	198	156~239
2008	194	133~237	200	145~245
2009	191	132~240	210	157~260
2010	202	132~255	201	127~243
2011	200	123~255	203	131~247
2012	200	124~257	199	123~240
2013	193	124~247	200	131~255
2014	195	117~260	203	119~257

38 同註 23。

B. 施用的有機氮肥

我國施用有機氮肥施用之活動數據引自農業統計年報與綠色國民所得帳活動數據，如表 5.5.5。

C. 農作物殘體量 (Crop Residue, F_{CR})

依我國主要作物型態與統計資料將作物殘體分類為：(1) 水稻；(2) 非固氮穀物作物 (包含玉米、高粱、其他-

表 5.5.4 歷年水稻田耕作面積與施肥量估算

年	水稻 1 期作		水稻 2 期作		水稻田施氮量 公噸	旱田施氮量 公噸
	面積 ha	施氮量 kg-N/ha	面積 ha	施氮量 kg-N/ha		
1990	242,298	155	211,968	162	71,852	181,150
1991	227,417	155	201,385	162	67,834	200,006
1992	209,474	164	187,676	162	64,750	193,745
1993	211,790	160	179,137	162	63,006	199,245
1994	196,317	164	169,520	173	61,545	202,372
1995	197,571	174	165,908	180	64,188	205,307
1996	182,807	174	164,955	180	61,463	212,851
1997	202,010	176	162,202	184	65,285	171,626
1998	201,424	179	156,263	186	65,165	165,157
1999	197,123	177	155,942	188	64,074	159,058
2000	195,055	189	144,546	154	59,020	186,501
2001	188,553	186	143,066	197	63,379	169,719
2002	177,884	189	128,956	197	59,029	168,754
2003	161,184	190	110,940	200	52,809	147,480
2004	135,314	189	101,701	206	46,590	167,808
2005	158,452	191	110,571	203	52,778	148,051
2006	155,248	192	107,940	198	51,169	150,860
2007	155,459	190	104,657	198	50,279	148,653
2008	148,333	194	103,959	200	49,589	133,940
2009	151,338	191	103,252	210	50,535	138,273
2010	139,941	202	103,922	201	49,155	137,066
2011	153,405	200	100,849	203	51,190	128,372
2012	156,662	200	104,101	199	52,005	130,408
2013	162,869	193	107,296	200	52,887	124,691
2014	166,602	195	104,449	203	53,647	120,413

表 5.5.5 歷年禽畜糞肥料施用量與施氮量

(單位：公噸)

年	農業統計年報		綠色國民所得帳		總氮量
	堆肥	禽畜糞	禽畜舍墊料	堆肥	
1990	1,313,766	1,760,166	-	-	57,544
1991	1,072,602	1,421,175	-	-	46,684
1992	921,678	1,332,571	-	-	42,200
1993	892,081	1,371,916	-	-	42,382
1994	661,707	1,315,837	-	-	37,020
1995	716,149	1,014,988	-	-	32,407
1996	643,926	1,030,476	-	-	31,345
1997	582,307	1,463,448	-	-	38,297
1998	484,676	1,098,550	-	-	29,638
1999	460,038	1,135,045	-	-	29,860
2000	737,897	1,181,344	-	-	35,928
2001	532,671	1,025,764	90,000	2,031,489	39,714
2002	526,209	584,855	85,000	2,152,062	41,878
2003	479,046	547,218	81,000	2,212,500	42,934
2004	-	-	71,680	2,205,188	42,623
2005	-	-	73,357	2,302,694	44,480
2006	-	-	77,902	2,366,029	45,750
2007	-	-	68,173	2,393,084	46,075
2008	-	-	72,858	2,465,486	47,518
2009	-	-	78,909	2,453,827	47,413
2010	-	-	72,551	2,455,770	47,330
2011	-	-	83,313	2,329,480	45,167
2012	-	-	85,011	2,449,779	47,451
2013	-	-	74,498	2,369,100	45,744
2014	-	-	86,611	2,506,422	48,542

註：1990-2000 年引用農業統計年報³⁹中的堆肥與禽畜糞。2001 年後引用綠色國民所得帳報告⁴⁰中的堆肥與禽畜舍墊。



雜糧等)；(3)固氮作物(包含落花生、紅豆、大豆、菜豆、豌豆等)；(4)根莖類作物(包含馬鈴薯、甘藷、蘿蔔、胡蘿蔔、其他根莖類等、蔥、蒜等)；(5)非固氮綠肥(油菜、其他單播、混播)；(6)固氮綠肥(包含田菁、大豆、富貴豆、太陽麻、鐵虎豆、埃及三葉草、青皮豆等)；(7)非固氮牧草(牧草)；七大類別。

因作物統計資料產量調查差異，部分作物進一步區分乾物與鮮物，乾物為作物成熟收穫，收穫物水分含量 20%

以下，鮮物為作物未成熟時收穫或水分含量 70% 以上。以本土相關研究與預設係數，修正或選擇適當乾物比、作物殘體比和氮含量，來估算作物殘體氮量，如表 5.5.6 所示。

我國田間綠肥皆有其產量統計，且多為直接翻耕入田中，不再做殘體比例換算。2001 年後水稻掩埋殘體之活動數據引自綠色國民所得帳值，1990 至 2000 年利用水稻總產量推估水稻「就地翻耕掩埋」之值。農作物殘體掩埋量如表 5.5.7 至表 5.5.9。

表 5.5.6 估算作物殘體投入土壤的氮量的設定係數

分類	細項	乾物比	收穫指數	殘體比	氮含量	係數來源
非固氮作物	水稻(乾物)	0.89	38	1.65	0.007	IPCC, 2006 ⁴²
	玉米(乾物)		53	0.89		Wang 等, 1986 ⁴³
	玉米(乾物)	0.88	41	1.38	0.006	IPCC, 2006 ³⁷
	玉米(鮮物)	0.22	36	1.74		
	高粱	0.89	43	1.35	0.007	
	穀物	0.88	39	1.53	0.006	
	設定值(乾物)	0.88		1.53	0.007	
	設定值(鮮物)	0.22		1.53	0.008	
固氮作物	紅豆(乾物)		60~65	0.66~0.54		李銘全等, 1999 ⁴⁴
	大豆(乾物)		39	1.56		林順福等, 1991 ⁴⁵
	花生(乾物)		47±5	1.12		黃勝忠和宋勳, 1995 ⁴⁶
	花生	0.94	37	1.68	0.016	IPCC, 2006 ³⁷
	大豆	0.91	33	1.99	0.008	
	豆類	0.91	35	1.83	0.008	
	設定值(乾物)	0.91		1.83	0.008	
	設定值(鮮物)	0.22		1.83	0.016	
根莖類	水芋(鮮物)		70±20	0.43		呂秀英等, 1999 ⁴⁷
	甘藷(鮮物)		80±30	0.25		賴永昌等, 1996 ⁴⁸
	塊莖類	0.22	71	0.41	0.019	IPCC, 2006 ³⁷
	塊根	0.22	38	1.67	0.016	
	馬鈴薯	0.22	73	0.36	0.014	
	設定值	0.22		0.41	0.016	
綠肥	固氮綠肥				0.0048	農委會, 2001 ⁴⁹
	非固氮綠肥				0.0021	
牧草	固氮牧草	0.22	65	0.46	0.015	IPCC, 2006 ³⁷

備註：1. 鮮物：未達成熟期即收穫作物或收穫物水分含量 70% 以上，如根莖類作物。

2. 乾物：完熟期才收穫之作物。

3. 因 IPCC 預設部分作物乾物比不符合臺灣實際作物型態，乾物比以 0.22 取代。對於乾物之乾物比、鮮物之乾物比、殘體比和殘體氮濃度之不確定性，分別設為 10%、20%、50% 和 50%。

40 同註 23。

41 行政院主計處，綠色國民所得帳編製報告，2015。

42 同註 32。

43 Wang C. S., Tsao S. H., and Liu D. J., Effects of N Fertilization on the Growth and Yield of Two Maize Hybrids. Jour. agric.res. China. 35 (4) : 437~448, 1986.

44 李銘全、許秋玫、林順臺、洪阿田，不同氮施用量對紅豆接種根瘤菌生長與產量之影響，行政院農業委員會高雄區農業改良場研究彙報，10(2)：22-31，1999。

45 林順福、詹國連、魏趨開，每穴種植株數對同質與異質大豆族群生育之影響，中華農業研究。40(3)：305-314，1991。

46 黃勝忠、宋勳，台中地區落花生地方品種之純化與生產力評估。臺中區農業改良場研究彙報 46:27-35，1995。

47 呂秀英、呂椿棠、陳烈夫，水芋收穫指數的動態模式，中華農業研究，48(2)：86-99，1999。

48 賴永昌、廖嘉信、陳一心，金山地區春夏作甘藷不同種期對塊根產量之影響，中華農業研究 45(1)：26-34，1996。

49 同註 35。

50 同註 23。

E. 農耕有機土壤直接排放

我國農地土壤有機質含量 3% 以上僅占 8%（郭鴻裕等，1995⁵³；譚增偉等，2005⁵⁴），一般耕地土壤有機質未達表土有機質含量大於 20% 之有機質土標準，故不列入計算。

(4) 排放量

歷年之農業土壤直接氧化亞氮排放總量，估算結果如表 5.5.10。農業土壤的氧化亞氮直接排放主要反應農地氮肥施用量、殘體氮量等影響，2014 年與 1990 年相比，農業土壤的氧化亞氮直接排放約減少 20%。雖因作物轉作政

策下，水稻田面積減少旱作面積增加，而在旱田之氧化亞氮排放係數高於水稻田下，旱田氧化亞氮排放比例有增加之情形，如 1990 至 1996 年間，但在農業活動衰減、合理化施肥推廣等下，施氮總量呈現減少狀態，農業土壤直接氧化亞氮排放總量減少。

(5) 完整性

對於化學肥料施用之活動數據，依據農糧署統計⁵⁴資料部分年度有施用氰化鈣，比例低於總施氮量之 0.1%，且非各年度有施用資料，故略過未計算，「其他化學肥料」此項目因無法確認氮素比例，亦略過未計算。此外，目前

表 5.5.7 各作物產量

（單位：公噸）

作物 產量類別	水稻	非固氮穀物作物 (不含水稻)		固氮作物		根莖作物	固氮綠肥	非固氮綠肥	非固氮牧草
	乾物	乾物	鮮物	乾物	鮮物	鮮物	鮮物	鮮物	鮮物
1990	2,283,670	391,734	110,891	87,890	118,121	749,570	103,742	50,224	767,559
1991	2,311,638	384,372	107,002	102,822	120,206	803,868	234,976	64,614	735,584
1992	2,069,880	402,851	102,131	93,422	124,514	835,480	536,647	127,131	717,858
1993	2,232,933	405,914	119,605	97,896	120,634	766,306	571,524	152,033	701,374
1994	2,061,403	406,194	103,669	102,115	106,562	743,487	824,816	239,460	736,672
1995	2,071,968	368,919	111,228	110,824	116,005	822,151	641,590	264,105	711,539
1996	1,930,897	342,670	122,890	100,911	107,258	922,848	770,255	294,043	695,690
1997	2,041,843	280,121	118,242	99,320	126,588	870,313	643,611	433,462	626,016
1998	1,859,157	166,593	123,460	79,054	110,289	766,680	1,045,798	494,606	600,649
1999	1,916,305	124,874	112,201	75,750	103,834	928,702	1,402,521	632,189	640,543
2000	1,906,057	102,076	105,643	86,368	114,090	874,767	1,886,716	520,736	1,016,120
2001	1,723,895	83,795	106,772	60,650	112,936	791,882	2,101,026	524,603	946,400
2002	1,803,187	80,808	128,685	85,093	106,719	858,133	2,314,157	518,055	964,017
2003	1,648,275	73,679	114,775	81,192	107,003	795,486	2,941,530	519,672	910,941
2004	1,433,611	60,946	98,666	75,040	108,411	792,657	3,639,272	440,694	934,921
2005	1,467,138	52,610	91,653	59,012	83,619	804,854	2,971,343	278,669	843,162
2006	1,558,048	44,680	91,075	79,579	83,995	798,889	3,104,918	307,805	913,929
2007	1,363,458	41,041	84,985	58,089	66,062	760,419	2,868,136	298,286	769,152
2008	1,457,175	42,367	80,807	62,229	63,238	805,803	2,930,537	300,816	758,441
2009	1,578,169	49,624	87,579	65,710	71,113	799,867	2,941,525	310,196	834,041
2010	1,451,011	46,882	81,237	73,933	70,941	804,492	2,820,769	323,560	792,321
2011	1,666,273	44,889	88,135	79,833	88,263	820,707	2,646,966	336,126	780,373
2012	1,700,229	42,471	75,359	67,702	87,783	744,100	2,516,421	241,156	769,735
2013	1,589,564	50,219	93,465	59,546	84,280	776,787	1,923,807	163,751	904,750
2014	1,732,210	75,166	103,608	81,455	77,934	841,809	1,579,000	218,181	940,785

備註：資料由農業統計年報⁵⁰彙整而來，各項分類作物所含作物種類如下：

1. 非固氮穀物作物（不含水稻-乾物）：飼料玉米、高粱、其他-雜糧、胡麻等。
2. 非固氮穀物作物（鮮物）：食用玉米。
3. 固氮作物（乾物）：落花生、紅豆、大豆等。
4. 固氮作物（鮮物）：菜豆、豌豆、毛豆等。
5. 根莖作物：甘藷、蘿蔔、胡蘿蔔、其他根菜類、蔥、蒜等。
6. 固氮綠肥：田菁、大豆、富貴豆、太陽麻、鐵虎豆、埃及三葉草、青皮豆等。
7. 非固氮綠肥：油菜、其他單播（大菜約佔半數）、混播等。

50 同註 23。

53 郭鴻裕、朱戩良、江志峰、吳懷國，臺灣地區土壤有機質含量及有機資材之施用狀況，有機質肥料合理施用技術研討會專刊，p.72-83，行政院農業委員會農業試驗所，1995。

54 譚增偉、劉禎祺、陳桂暖，土壤肥力與合理化施肥，合理化施肥專刊，行政院農業委員會農業試驗所，43-62，2005。



表 5.5.8 各類作物殘餘量

(單位：公噸)

作物 產量類別	水稻	非固氮穀物作物 (不含水稻)	非固氮穀物 作物	固氮作物		根莖作物	固氮綠肥	非固氮綠肥	非固氮牧草
	乾物	乾物	鮮物	乾物	鮮物	鮮物	鮮物	鮮物	
1990	1,818,426	527,431	37,326	146,363	47,556	67,611	103,742	50,224	25,892
1991	1,841,201	517,518	36,017	171,229	48,395	72,509	234,976	64,614	24,814
1992	1,644,337	542,399	34,377	155,576	50,129	75,360	536,647	127,131	24,216
1993	1,777,111	546,523	40,259	163,026	48,567	69,121	571,524	152,033	23,660
1994	1,637,434	546,900	34,895	170,052	42,902	67,063	824,816	239,460	24,850
1995	1,646,038	496,713	37,439	184,555	46,704	74,158	641,590	264,105	24,003
1996	1,531,163	461,371	41,365	168,047	43,182	83,241	770,255	294,043	23,468
1997	1,621,507	377,155	39,800	165,398	50,964	78,502	643,611	433,462	21,118
1998	1,472,746	224,301	41,557	131,649	44,402	69,155	1,045,798	494,606	20,262
1999	1,519,281	168,130	37,767	126,146	41,804	83,769	1,402,521	632,189	21,608
2000	1,510,936	137,435	35,559	143,829	45,933	78,904	1,886,716	520,736	34,277
2001	1,300,000	112,821	35,940	101,000	45,468	71,428	2,101,026	524,603	31,925
2002	1,460,000	108,800	43,315	141,705	42,965	77,404	2,314,157	518,055	32,520
2003	1,369,000	99,202	38,633	135,209	43,080	71,753	2,941,530	519,672	30,729
2004	1,175,561	82,058	33,211	124,964	43,646	71,498	3,639,272	440,694	31,538
2005	1,203,054	70,834	30,850	98,272	33,665	72,598	2,971,343	278,669	28,443
2006	1,277,599	60,157	30,656	132,523	33,816	72,060	3,104,918	307,805	30,830
2007	1,094,856	55,258	28,606	96,735	26,596	68,590	2,868,136	298,286	25,946
2008	1,078,224	57,043	27,200	103,631	25,460	72,683	2,930,537	300,816	25,585
2009	1,161,635	66,814	29,479	109,427	28,630	72,148	2,941,525	310,196	28,135
2010	1,077,472	63,122	27,345	123,121	28,561	72,565	2,820,769	323,560	26,728
2011	1,229,070	60,438	29,666	132,946	35,535	74,028	2,646,966	336,126	26,325
2012	1,336,537	57,183	25,366	112,745	35,341	67,118	2,516,421	241,156	25,966
2013	1,240,134	67,615	31,460	99,162	33,931	70,066	1,923,807	163,751	30,520
2014	1,351,423	101,204	34,875	135,647	31,376	75,931	1,579,000	218,181	31,736

備註：1. 水稻殘體量，2001 年後引自綠色國民所得帳⁵¹，1990-2000 年利用水稻總產量推估水稻「就地翻耕掩埋」之值。

2. 除水稻殘體外，資料引自農業統計年報⁵²。

表 5.5.9 各類作物殘餘氮量

(單位：公噸氮)

作物 產量類別	水稻掩埋殘體	非固氮穀物作物 (不含水稻)	非固氮穀物 作物	固氮作物		根莖作物	固氮綠肥	非固氮綠肥	非固氮牧草	作物總殘體 氮量
		乾物	鮮物	乾物	鮮物	鮮物	鮮物	鮮物	鮮物	
1990	12,729	3,692	299	1,171	761	1,082	498	105	388	18,416
1991	12,888	3,623	288	1,370	774	1,160	1,128	136	372	18,917
1992	11,510	3,797	275	1,245	802	1,206	2,576	267	363	20,126
1993	12,440	3,826	322	1,304	777	1,106	2,743	319	355	20,289
1994	11,462	3,828	279	1,360	686	1,073	3,959	503	373	21,422
1995	11,522	3,477	300	1,476	747	1,187	3,080	555	360	20,600
1996	10,718	3,230	331	1,344	691	1,332	3,697	617	352	20,963
1997	11,351	2,640	318	1,323	815	1,256	3,089	910	317	19,606
1998	10,309	1,570	332	1,053	710	1,106	5,020	1,039	304	19,715
1999	10,635	1,177	302	1,009	669	1,340	6,732	1,328	324	21,244
2000	10,577	962	284	1,151	735	1,262	9,056	1,094	514	23,181
2001	9,100	790	288	808	727	1,143	10,085	1,102	479	24,521
2002	10,220	762	347	1,134	687	1,238	11,108	1,088	488	27,071
2003	9,583	694	309	1,082	689	1,148	14,119	1,091	461	29,177
2004	8,229	574	266	1,000	698	1,144	17,469	925	473	30,778
2005	8,421	496	247	786	539	1,162	14,262	585	427	26,925
2006	8,943	421	245	1,060	541	1,153	14,904	646	462	28,376
2007	7,664	387	229	774	426	1,097	13,767	626	389	25,359
2008	7,548	399	218	829	407	1,163	14,067	632	384	25,646
2009	8,131	468	236	875	458	1,154	14,119	651	422	26,516
2010	7,542	442	219	985	457	1,161	13,540	679	401	25,426
2011	8,603	423	237	1,064	569	1,184	12,705	706	395	25,887
2012	9,356	400	203	902	565	1,074	12,079	506	389	25,475
2013	8,681	473	252	793	543	1,121	9,234	344	458	21,899
2014	9,460	708	279	1,085	502	1,215	7,579	458	476	21,763

51 同註 41。

52 同註 23。

未計算動植物有機質肥料，其包含進口及本土動植物渣粕肥料（不包括國內堆肥場產製禽畜堆肥及其它有機質肥料），統計來源為農糧署，但目前可取得公佈資料僅追溯自 2005 年，且無法以其它統計資料推估，且估計約佔總農地施氮量 0.1% 以下，故未計入。

根據國內資料（有機農業全球資訊網）⁵⁵，國內有機水稻耕作面積，由 1996 年至 2013 年分別為 62 公頃至 2,059 公頃，以每年每公頃 20 噸有機肥施用量（農糧署，2003）⁵⁶ 估算，估計水稻田有機氮肥施用量約 33 至 1,111 公噸氮，僅佔總有機氮肥施用量比例 2% 以下，故將所有有機氮肥設定投入於旱田計算。




圖 5.5.1 歷年農業土壤直接氧化亞氮排放總量

表 5.5.10 歷年農業土壤的氧化亞氮直接排放

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年分	化肥		糞肥	作物殘渣	合計排放量
	水稻田	旱田			
1990	100.94	848.30	269.47	97.05	1,315.77
1991	95.30	936.60	218.61	101.80	1,352.31
1992	90.96	907.28	197.61	103.21	1,299.07
1993	88.51	933.04	198.47	108.61	1,328.63
1994	86.46	947.68	173.36	110.16	1,317.66
1995	90.18	961.42	151.76	106.32	1,309.67
1996	86.35	996.75	146.78	104.49	1,334.37
1997	91.72	803.70	179.34	103.12	1,177.87
1998	91.55	773.41	138.79	100.42	1,104.16
1999	90.02	744.85	139.83	110.12	1,084.82
2000	82.91	873.36	168.25	120.05	1,244.56
2001	89.04	794.77	185.98	114.83	1,184.61
2002	82.93	790.25	196.11	126.77	1,196.06
2003	74.19	690.63	201.06	136.63	1,102.50
2004	65.45	785.82	199.60	144.13	1,195.00
2005	74.15	693.30	208.29	126.08	1,101.82
2006	71.89	706.45	214.24	132.88	1,125.46
2007	70.63	696.12	215.76	118.75	1,101.27
2008	69.66	627.22	222.52	120.10	1,039.50
2009	70.99	647.51	222.03	124.17	1,064.70
2010	69.06	641.86	221.64	119.07	1,051.62
2011	71.91	601.15	211.51	121.22	1,005.80
2012	73.06	610.68	222.21	119.30	1,025.24
2013	74.30	583.91	214.21	102.55	974.97
2014	75.37	563.88	227.31	101.91	968.47

55 同註 37。

56 有機農業全球資訊網。http://info.organic.org.tw/supergood/front/bin/home.phtml



部分作物因收穫指數高，殘體比例低，而忽略計算，如甘蔗、葉菜類、花卉類等；茶類與果品等多年生作物假設收穫量等於作物累積量而無殘體。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

農業土壤直接氧化亞氮排放之計算由於涵蓋多筆活動數據，且排放係數為非常態分佈，依據 IPCC 指南建議⁵⁷以蒙地卡羅方法進行不確定性評估。因此農地直接氧化亞氮排放不確定性，利用 SimulAr 軟體以蒙地卡羅方法進行評估，活動數據使用 2014 年數值，其不確定性範圍如表 5.5.11 所示。 N_2O-N 換算為氧化亞氮之 44/28 值為固定值。暖化潛勢 (GWP) 實際具有很大的不確定性，然在 2006 IPCC 指南中已將其設定為固定的加權因子，各基本參數數值模擬次數為 1,000 次，評估結果如表 5.5.11 所示，農業土壤的氧化亞氮直接排放之不確定性為 -24%，121%。

(2) 時間序列的一致性：

活動數據在禽畜糞肥料用量、就地翻耕掩埋量中為不連續資料。禽畜糞肥料用量 1990-2000 年為農業統計年報中堆肥加禽畜糞之合計用量，2001 年後為綠色國民所得

帳堆肥加禽畜舍墊料之合計用量，兩者在 2001 年到 2003 年間有重複，但差異大，禽畜糞等為主要有機氮肥來源，2001 年到 2003 年間禽畜總頭數量未有較大變化，以綠色國民所得帳「禽畜舍墊料」與「堆肥」總合之期間變化較符合實際畜牧變化狀況而使用。作物殘體之水稻就地翻耕掩埋量中，2001 年後引自綠色國民所得帳值，其餘年利用 2001-2010 年水稻產量線性迴歸 ($R^2=0.78$)，推估水稻「就地翻耕掩埋」值。其餘引自農業統計年報之活動數據，在時間序列上具一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同章節 5.4 水稻種植 (3.C) 之說明。

5. 特定排放源的重新計算

無。

6. 特定排放源的改善計畫

過去國內有相關研究文獻調查，但建立之排放係數主要為不同作物單位面積排放量 ($kg N_2O/ha$) 與 IPCC 估算方法之氮肥使用量排放係數 ($kg N_2O/kg N$) 有較大差異；單位面積排放量雖可反應不同作物之氧化亞氮排放量，但

表 5.5.11 農地直接氧化亞氮排放係數、活動數據及不確定性

項目		2014 年活動數據	轉換係數			氮投入量 (t-N)	排放係數 ($kg N_2O-N/kg N$)	排放量 (千公噸二氧化碳當量)	
化學氮肥	水稻田	53,647 公噸氮 (-26%, 16%)	施氮量 206 $kg-N/ha$ (95~385 $kg-N/ha$)			53,647 (-26%, 16%)	0.003 (0-0.006)	75.37 (-79%, 78%)	
	旱田	120,413 公噸氮 (-9%, 13%)				124,691 (-9%, 13%)		563.88 (-48%, 166%)	
有機氮肥	堆肥	2,506,422 公噸 (±5%)	乾物比 0.78 (±10%) 氮含量 2.7% (0.5%~4%)			48,542 (-61%, 50%)		227.31 (-64%, 210%)	
	禽畜舍墊料	86,611 公噸 (±5%)							
作物殘體	作物殘體分類	殘體量 (公噸)	乾物比	殘渣比 (±50%)	氮含量 (±50%)	殘體氮量 (公噸 N)	0.01 (0.003 - 0.03)	101.91 (-52%, 179%)	
	水稻	1,732,210 (±5%)	1 (±10%)	1	0.007	9,460 (-65%, 77%)			
	非固氮穀物作物	(乾物)	75,166 (±4%)	0.88 (±10%)	1.53	0.007			708 (-64%, 79%)
		(鮮物)	103,608 (±4%)	0.22 (±20%)	1.53	0.008			279 (-60%, 79%)
	固氮作物	(乾物)	81,455 (±5%)	0.91 (±10%)	1.83	0.008			1,085 (-58%, 78%)
		(鮮物)	77,934 (±4%)	0.22 (±20%)	1.83	0.016			502 (-64%, 83%)
	根莖類作物 (鮮物)	841,809 (±2%)	0.22 (±20%)	0.41	0.016	1,215 (-61%, 83%)			
	固氮綠肥 (鮮物)	1,579,000 (±3%)	-	-	0.022	7,579 (-63%, 78%)			
	非固氮綠肥 (鮮物)	218,181 (±4%)	-	-	0.048	458 (-61%, 78%)			
	非固氮牧草 (鮮物)	940,785 (±5%)	0.22 (±20%)	0.46	0.015	476 (-63%, 79%)			
小計					21,899 (-38%, 42%)	968.47 (-24%, 121%)			

57 同註 36。

無法反應田間管理變化產生之氧化亞氮排放量，如施肥量，故未直接引用；初步整理比較如表 5.5.12，本土係數均高於預設係數，但因調查基礎與估算方式不同，僅彙整做為參考。目前農試所已正進行相關研究，並彙整前人相關研究評估本土排放係數，並評估區分水旱作、土壤性質或作物種類之氧化亞氮排放係數之可行性，以提高農地氧化亞氮排放估算之準確性與精確性。

5.5.2 農業土壤的氧化亞氮間接排放

1. 排放源及匯分類的描述

管理土壤中除了通過一種直接途徑的氧化亞氮直接排放（即直接施氮於土壤），還包括兩種間接途徑進行的氧化亞氮排放。這些途徑的第一種為化學氮肥和有機氮肥以氨和氮氧化物形式的氮揮發，再沉降後進入土壤和水體表面。第二種途徑為土壤的氮經淋洗和逕流，其來源包含：化學氮肥和有機氮肥、作物殘體、礦質和有機土壤中土地利用變化或管理作法引起的土壤碳損失相關的氮礦化。而上述 NH_4^+ 和 NO_3^- 型態之氮在土壤、地下水中或表面水體中還原成氧化亞氮。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

土壤氧化亞氮間接排放，因缺乏本土係數，故參考 IPCC 指南方法 1（Tier 1）進行估算，並依我國農業耕作國情不同進行調整。

A. 揮發， N_2O （ATD）

用公式 5.5.5 估算管理土壤中揮發氮大氣沉澱中的氧化亞氮排放：

公式 5.5.5 管理土壤中氮揮發產生的氧化亞氮排放

$$\text{N}_2\text{O}_{(\text{ATD})}\text{-N} = [(\text{F}_{\text{SN}} \times \text{Frac}_{\text{GASF}}) + [(\text{F}_{\text{ON}} + \text{F}_{\text{PRP}}) \times \text{Frac}_{\text{GASM}}]] \times \text{EF}_4$$

$\text{N}_2\text{O}_{(\text{ATD})}\text{-N}$ = 每年管理土壤中揮發氮經大氣沉澱後產生的 N_2O -N 的量，公噸 N_2O -N/年

F_{SN} = 每年施用於土壤的化肥氮量，公噸 N/年

$\text{Frac}_{\text{GASF}}$ = 以 NH_3 和 NO_x 形式揮發的化肥氮比例，kg 揮發氮/kg 施用氮

F_{ON} = 每年施用於土壤的有機氮量，公噸 N/年

F_{PRP} = 每年放牧牲畜排泄在草場、牧場和圍場上的糞尿氮量，公噸 N/年

$\text{Frac}_{\text{GASM}}$ = 施用的有機氮肥物質比例（ F_{ON} ）和放牧牲畜排泄的尿液和糞便氮比例（ F_{PRP} ），以 NH_3 和 NO_x 形式揮發的氮，kg 揮發 N / (kg 施用和排泄的 N)

EF_4 = 氮揮發和再沉降後氮的 N_2O 排放的排放係數，kg N_2O -N / kg 揮發的 $\text{NH}_3\text{-N} + \text{NO}_x\text{-N}$

B. 淋洗 / 逕流， N_2O （L）

以公式 5.5.6 估算淋洗和逕流中產生的間接氧化亞氮排放：

公式 5.5.6 管理土壤氮淋洗 / 逕流產生的氧化亞氮排放

$$\text{N}_2\text{O}_{(\text{L})}\text{-N} = (\text{F}_{\text{SN}} + \text{F}_{\text{ON}} + \text{F}_{\text{PRP}} + \text{F}_{\text{CR}} + \text{F}_{\text{SOM}}) \times \text{Frac}_{\text{LEACH-(H)}} \times \text{EF}_5$$

$\text{N}_2\text{O}_{(\text{L})}\text{-N}$ = 地區每年因土壤中氮淋洗和逕流產生的 N_2O -N 的排放量，公噸 N_2O -N/年

F_{SN} = 每年施用於土壤的化肥氮量，公噸 N/年

F_{ON} = 年施用於土壤的有機氮量，公噸 N/年

F_{PRP} = 每年放牧牲畜排泄在草場、牧場和圍場上的糞尿氮量，公噸 N/年

F_{CR} = 作物殘體氮，公噸 N/年。

F_{SOM} = 每年礦質土壤中與土地利用或管理引起的土壤有機質中土壤碳損失相關聯的氮礦化量，公噸 N/年。

$\text{Frac}_{\text{淋洗-(H)}}$ = 管理土壤中通過淋洗和逕流所流失的佔總施用氮的比例，kgN/kg 投入的 N

EF_5 = 氮淋洗和逕流引起的 N_2O 排放的排放係數，(kg N_2O -N / (kg 揮發的 $\text{NH}_3\text{-N} + \text{NO}_x\text{-N}$)

表 5.5.12 農地直接氧化亞氮排放本土與預設係數

排放源	排放係數或平均排放係數（不確定性或範圍）			來源
	$\text{mg N}_2\text{O}/\text{m}^2/\text{h}$	$\text{g N}_2\text{O}/\text{m}^2$	$\text{kg N}_2\text{O}/\text{kg-N}$	
水稻田			0.003 (0.000 - 0.006)	IPCC 2006 ⁵⁸
旱田			0.01 (0.003 - 0.03)	
水稻田一期作	0.121 (0.020~0.174)		0.020 ^a (0.0003~0.028)	Yang 等人, 2003. ⁵⁹
水稻田二期作	0.048 (0.001~0.105)		0.007 ^a (0.0001~0.016)	
旱田		0.7 (0.11~17.61)	0.017 (0.003~0.431)	
蔬菜		1.04 (0.36~2.81)	0.019 ^b (0.007~0.051)	
水果		1.14 (0.56~2.23)	0.012 ^b (0.006~0.024)	
花卉		0.49 (0.21~0.77)	0.008 ^b (0.003~0.012)	

備註：1. 因排放係數差異，透過估計施肥量轉換為氮投入之排放量。

2. ^a 對於單位面積排放係數換算為投入量排放係數，水稻田施肥量是以 200 kg-N/ha，耕作期一期作 136 天、二期作 124 天估算。

3. ^b 對於單位面積排放係數換算為投入量排放係數，旱田、蔬菜、水果和花卉之施肥量分別以：260、350、600 和 400 kg-N/ha 估算。

58 同註 33。

59 Yang, S. S., Liu, C.M., Lai, C.M. and Liu, Y. L., Estimation of methane and nitrous oxide emission from paddy fields and uplands during 1990–2000 in Taiwan. Chemosphere 52: 1295–1305, 2003.

為了便於報告，用公式 5.5.2 將 $N_2O_{(ATD)}$ 、 $N_2O_{(L)}-N$ 排放量換算成氧化亞氮排放量。

(2) 排放係數

土壤氧化亞氮間接排放的預設排放、揮發和淋洗係數參照 2006 IPCC 指南預設值，如表 5.5.13 所示。

(3) 活動數據

數據來源與施用的化肥 (F_{SN})、施用的有機氮肥 (F_{ON})、(F_{CR}) 與氧化亞氮直接排放計算相同。

(4) 排放量

歷年之農業土壤間接氧化亞氮排放總量，估算結果如表 5.5.14、表 5.5.15、圖 5.5.2 與圖 5.5.3 所示。間接氧化亞氮排放總量，因農業活動衰減、合理化施肥推廣等因素下，氮投入量逐年降低。2014 年揮發與淋洗 / 逕流產生之間接氧化亞氮排放量，相較於 1990 年皆約減少 26%。

(5) 完整性

農地間接氧化亞氮排放完整性，同農地直接氧化亞氮排放之說明。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

A. 揮發

農業土壤間接氧化亞氮排放 - 揮發之計算由於涵蓋多筆活動數據，且排放係數為非常態分佈，依據 IPCC 指南建議以蒙地卡羅方法進行不確定性評估。因此農地間接氧化亞氮排放 - 揮發不確定性利用 SimulAr 軟體以蒙地卡羅方法進行，模擬設定對於活動數據、乾物比、殘體比、氮含量皆設為常態分佈（輸入均值、標準差），活動數據使用 2014 年數值，其不確定性範圍如錯誤！找不到參照來源。所示；而對於排放係數依 IPCC 提供之預設值及範圍以三角分佈模擬（輸入最大、最小值與眾數或中位數）。暖化潛勢（GWP）實際具有很大的不確定性，然在 IPCC 指南中已將其設定為固定的加權因子。各基本參數數值模擬次數為 1,000 次，評估結果如表 5.5.16 所示，農地間接氧化亞氮排放 - 揮發之不確定性為 -24%，+505%。

B. 淋洗 / 逕流

農業土壤間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流之計算由於

表 5.5.13 土壤 N_2O 間接排放的預設排放、揮發和淋洗係數

因子	IPCC 預設值 (範圍)
EF_4 [N 揮發和再沉降]，kg N_2O-N / (kg NH_3-N + 揮發 NO_x-N)	0.010 (0.002 - 0.05)
EF_5 [淋洗和逕流]，kg N_2O-N / (kg 淋洗 / 逕流 N)	0.0075 (0.0005 - 0.025)
$Frac_{GASF}$ [化肥揮發]，(kg NH_3-N + NO_x-N / kg 投入的 N)	0.10 (0.03 - 0.3)
$Frac_{GASM}$ [所有施用有機氮肥中的揮發，含放牧牲畜排泄的尿液和糞便]，(kg 揮發 N / kg 施用和排泄的 N)	0.20 (0.05 - 0.5)
$Frac_{淋洗-(H)}$ [灌溉的地區，通過淋洗 / 逕流的氮損失] (kg N / kg 投入的 N)	0.30 (0.1 - 0.8)

表 5.5.14 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 揮發之排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年分	化學氮肥	有機氮肥	合計排放量
1990	118.48	53.89	172.37
1991	125.43	43.72	169.15
1992	121.05	39.52	160.57
1993	122.81	39.69	162.50
1994	123.59	34.67	158.26
1995	126.20	30.35	156.55
1996	128.46	29.36	157.81
1997	110.94	35.87	146.81
1998	107.86	27.76	135.61
1999	104.49	27.97	132.46
2000	114.97	33.65	148.62
2001	109.16	37.20	146.35
2002	106.67	39.22	145.89
2003	93.79	40.21	134.00
2004	100.40	39.92	140.32
2005	94.05	41.66	135.70
2006	94.61	42.85	137.46
2007	93.16	43.15	136.31
2008	85.94	44.50	130.45
2009	88.42	44.41	132.82
2010	87.20	44.33	131.53
2011	84.09	42.30	126.39
2012	85.42	44.44	129.86
2013	83.16	42.84	126.00
2014	81.51	45.46	126.97

表 5.5.15. 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 淋洗 / 逕流之排放量

(單位: 千公噸二氧化碳當量)

年分	化學氮肥	有機氮肥	作物殘體	合計排放量
1990	266.57	60.63	21.84	349.04
1991	282.21	49.19	22.91	354.30
1992	272.36	44.46	23.22	340.05
1993	276.32	44.66	24.44	345.41
1994	278.07	39.01	24.79	341.87
1995	283.95	34.15	23.92	342.02
1996	289.03	33.03	23.51	345.56
1997	249.62	40.35	23.20	313.17
1998	242.68	31.23	22.59	296.50
1999	235.10	31.46	24.78	291.34
2000	258.69	37.86	27.01	323.56
2001	245.60	41.84	25.84	313.28
2002	240.00	44.12	28.52	312.65
2003	211.03	45.24	30.74	287.01
2004	225.90	44.91	32.43	303.24
2005	211.60	46.87	28.37	286.84
2006	212.87	48.20	29.90	290.97
2007	209.60	48.55	26.72	284.87
2008	193.37	50.07	27.02	270.46
2009	198.94	49.96	27.94	276.83
2010	196.21	49.87	26.79	272.87
2011	189.19	47.59	27.28	264.06
2012	192.20	50.00	26.84	269.04
2013	187.10	48.20	23.07	258.38
2014	183.40	51.15	22.93	257.47




圖 5.5.2 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 揮發之排放量




圖 5.5.3 歷年農業土壤間接氧化亞氮 - 淋洗 / 逕流之排放量



涵蓋多筆活動數據，且排放係數為非常態分佈，以蒙地卡羅方法進行不確定性評估。因此農地間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流之不確定性利用 SimulAr 軟體以蒙地卡羅方法進行，模擬設定對於活動數據、乾物比、殘體比、氮含量皆設為常態分佈（輸入均值、標準差），活動數據使用 2014 年數值，其不確定性範圍如表 5.5.17 所示；而對於排放係數依 2006 IPCC 提供之預設值及範圍以三角分佈模擬（輸入最大、最小值與眾數或中位數）。暖化潛勢（GWP）實際具有很大的不確定性，然在 IPCC 指南中已將其設定為固定的加權因子。各基本參數數值模擬次數為

1000 次。估算結果如表 5.5.17 所示，農業土壤間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流之不確定性為 -46%，+293%。

(2) 時間序列的一致性

農地間接氧化亞氮排放時間序列的一致性，同章節 5.5.1 農地直接氧化亞氮排放之說明。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同章節 5.4 水稻種植 (3.C) 之說明。

5. 特定排放源的重新計算

無。

表 5.5.16 農地土壤間接氧化亞氮排放 - 揮發之揮發係數、排放係數、活動數據及不確定性

項目	2014 年活動數據	轉換係數	氮投入量 (公噸 N)	揮發係數 (kg NH ₃ -N + NO _x -N) / (kg 投入的 N)	排放係數 (kg N ₂ O-N) / (kg 揮發的 NH ₃ -N + NO _x -N)	排放量 (千公噸二氧化碳當量)
化學肥料	174,061 公噸氮 (±4%)	-	174,06 (±4%)	0.1 (0.03-0.3)	0.001 (0.0005- 0.05)	81.51 (-50%, 739%)
有機氮肥	堆肥 2,506,422 公噸 (±5%)	乾物比 0.78 (±10%) 氮含量 2.7% (0.5%~4%)	48,54 (-61%, 50%)	0.2 (0.05~0.5)		45.46 (-63%, 393%)
	禽畜舍墊料 86,611 公噸 (±5%)					126.97 (-24%, 505%)
小計						

表 5.5.17 農地土壤間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流之排放係數、活動數據及不確定性

項目	2014 年活動數據	轉換係數			氮投入量 (公噸 N)	淋洗 / 逕流係數 (kg -N/ kg 投入的 N)	排放係數 (kg N ₂ O-N) / (kg 淋洗和逕流的 N)	排放量 (千公噸二氧化碳當量)		
化學氮肥	174,061 公噸氮 (±4%)	-			174,061 (±4%)	0.3 (0.1-0.8)	0.0075 (0.0005- 0.025)	183.40 (-65%, 402%)		
有機氮肥	堆肥 2,506,422 公噸 (±5%)	乾物比 0.78 (±10%) 氮含量 2.7% (0.5~4%)			48,542 (-61%, 50%)			51.15 (-70%, 233%)		
	禽畜舍墊料									
作物殘體	作物殘體分類	作物殘體量 (公噸)	乾物比	殘渣比 (±50%)	氮含量 (±50%)			殘體氮量 (公噸 N)	22.93 (-68%, 221%)	
	水稻	1,732,210 (±5%)	1 (±10%)	1	0.007			9,460 (-65%, 77%)		
	非固氮穀物作物	乾物	75,166 (±4%)	0.88 (±10%)	1.53			0.007		708 (-64%, 79%)
		鮮物	103,608 (±4%)	0.22 (±20%)	1.53			0.008		279 (-60%, 79%)
	固氮作物	乾物	81,455 (±5%)	0.91 (±10%)	1.83			0.008		1,085 (-58%, 78%)
		鮮物	77,934 (±4%)	0.88 (±20%)	1.83			0.016		502 (-64%, 83%)
	根莖類作物 (鮮物)	841,809 (±2%)	0.22 (±20%)	0.41	0.016			1,215 (-61%, 83%)		
	固氮綠肥 (鮮物)	1,579,000 (±3%)	-	-	0.022	7,579 (-63%, 78%)				
	非固氮綠肥 (鮮物)	218,181 (±4%)	-	-	0.048	458 (-61%, 78%)				
非固氮牧草 (鮮物)	940,785 (±5%)	0.22 (±20%)	0.46	0.015	476 (-63%, 79%)					
小計							257.47 (-46%, 293%)			

6. 特定排放源的改善計畫

目前農試所已進行地下水硝酸態氮之調查、農業長期生態系、不同土壤之氮淋洗與逕流等研究，未來可用於評估農田施用氮素後經淋洗等產生之間接氧化亞氮排放係數之本土資料。

5.5.3 農業土壤的氧化亞氮排放量

1. 總排放量

歷年之農業土壤氧化亞氮排放總量，估算結果如表 5.5.18、圖 5.5.4 所示。氧化亞氮排放總量，因農業活動衰減、作物轉作政策、合理化施肥推廣等因素下，排放量逐年降低，2014 年產生之氧化亞氮排放量，相較於 1990 年減少 26%。

2. 不確定性

不確定性由前述直接氧化亞氮排放、間接氧化亞氮排

表 5.5.18 歷年農業土壤氧化亞氮排放總量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年分	直接氧化亞氮排放	間接氧化亞氮排放 - 揮發	間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流	合計
1990	1,315.77	172.37	349.04	1,837.18
1991	1,352.31	169.15	354.30	1,875.76
1992	1,299.07	160.57	340.05	1,799.70
1993	1,328.63	162.50	345.41	1,836.54
1994	1,317.66	158.26	341.87	1,817.79
1995	1,309.67	156.55	342.02	1,808.24
1996	1,334.37	157.81	345.56	1,837.74
1997	1,177.87	146.81	313.17	1,637.85
1998	1,104.16	135.61	296.50	1,536.28
1999	1,084.82	132.46	291.34	1,508.61
2000	1,244.56	148.62	323.56	1,716.74
2001	1,184.61	146.35	313.28	1,644.24
2002	1,196.06	145.89	312.65	1,654.60
2003	1,102.50	134.00	287.01	1,523.52
2004	1,195.00	140.32	303.24	1,638.55
2005	1,101.82	135.70	286.84	1,524.36
2006	1,125.46	137.46	290.97	1,553.89
2007	1,101.27	136.31	284.87	1,522.45
2008	1,039.50	130.45	270.46	1,440.41
2009	1,064.70	132.82	276.83	1,474.35
2010	1,051.62	131.53	272.87	1,456.02
2011	1,005.80	126.39	264.06	1,396.25
2012	1,025.24	129.86	269.04	1,424.14
2013	974.97	126.00	258.38	1,359.35
2014	968.47	126.97	257.47	1,352.92




圖 5.5.4 歷年農業土壤氧化亞氮排放量

放 - 揮發、間接氧化亞氮排放 - 淋洗再以蒙地卡羅法估算時一同估算。估算結果，農業土壤總氧化亞氮排放之不確定性為 -6%，137%。

5.6 草原的焚燒 (3.E)

本項估算草原的焚燒相關的非二氧化碳排放，臺灣鮮有此系統，亦無統計資料，故此處不計算。

5.7 農作物殘體燃燒 (3.F)

本項估算農業殘體的焚燒相關的非二氧化碳排放。依據 2006 IPCC 指南建議，因假設焚燒過程中釋放的碳會在下一個生長季節被作物或植被再吸收，不需估算生質量焚燒產生的二氧化碳排放。

1. 排放源及匯分類的描述

此部分是計算現地焚燒農作物殘體時所產生的非二氧化碳溫室氣體，包含甲烷、一氧化碳、氧化亞氮、氮氧化物。因假設焚燒農作物殘體時所產生的二氧化碳會被再生長出來植物所吸收，故不予計算，因此在本項只計算焚燒產生的甲烷及氧化亞氮。我國的農業殘體焚燒主要是以水稻稻藁為主，其他 2006 IPCC 所列各作物殘體焚燒資料，如豆類、塊根植物、甘蔗等則少有，因此本項以稻藁之焚燒量來計算。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

本項計有關作物殘體焚燒之估算方法與係數，係參考 2006 IPCC 提供之預設方法 1 (Tier 1) 與係數計算，公式 5.7.1 所示，

公式 5.7.1

$$L = A \times M_b \times C_f \times G_{ef} \times 10^{-3}$$

L = 焚燒產生的溫室氣體排放量，公噸甲烷及公噸氧化亞氮

M_b = 焚燒物的單位面積質量，稻 的質量，公噸

C_f = 焚燒係數，無單位 (表 5.7.1)

G_{ef} = 排放係數，公斤 / 公噸乾物質焚燒 (表 5.7.2)

(2) 排放係數

表 5.7.1、表 5.7.2 為 2006 IPCC 提供之乾物百分比、排放係數比例的建議值，由於已有直接統計資料，故主要引用係數為稻米殘體之焚燒係數值與排放係數。

(3) 活動數據

作物殘體焚燒之活動數據，1999 至 2000 年引自農業統計年報：自給肥料 - 草木灰 (稻草經焚燒後之灰燼)，以焚燒殘餘量 20% 推算被焚燒稻草之量，2001 年後引自綠色國民所得帳之稻草焚燒量，彙整如表 5.7.3 所示。

(4) 排放量

歷年作物殘體焚燒產生之甲烷與氧化亞氮排放總量，估算結果如表 5.7.4、圖 5.7.1 所示。臺灣於 1990 年 3 月立法禁止焚燒稻草、行政院農委會自 1996 年起推行現地切斷掩埋法等政策，使 1995 年後稻草焚燒量驟降，相對溫室氣體排放量亦降低，減量約 91%。

(5) 完整性

我國的農業殘體焚燒主要是以水稻稻草為主，其他如豆類、玉米、甘蔗等僅能判斷鮮少有，無法確定比例，且在無統計資料下，未列入計算。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

活動數據係農委會統係數據，依 2006 IPCC 指南設定不確性為 5%；預設排放係數因未提供不確定性；暫無法估算。

(2) 時間序列的一致性：

殘體焚燒排放溫室氣之活動數據為不連續，2001 年後為綠色國民所得帳之稻草焚燒量，1990 至 2000 年焚燒量作物殘體焚燒之活動數據引自農業統計年報：自給肥料 - 草木灰 (稻草經焚燒後之灰燼)，以焚燒殘餘量 20% 推算被焚燒稻草之量。

表 5.5.19 農業土壤氧化亞氮排放量不確性

農業土壤氧化亞氮排放源	2014 年排放量 (千公噸二氧化碳當量)	不確定性
直接氧化亞氮排放	968.47	-24%, 121%
間接氧化亞氮排放 - 揮發	126.97	-24%, 505%
間接氧化亞氮排放 - 淋洗 / 逕流	257.47	-46%, 293%
農業土壤氧化亞氮排放量	1,352.92	-6%, 137%

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

活動數據主要來官方之綠色國民所得帳，同依照國內統計法、統計法施行細則及其他有關法令執行，其餘同章節 5.4 水稻種植 (3.C) 之說明。

5. 特定排放源的重新計算

無。

6. 特定排放源的改善計畫

無。

5.8 石灰處理 (3.G)

1. 排放源及匯分類的描述

使用石灰的目的以改善土壤酸鹼度使土壤性質適於植物生長，而於土壤中施用碳酸鹽類石灰，如含鈣性石灰 (CaCO_3) 或白雲岩 ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)，隨著碳酸鹽石灰溶解和釋放碳酸氫鹽 (HCO_3^-)，而轉變為二氧化碳和水，導致二氧化碳排放。依據國內研究估算 (連深等人，1992)⁶³，評估石灰資材用量每年僅約 1 萬公噸，以此估計在農業溫室氣體排放量比例 0.5% 以下，且缺乏直接統計資料，暫不估算。

表 5.7.1 植被類型焚燒相關的焚燒係數值 (焚燒量與原生質量比例)

植被類型	亞類	排放係數均值 (Cf)
農業殘渣	小麥殘渣	0.90
	玉米殘渣	0.80
	稻米殘渣	0.80
	甘蔗	0.80

表 5.7.2 農業殘體排放係數 (公斤 / 公噸乾物質焚燒量)

項目	甲烷	氧化亞氮
排放係數	2.7	0.07

表 5.7.3 作物殘渣焚燒量

(單位：公噸)

年	自給肥料 - 草木灰	估算稻藁焚燒量	稻藁焚燒量
1990	139,331	696,655	
1991	91,705	458,525	
1992	176,126	880,630	
1993	80,517	402,585	
1994	77,325	386,625	
1995	27,496	137,480	
1996	25,717	128,585	
1997	26,331	131,655	
1998	20,911	104,555	
1999	25,535	127,675	
2002	50,999	254,993	
2001	53,065	265,327	279,000
2002	49,407	247,037	238,000
2003	39,878	199,392	164,000
2004			143,362
2005			146,714
2006			155,805
2007			84,474
2008			113,123
2009			93,418
2010			98,214
2011			99,188
2012			100,061
2013			61,080
2014			66,561

備註：1990-2000 年引自農業統計年報⁶¹：自給肥料 - 草木灰，以焚燒殘餘量 20% 推算焚燒稻藁量。2001 年後引自綠色國民所得帳⁶²：稻藁焚燒量。

61 同註 23。

62 同註 41。

63 同註 22。

5.9 尿素使用 (3.H)

1. 排放源及匯分類的描述

尿素的施肥過程中，導致工業生產過程所固定的二氧化碳損失。尿素 ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) 在水分和尿素酶作用下轉化為銨離子 (NH_4^+)、氫氧離子 (OH^-) 和碳酸氫離子 (HCO_3^-)，而碳酸氫根最後轉變為二氧化碳和水。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

參照 2006 IPCC 指南建議方法 1 (Tier 1)，以活動數據和排放係數相乘，即公式 5.9.1 估算尿素施用過程中之二氧化碳排放；最後乘以 44/12 將 CO_2 - C 排放量換算成二氧化碳排放量。

公式 5.9.1 施用尿素產生的年度排放

$$\text{二氧化碳-C 排放} = M \times \text{EF}$$

二氧化碳 - C 排放 = 尿素施用產生的年度碳排放，公噸碳 / 年
 M = 每年施用的尿素量，公噸尿素 / 年

EF = 排放係數，公噸碳 / 公噸尿素，預設 = 0.2

表 5.7.4 作物殘體焚燒產生之甲烷與氧化亞氮排放量

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	甲烷	氧化亞氮
1990	37.62	11.63
1991	24.76	7.65
1992	47.55	14.70
1993	21.74	6.72
1994	20.88	6.45
1995	7.42	2.29
1996	6.94	2.15
1997	7.11	2.20
1998	5.65	1.74
1999	6.89	2.13
2000	13.77	4.26
2001	15.07	4.66
2002	12.85	3.97
2003	8.86	2.74
2004	7.74	2.39
2005	7.92	2.45
2006	8.41	2.60
2007	4.56	1.41
2008	6.11	1.89
2009	5.04	1.56
2010	5.30	1.64
2011	5.36	1.66
2012	5.40	1.67
2013	3.30	1.02
2014	3.59	1.11




圖 5.7.1 歷年作物殘體焚燒之甲烷與氧化亞氮排放量

(2) 排放係數

尿素採用的總排放係數 (EF) 為 0.20，為尿素 (CO (NH₂)₂) 原子量中的碳含量的 20%。

(3) 活動數據

如農地直接氧化亞氮排放之化肥施用量中的尿素施用量如表 5.9.1 所示。

(4) 排放量

尿素施用產生之二氧化碳排放量如圖 5.9.1、表 5.9.1 所示。因尿素成本價格上漲與政府肥料補貼調整下，使尿素施用量在近 10 年間逐年下滑，排放量因尿素施用量減少而逐年下降，2014 年排放量相較 1990 年間少 72%。

(5) 完整性

活動數據完整取自農業統計年報之尿素施用量，無缺漏。

表 5.9.1 歷年尿素施用量與施用產生之二氧化碳排放

年	尿素施用量 ⁶⁴	二氧化碳排放量
	公噸	千公噸二氧化碳當量
1990	193,121	141.62
1991	198,997	145.93
1992	189,649	139.08
1993	178,109	130.61
1994	183,914	134.87
1995	205,923	151.01
1996	205,577	150.76
1997	182,367	133.74
1998	173,169	126.99
1999	161,544	118.47
2000	178,367	130.80
2001	128,509	94.24
2002	127,158	93.25
2003	112,438	82.45
2004	113,914	83.54
2005	84,968	62.31
2006	81,093	59.47
2007	78,358	57.46
2008	77,478	56.82
2009	75,636	55.47
2010	73,420	53.84
2011	71,966	52.78
2012	74,931	54.95
2013	61,856	45.36
2014	54,399	39.89




圖 5.9.1 歷年尿素施用產生二氧化碳排放

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

其係數採用預設不確定性為 -50%，排放量已表示尿素相關之施用的最大絕對排放量，不可能超過預設排放係數，故無正值不確定性。活動數據引自農業統計年報之活動數據，依 2006 IPCC 指南設定其不確定性 5%。利用誤差傳播法組合不確定性，計算結果如下：

$$\text{上限：} U_{\text{urea apply CO}_2} = \sqrt{0^2 + 5^2} = 5\%$$

$$\text{下限：} U_{\text{urea apply CO}_2} = -\sqrt{50^2 + 5^2} = -50\%$$

(2) 時間序列的一致性

1990 年至 2014 年排放係數、活動數據來源及計算方法皆維持一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

同章節 5.4 水稻種植 (3.C) 之說明。

5. 特定排放源的重新計算

無。

6. 特定排放源的改善計畫

無。

5.10 其他含碳肥料 (3.I)

本項暫未估算。

5.11 其他 (3.J)

無其他項目

參考文獻

- IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use, Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management, 2006.
- Jung-Jeng Su, Bee-Yang Liu and Yuan-Chie Chang, Emission of greenhouse gas from livestock waste and wastewater treatment in Taiwan, Agriculture Ecosystem & Environment 95: pp.253-263, 2003.
- 王淑音、黃大駿、許皓豐，肉雞糞尿處理溫室氣體排放之推估，臺灣農業化學與食品科學，39 (6)：415-422，2001。
- 王淑音、馬維君、黃大駿，臺灣地區蛋雞產業之腸內發酵溫室氣體排放估測，中國畜牧學會會誌，31 (3)：221-230，2002。
- 王淑音、謝憲蔚、王思涵、陳盈豪，應用呼吸室測定鵝之腸內發酵溫室氣體排放係數，中國畜牧學會會誌，32 (1)：43-50，2003。
- 行政院農業委員會，中華民國農業統計年報，2015。
- 行政院農業委員會，畜禽統計調查結果，2015。
- 李春芳，個人通訊，行政院農業委員會畜產試驗所營養組，2014。
- 黃大駿、王淑音，臺灣地區白色肉雞產業之溫室氣排放，中國畜牧學會會誌，29 (1)：65-75，2000。
- 黃大駿，臺灣地區肉雞產業溫室氣體排放之探討，中國文化大學碩士論文，2000。
- 蔡明宏、陳筱薇、黃楷翔、林政緯、王淑音，肉鴨腸內發酵溫室氣體排放係數，中國畜牧學會會誌，29 (1)：65-75，2003。
- IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4. Agriculture, Forestry and Other Land Use, 2006.
- IPCC, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, Volume 1 General Guidance and Reporting, Chapter 3. Uncertainties, 2006.
- IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4. Agriculture, Forestry and Other Land Use, Chapter 11: N₂O Emissions from Managed Soils, and CO₂ Emissions from Lime and Urea Application, 2006.
- IPCC, Fourth Assessment Report: Climate Change, 2007.
- Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italian, Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2012 National inventory Report, 2014.
- Ministry of the Environment, Japan, National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan, 2014.
- Wang C. S., Tsao S. H., and Liu D. J., Effects of N Fertilization on the Growth and Yield of Two Maize Hybrids. Jour. agric. res. China. 35 (4) . 437~448, 1986.
- Yang, S.S., Lin, C.C., Chang, E.H., Chung, R.S. and Huang, S.N.. Effect of fertilizer, soil type, growth season on methane production and emission in the paddy soils of Taiwan. J. Biomass Energy Soc. China 13: 68-87, 1994.
- Yang, S. S., Liu, C.M., Lai, C.M. and Liu, Y. L., Estimation of methane and nitrous oxide emission from paddy fields and uplands during 1990-2000 in Taiwan. Chemosphere 52: 1295-1305, 2003.

21. Yang, S. S., Lai, C. M., Chang, H. L., Chang, E.H., Wei, C. B., Estimation of methane and nitrous oxide emissions from paddy fields in Taiwan. *Renewable Energy*, 34:1916-1922, 2009.
22. 行政院主計處，綠色國民所得帳編製報告，2015。
23. 行政院農業委員會，臺灣農家要覽，1995。
24. 行政院農業委員會，肥料要覽，2001。
25. 行政院農業委員會，中華民國農業統計年報，2015。
26. 行政院農業委員會農糧署，作物施肥手冊，2003。
27. 行政院農業委員會農糧署，稻穀生產成本調查報告，2015。
28. 行政院農業委員會農糧署，農糧統計\公務統計\臺灣地區肥料產銷量值，<http://www.afa.gov.tw/>
29. 有機農業全球資訊網。<http://info.organic.org.tw/supergood/front/bin/home.phtml>
30. 呂秀英、呂椿棠、陳烈夫，水芋收穫指數的動態模式，*中華農業研究*，48（2）：86-99，1999。
31. 李銘全、許秋玫、林順臺、洪阿田，不同氮施用量對紅豆接種根瘤菌生長與產量之影響，*行政院農業委員會高雄區農業改良場研究彙報*，10（2）：22-31，1999。
32. 林順福、詹國連、魏趨開，每穴種植株數對同質與異質大豆族群生育之影響，*中華農業研究*。40（3）：305-314，1991。
33. 連深、王鐘和、黃維廷，石灰資材之品質及評估，酸性土壤之特性及其改良研討會論文集，pp. 8-1~8-12. *中華土壤肥料學會*. 台中市，臺灣，1992。
34. 郭鴻裕，臺灣地區酸性土壤之分佈及其利用現況，酸性土壤之特性及其改良研討會論文集，*中華土壤肥料學會*。pp. 3-1-3-7，1992。
35. 郭鴻裕、朱戩良、江志峰、吳懷國，臺灣地區土壤有機質含量及有機資材之施用狀況，*有機質肥料合理施用技術研討會專刊*，p.72-83，*行政院農業委員會農業試驗所*，1995。
36. 陳仁炫，有機質肥料的檢測與成分分析結果之解析，*有機質肥料之特性與管理研習會專刊*，p. 58-67，*國立中興大學土壤調查試驗中心編印*，2003。
37. 黃勝忠、宋勳，台中地區落花生地方品種之純化與生產力評估。*臺中區農業改良場研究彙報* 46:27-35，1995。
38. 賴永昌、廖嘉信、陳一心，金山地區春夏作甘藷不同種期對塊根產量之影響，*中華農業研究* 45（1）：26-34，1996。
39. 譚增偉、劉禎祺、陳桂暖，土壤肥力與合理化施肥，*合理化施肥專刊*，*行政院農業委員會農業試驗所*，43-62，2005。
40. 譚增偉、陳桂暖，長期不同耕作制度及作物殘體管理對土壤有機質含量的影響，*臺灣農業研究* 60（2）：115-124，2011。



第六章 土地利用、土地利用變化及林業部門 (CRF SECTOR 4)

6.1 部門概述

6.2 森林土地

第六章 土地利用、土地利用變化及林業部門 (CRF SECTOR 4)

6.1 林業部門敘述

聯合國政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 於 1997 年將土地使用、土地使用改變及林業 (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) 納入國家溫室氣體排放清冊指南 (Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; IPCC 1996 Guidelines, 以下簡稱 1996 IPCC 指南)¹, 對於土地利用改變造成的碳排放量, 以及林業碳移除量 (Removal) 等估算方法提出具體建議, 之後 IPCC 於 2003 年再公布 LULUCF 的良好作法指南 (LULUCF GPG)。

目前最新的版本為 IPCC 於 2006 年所公布國家溫室氣體排放清冊指南) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 以下簡稱 2006 IPCC 指南), 其內容係結合 IPCC 1996 指南及 2003 年 LULUCF GPG 的主要精神與內容。在 2006 IPCC 指南架構下共區分為五大部門, 其中與森林有關的部門為 3.B.1 「農業、林業和其他土地使用 (Agriculture, Forestry and other Land Use, AFOLU)」 部分之土地 (含林地維持為林地及林地與其他土地使用類型的轉換) 及 3.D.1 「收穫林產品 (Harvested Wood Product, HWP)」 等部分。

由於臺灣區域計畫法、森林法對於林業用地變更以及森林伐採均已訂有相關規範, 且自 1992 年起即實施禁伐天然林政策, 至林地變更為其他使用之情形極少, 因此可藉林務局第三次與第四次全國森林資源調查成果之林型面積, 以及林業統計每年新植造林、伐採、薪材收穫及干擾等相關數據, 據以估算臺灣林業移除量現況。

估算結果, 1990 至 2014 年臺灣地區森林資源整體之年移除量變化為 1,900 至 2,350 萬公噸二氧化碳當量, 2014 年臺灣森林移除量約為 2,147 萬公噸二氧化碳當量, 其不確定性為 8.34%, 詳如表 6.1.1, 其歷年趨勢如圖 6.1.1, 2014 年其中「林地維持林地」碳移除量占 94.57%, 「其他土地轉變為林地」碳移除量占 5.43%, 如圖 6.1.2。

6.2 森林土地 (4.A)

6.2.1 林地維持林地 (4.A.1)

1 排放源及匯分類的敘述

森林所貯存之碳庫 (carbon pool) 可區分為生物量 (Biomass) (包含地上部及地下部生物量)、死有機質 (Dead organic matter) (包含死木與枯落物)、土壤 (Soils) (包含土壤有機質) 等三大類。各類碳庫說明如表 6.2.1 所示。

2 方法學議題：

(1) 計算方法：

在林地碳貯存量的變化, 主要為各碳庫變化的總和 (式 1)。

$$\Delta C_{FL} = \Delta C_B + \Delta C_{DOM} + \Delta C_{Soils} \quad (1)$$

式中：

ΔC_{FL} = 林地的碳貯存量的變化 (公噸碳 / 年) ;

ΔC_B = 生物量的碳貯存年變化量 (公噸碳 / 年) ;

ΔC_{DOM} = 死有機物質 (包括死木和枯落物) 的年碳貯存量變化 (公噸碳 / 年) ;

ΔC_{Soils} = 土壤碳貯存年變化量 (公噸碳 / 年)

僅就其中 ΔC_B 、 ΔC_{DOM} 、 ΔC_{Soils} 之估算分述如下：

A. ΔC_B 生物量 (Biomass) 碳貯存量的變化

在生物量每年所增加的碳貯存量, 主要為每年生物量因生長所增加的碳貯存量扣除因生物量損失所減少的碳貯存量 (式 2)。

$$\Delta C_B = \Delta C_G - \Delta C_L \quad (2)$$

式中：

ΔC_B = 生物量的碳貯存年變化量 (公噸碳 / 年) ;

ΔC_G = 生物量生長之年碳貯存增加量 (公噸碳 / 年) ;

ΔC_L = 生物量損失之年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年)。

而生物量生長之年碳貯存增加量, 依林木的地理區位、平均年生長情形及面積而異 (式 3)。

$$\Delta C_G = \sum_{ij} (A_{ij} \times G_{TOTALij}) \times CF_{ij} \quad (3)$$

式中：

ΔC_G = 生物量生長之年碳貯存增加量 (公噸碳 / 年) ;

A = 面積 (公頃) ;

G_{TOTAL} = 平均年生物量累積量 (公噸乾物質 / 公頃 / 年) ;

i = 生態區 ($i = 1$ 至 n) ;

j = 氣候型 ($j = 1$ 至 m) ;

CF = 乾物質碳含量比例 (公噸碳 / 公噸乾物質)

平均年生物量累積量, 在層級 1 的情況時, 可依林木地上部的平均年生物量增加量乘上根莖比可得出 (式 4)。

1 IPCC, 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 1996.

表 6.1.1 1990 至 2014 年臺灣地區森林資源整體之年移除量變化

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年度	林地維持林地		其他土地轉變為林地	總移除量變化 ΔCO_2	不確定性 (%)
	生物量二氧化碳貯存增加量 ΔCO_{2G}	生物量年二氧化碳貯存損失量 ΔCO_{2L}	生物量年二氧化碳貯存增加量 ΔCO_{2G}		
1990	-23,902	607	-91	-23,386	7.58
1991	-23,902	2,503	-91	-21,490	7.18
1992	-23,713	333	-136	-23,516	7.65
1993	-23,524	216	-185	-23,493	7.69
1994	-23,335	190	-233	-23,379	7.70
1995	-23,146	202	-288	-23,233	7.70
1996	-22,957	559	-319	-22,717	7.60
1997	-22,768	266	-397	-22,899	7.71
1998	-22,579	326	-446	-22,699	7.71
1999	-22,390	401	-561	-22,550	7.70
2000	-22,201	389	-665	-22,476	7.73
2001	-22,012	1,112	-683	-21,583	7.57
2002	-21,823	167	-759	-22,415	7.91
2003	-21,633	227	-899	-22,305	7.92
2004	-21,444	243	-995	-22,196	7.96
2005	-21,255	369	-1,031	-21,918	7.99
2006	-21,066	251	-1,046	-21,861	8.13
2007	-20,877	308	-1,080	-21,650	8.20
2008	-20,688	199	-1,142	-21,631	8.33
2009	-20,499	2,753	-1,166	-18,911	7.70
2010	-20,392	218	-1,240	-21,413	8.41
2011	-20,409	140	-1,202	-21,470	8.40
2012	-20,435	145	-1,283	-21,572	8.40
2013	-20,473	135	-1,226	-21,564	8.40
2014	-20,508	197	-1,166	-21,477	8.38




圖 6.1.1、1990 至 2014 年林業部門森林資源整體移除量變化趨勢

在層級 2 及 3，林木地上部的平均年生物量增加量可由特定林木（植被）的年平均材積生長量乘上其轉換生物量和擴展係數可得出（式 5）。

$$\text{層級 1 } G_{\text{TOTAL}} = \sum \{G_w \times (1+R)\} \quad (4)$$

$$\text{層級 2、3 } G_{\text{TOTAL}} = \sum \{IV \times BCEF_1 \times (1+R)\} \quad (5)$$

式中：

G_{TOTAL} = 平均年生物量累積量（公噸乾物質 / 公頃 / 年）；

G_w = 在特定林木（植被）類型地上部生物量的平均年生長量（公噸乾物質 / 公頃 / 年）；

R = 根莖比；

IV = 特定林木（植被）類型的年平均材積生長量（立方公尺 / 公頃 / 年）；

$BCEF_1$ = 特定林木（植被）類型之轉換生物量和擴展係數，將材積（包括樹皮）轉換為地上部生物量。

如直接的 $BCEF_1$ 不可得知，則可使用生物量擴展係數（ BEF_1 ）與基本比重（ D ）值相乘得出（式 6）。

$$BCEF_1 = BEF_1 \times D \quad (6)$$

生物量損失之年碳貯存減少量為商用木材伐採、薪材收穫與干擾等因素所引起的年碳貯存減少量（式 7）。

$$\Delta C_L = L_{\text{wood-removals}} + L_{\text{fuelwood}} + L_{\text{disturbance}} \quad (7)$$




圖 6.1.2、2014 年森林除移量各項目占比

表 6.2.1 碳庫定義

碳庫		說明
生物量 (Biomass)	地上部生物量 (Aboveground Biomass)	土壤以上所有活的木本和草本之生物量，包括莖、殘幹 (Stump)、枝、樹皮、種子和葉。 註：如果森林下層植被占地上部生物量碳庫的比例較小，某種程度的不計入是可接受的，但在整個調查時間中應一致。
	地下部生物量 (Belowground Biomass)	活根的全部生物量。建議直徑低於 2 公釐的細根經常是不計入在內，因為只憑經驗將直徑低於 2 公釐的細根與土壤有機質或枯落物相區分是相當困難的。
死有機質 (Dead Organic matter)	死木 (Dead Wood)	除枯落物外的所有非活的木質生物量，無論是直立的、橫躺在地面上的或者在土壤中的。死木包括直徑大於或等於 10 公分的枯倒木、死根和殘幹。
	枯落物 (Litter)	所有非活的生物量，建議直徑應大於 2 公釐（因要與土壤有機物區分）及直徑小於死木所定義的最小直徑（例如 10 公分）、在礦質或有機質土壤上已經死亡的、各種程度的腐朽狀況的所有非活的生物量。這包括土壤類型所定義的枯落物層及在礦質或有機質土壤上的活細根（最小直徑應低於地下部生物量所規定）。
土壤 (Soils)	土壤有機質 (Soil Organic Matter)	包括達到所選擇深度的礦質土壤的有機碳，如在土壤中的活和死的細根和死有機質、如果不能憑經驗區分的最小直徑小於 2 公釐（建議值）的根及死有機質。土壤深度預設為 30 公分。

資料來源：IPCC, 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventory, 2006.



式中：

ΔC_L = 生物量損失之年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年) ;
 $L_{\text{wood-removals}}$ = 商用木材採採所引起的年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年) ;
 L_{fuelwood} = 薪材收穫所引起的年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年) ;
 $L_{\text{disturbance}}$ = 干擾等其他因素所引起的年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年)

商用木材採採所引起的年碳貯存減少量，主要受每年伐採量所影響 (式 8)。

$$L_{\text{wood-removals}} = \{H \times BCEF_R \times (1+R) \times CF\} \quad (8)$$

式中：

$L_{\text{wood-removals}}$ = 商用木材採採所引起的年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年) ;
 H = 每年採伐量 (立方公尺 / 年) ;
 R = 根莖比 ;
 CF = 乾物質碳含量比例 (公噸碳 / 公噸乾物質) ;
 $BCEF_R$ = 將木材採伐材積換算為地上部總生物量 (含樹皮) 的生物量擴展係數。

如直接的 $BCEF_R$ 不可得知，則可使用伐採生物量擴展係數 (BEF_R) 與基本比重 (D) 值相乘得出 (式 9)。

$$BCEF_R = BEF_R \times D \quad (9)$$

薪材收穫所引起的年碳貯存減少量，主要受每年收穫薪材的全株與林木材積而異 (式 10)。

$$L_{\text{fuelwood}} = \{FG_{\text{trees}} \times BCEF_R \times (1+R)\} \times CF \quad (10)$$

式中：

L_{fuelwood} = 薪材收穫所引起的年碳貯存減少量 (公噸碳 / 年) ;
 FG_{trees} = 每年收穫薪材材積 (立方公尺 / 年) ;
 R = 根莖比 ;
 CF = 乾物質碳含量比例 (公噸碳 / 公噸乾物質) ;
 $BCEF_R$ = 將木材採伐材積換算為地上部總生物量 (含樹皮) 的生物量擴展係數。

如直接的 $BCEF_R$ 不可得知，則可使用採伐生物量擴展係數 (BEF_R) 與基本比重 (D) 值相乘得出 (式 11)。

$$BCEF_R = BEF_R \times D \quad (11)$$

干擾等其他因素所引起的年碳貯存減少量，依干擾面積及該地區原先的生物量及所造成的生物量損失程度而異 (式 12)。

$$L_{\text{disturbance}} = \{A_{\text{disturbance}} \times BW \times (1+R) \times CF \times fd\} \quad (12)$$

如因干擾所損失的生物量可以計算，則可將上式加以修正為：

$$L_{\text{disturbance}} = \{DV \times BCEF_1 \times (1+R) \times CF \times fd\} \quad (13)$$

式中：

$L_{\text{disturbance}}$ = 干擾等其他因素所引起的年碳貯存減少量 (公噸 - 碳 / 年) ;
 $A_{\text{disturbance}}$ = 受干擾影響的森林面積 (公頃 / 年) ;
 BW = 受干擾影響地區的平均地上部生物量 (公噸 / 公頃) ;
 R = 根莖比 ;
 CF = 乾物質碳含量比例 (公噸碳 / 公噸乾物質) ;
 fd = 干擾造成該地生物量損失程度 (如由於干擾造成林分生物量全部損失，則 $fd = 1$ ，如因病蟲害干擾而僅造成部分生物量的損失，則 $0 < fd < 1$) ;
 DV = 受干擾所損失的材積量 (立方公尺) ;
 $BCEF_1$ = 特定林木 (植被) 類型之轉換生物量和擴展係數，將材積 (包括樹皮) 轉換為地上部生物量。如直接的 $BCEF_1$ 不可得知，則可使用生物量擴展係數 (BEF_1) 與基本比重 (D) 值相乘得出 (式 6)。

B. ΔC_{DOM} 死有機物質 (Dead organic matter) 碳貯存量變化

採用層級一方法，對於這些碳庫中的碳貯存量變化並不明顯，因此其預設值可假設為零，即投入與損失相抵，因此死有機質碳貯存量變化淨值為零。當國家於報告年間沒有經歷森林類型、擾動或經營體制的重大轉變，這是個安全的假設。

C. ΔC_{Soils} 土壤 (Soils) 碳貯存量變化

上述假設可同樣應用於土壤碳庫，淨碳儲存變化量為零。

(2) 轉換係數

基本比重 (D)：針葉樹林型採用王兆桓 (2008)² 對 6 種針葉樹種研究數據，依各樹種第四次森林資源調查之面積加權計算平均，其值為 0.41。闊葉樹則將林裕仁等 (2002)³ 對 15 種闊葉樹種研究之結果進行平均，為 0.56。針闊葉混淆林為針葉樹與闊葉樹之平均值 0.49。

生物量擴展係數 (BEF_1 、 BEF_R)：針葉樹數值取自王兆桓 (2008)² 各針葉樹種之平均值 1.27。闊葉樹採用各文獻之中位數 1.40，共有王兆桓與劉知好 (2006)⁴、王兆桓 (2008)²、李宣德與馮豐隆 (2010)⁵、林國銓等 (1994)⁶ 與林國銓與何淑玲 (2005)⁷ 等五篇文獻。針闊葉混淆林為針葉樹與闊葉樹之平均值 1.34。

2 王兆桓，森林蓄積量與生物量轉換模式之建立 (3/3)，林務局委託研究報告，2008。

3 林裕仁、劉瓊霏、林俊成，臺灣地區主要用材比重與碳含量測定，臺灣林業科學 17 (3)：291-299，2002。

4 王兆桓、劉知好，森林蓄積量與生物量轉換模式之建立，2006 森林碳貯存研討會論文集：200-215，2016。

5 李宣德、馮豐隆，臺灣地區樟樹生物量擴展係數之建立，林業研究季刊 32 (3)：45-54，2010。

6 林國銓、洪富文、游漢明、馬復京，福山試驗林闊葉林生態系生物量與葉面積指數的累積與分布。林業試驗所研究報告季刊 9 (4)：299-315，1994。

7 林國銓、何淑玲，由生物量推估台灣不同林分之碳儲存量，森林經營對二氧化碳貯存之貢獻研討會論文集：97-108，2005。

生物量轉換與擴展係數 (BCEF_I、BCEF_R)：於針葉樹部分同樣採用王兆桓 (2008)²，取其平均值 0.51。闊葉樹則取王兆桓 (2008)²、林國銓等 (2007)⁸、林國銓等 (2008)⁹、林國銓等 (2009)¹⁰、林國銓與何淑玲 (2005)⁷、許原瑞等 (2006)¹¹ 與許原瑞 (2008)¹² 等七篇文獻之中位數 0.92 為代表。針闊葉混淆林為針葉樹與闊葉樹之平均值 0.72。

根莖比 (R)：因國內針葉樹研究報告缺乏，故採用 2006 IPCC 指南對亞熱帶濕潤林的預設值之平均 0.22 作為針葉樹的 R 值。闊葉樹則採用李宣德與馮豐隆 (2008)¹³、林國銓等 (2006)¹⁴、林國銓等 (2007)⁸、林國銓等 (2008)⁹、林國銓等 (2009)¹⁰、林國銓等 (2010)¹⁵、林國銓與何淑玲 (2005)⁷、柯淑惠 (2005)¹⁶、陳財輝等 (1998)¹⁷ 及陳財輝與呂錦明 (1988)¹⁸ 共十篇文獻，7 種樹種，取其之中位數 0.24 為代表。針闊葉混淆林為針葉樹與闊葉樹之平均值 0.23。

乾物質碳含量比例 (CF)：根據林裕仁等 (2002)³ 對臺灣 24 種主要用材進行的研究，分別使用針葉樹種與闊葉樹種實驗結果的平均值，針葉樹與闊葉樹碳含量比例分別為 0.4821 與 0.4691。針闊葉混淆林為針葉樹與闊葉樹之平均值為 0.4756。

竹林之基本比重採用王義仲與陳周宏 (1995)¹⁹、王義仲 (2006)²⁰ 及林裕仁等 (2011)²¹ 等三篇研究，共六種竹種，取其中位數 0.62。生物量擴展係數與根莖比皆以呂錦明與陳財輝 (1992)²² 對桂竹林分生物量的研究結果，其數值分別為 1.40 與 0.46。乾物質碳含量比例則以林裕仁等 (2011)²¹ 對孟宗竹、桂竹、麻竹及刺竹之碳轉換係數的研究，以四種竹材的平均值為代表，設為 0.4732。生長則依王義仲 (2006)²⁰ 的研究結果，每公頃 5 年生孟宗

竹的竹稈生物量為 105.1 公噸，每公頃 5 年生桂竹的竹稈生物量為 33.3 公噸，將兩種竹類所得結果加以平均，可知平均每公頃竹稈年生長量為 13.84 公噸。

年生長量數據則推算自全國森林資源調查之成果，以第三次森林資源調查與第四次森林資源調查之單位面積材積相比較，即可獲得各林型之平均年生長量，結果如表 6.2.2。

(3) 活動數據

以目前國內可取得及歸納之資料進行分類計算。

A. 森林資源面積、蓄積與生長量

林地面積以全國森林資源調查之成果為主，行政院農業委員會林務局 (以下簡稱林務局) 已完成四次全國性森林資源調查，第三次森林資源調查之調查時間為 1990 年 3 月至 1993 年 9 月，故假設以中間值 1991 年為基準年，而第四次森林資源調查之航照影像主要取自 2008 至 2010 年，故採用 2009 年為基準年，1991 年至 2009 年間的數據則採內插法推得，第四次調查與第三次調查比較，森林面積增加約 8 萬多公頃，主要增加區位在國有林事業區外之山坡地與平地。

在實務操作上為求算出林地維持林地的運作機制，2009 年後之林型面積，以第四次森林資源調查成果 (含事業區內及事業區外) 的土地利用圖為森林基線，包含天然針葉林、天然針闊葉混淆林、天然闊葉林、人工針葉林、人工針闊葉混淆林、人工闊葉林、木竹混淆林和竹林等八種林型，並考量到崩塌地因素，林地崩塌主要為林地覆蓋的改變，並非使用狀態的改變，因此仍屬於林地維持林地的狀態，但由於林地崩塌，其覆蓋的林木亦皆隨之崩塌形成漂流木，無法持續生長，依據林務局委託成功大學執行

8 林國銓、杜清澤、黃菊美，苗栗地區相思樹和木油桐人工林碳和氮累積量及生產量之估算，中華林學季刊 40 (2)：201-218，2007。

9 林國銓、黃菊美、杜清澤，檳榔人工林造林木碳貯存量和吸存量之估算，國家公園學報 18 (2)：45-58，2008。

10 林國銓、杜清澤、黃菊美，台東地區相思樹與楓香兩人工林碳累積量，林業研究季刊 31 (3)：55-68，2009。

11 許原瑞、洪昆源、王巧萍、吳孟鈴、邱祈榮，海岸林分生物量調查規劃，2006 年森林碳吸存研討會論文集：217-235，2006。

12 許原瑞，桉樹類的生物量與碳蓄積量，97 年度森林碳管理研討會論文集：17-29，2008。

13 李宣德、馮豐隆，森林碳吸存資源調查推估模式系統—以臺灣樟樹為例，臺灣林業科學 23 (Supplement)：S11-22，2008。

14 林國銓、杜清澤、黃菊美、王巧萍，亞熱帶闊葉林林木粗根生物量和養分含量之估算，臺灣林業科學 21 (2)：155-166，2006。

15 林國銓、杜清澤、黃菊美，光蠟樹人工林碳貯存量和吸存量之估算，中華林學季刊 43 (2)：261-276，2010。

16 柯淑惠，台灣檳榔人工林生物量及碳貯存量之研究，國立中興大學森林學系碩士論文，台中，2006。

17 陳財輝、許博行、張峻德，四湖木麻黃林分生物量及養分量聚集，臺灣林業科學 13 (4)：325-349，1998。

18 陳財輝、呂錦明，苗栗海岸沙丘木麻黃人工林之生長及林分生物量，林業試驗所研究報告季刊 3 (1)：333-343，1988。

19 王義仲、陳周宏，台灣產竹種工藝利用價值之評估 (1)，林產工業 14 (1)：82-94，1995。

20 王義仲，竹林生物量調查回顧與展望。2006 森林碳吸存研討會論文集：167-188，2006。

21 林裕仁、王秋嫻、Sara Wu，四種臺灣竹材碳轉換係數之分析，臺灣林業科學 26 (4)：341-355，2011。

22 呂錦明、陳財輝，桂竹之林分構造及生物量—桶頭—桂竹林分之例，林業試驗所研究報告季刊 7 (1)：1-13，1992。

「運用衛星影像於全島崩場地判釋與災害分析」研究成果，將此種林地崩塌的面積予以扣除。將各年度崩場地圖層以空間聯集的方式累加，取得年度總累計崩塌面積，再採取排除方式來運算，以第四次臺灣森林資源調查成果的森林面積為森林基線面積，透過森林基線面積扣除每年度總累積崩塌面積，各年度崩塌地面積如表 6.2.3 所示：

此外，「其他土地轉變為林地」經過 20 年之過渡期後，計算時改納入林地維持林地的面積估算，如 1990 年之造林面積，至 2011 年時加總至林地維持林地之面積中。

經上述資料與步驟整理，各年度林地維持林地之面積如表 6.2.4。

B. 每年伐採量 (H)、每年收穫薪材材積 (FG_{trees})

根據歷年林務局之林業統計加以整理 (如表 6.2.5)。

C. 受干擾影響的森林面積 (disturbance) 與損失材積量 (DV)

根據歷年之林務局之林業統計加以整理 (表 6.2.6)，其中受干擾影響之來源包括盜伐、火災、火警、濫墾及其他；幼齡木、幼苗、竹叢、副產物之損失未列入。

(4) 碳移除量

1990 至 2014 年「林地維持林地」移除量變化估算結果，每年大致呈現穩定的狀態，主要係由於臺灣區域計畫畫法、森林法對於林業用地變更以及森林伐採均已訂有相關規範，且自 1992 年起即實施禁伐天然林政策，至林地變更為其他使用之情形極少，因此變動幅度小。惟其中 1991 年、2001 年及 2009 年，因森林大火與颱風等重大災害，促使當年度生物量年碳損失量 (ΔC_L) 較高，致該三年之碳移除量較低，其餘各年均維持穩定之狀態。

3 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

推算臺灣「林地維持林地」移除量之不確定性採用「誤差傳遞法」，因蒙地卡羅法進行估算時在數據的應用上較為複雜且須統計軟體的協助，而誤差傳遞法即可符合目前國內資料處理的需求。

林地移除量的不確定性討論對象包含林業活動數據 (如土地使用面積) 與轉換係數 (如各種碳轉換係數) 二大項目。其中因林業活動數據取自全國森林資源調查，第四次森林資源調查以航照圖判釋，繪製土地利用型圖，無

表 6.2.2 相關各轉換係數及年生長量

林型 \ 係數	D	BEF	BCEF	R	CF	年生長量 (立方公尺 / 公頃)
天然針葉林	0.41	1.27	0.51	0.22	0.4821	3.15
天然針闊葉混淆林	0.49	1.34	0.72	0.23	0.4756	9.04
天然闊葉林	0.56	1.40	0.92	0.24	0.4691	3.30
人工針葉林	0.41	1.27	0.51	0.22	0.4821	7.36
人工針闊葉混淆林	0.49	1.34	0.72	0.23	0.4756	10.14
人工闊葉林	0.56	1.40	0.92	0.24	0.4691	4.26
木竹混淆林	0.49	1.34	0.72	0.23	0.4756	3.60
竹林	0.62	1.40	-	0.46	0.4732	13.84

註：竹類生長量應有高估情形，惟目前尚缺乏老熟竹林分移除量之研究數據。

表 6.2.3 2010 至 2014 年森林崩塌面積

林型 \ 係數	2010	2011	2012	2013	2014	累計崩塌面積	累計崩塌比例 百分比
	公頃						
天然針葉林	1,184	447	545	192	341	2,710	11.97
天然針闊葉混淆林	835	207	263	148	241	1,694	7.48
天然闊葉林	7,775	1,755	2,041	1,496	1,578	14,645	64.69
人工針葉林	253	74	83	60	50	519	2.29
人工針闊葉混淆林	232	49	48	47	45	420	1.86
人工闊葉林	913	150	157	75	97	1,392	6.15
木竹混淆林	561	87	37	41	35	761	3.36
竹林	357	53	24	45	21	499	2.20
年崩塌面積	12,109	2,821	3,197	2,104	2,408		

表 6.2.4 1990 至 2014 年林地維持林地面積

(單位：公頃)

年度	林型	天然針葉林	天然針闊葉混淆林	天然闊葉林	人工針葉林	人工針闊葉混淆林	人工闊葉林	木竹混淆林	竹林
1990		220,100	286,376	975,800	218,400	37,287	144,600	67,537	152,300
1991		220,100	286,376	975,800	218,400	37,287	144,600	67,537	152,300
1992		219,301	277,021	995,526	210,858	38,152	141,338	70,171	150,033
1993		218,501	267,666	1,015,253	203,317	39,017	138,075	72,805	147,766
1994		217,702	258,311	1,034,979	195,775	39,882	134,813	75,438	145,499
1995		216,903	248,956	1,054,706	188,234	40,747	131,551	78,072	143,232
1996		216,103	239,601	1,074,432	180,692	41,612	128,288	80,706	140,966
1997		215,304	230,246	1,094,159	173,151	42,477	125,026	83,339	138,699
1998		214,504	220,891	1,113,885	165,609	43,342	121,764	85,973	136,432
1999		213,705	211,536	1,133,612	158,067	44,207	118,501	88,607	134,165
2000		212,906	202,181	1,153,338	150,526	45,072	115,239	91,240	131,898
2001		212,106	192,826	1,173,065	142,984	45,937	111,977	93,874	129,631
2002		211,307	183,471	1,192,791	135,443	46,802	108,714	96,508	127,364
2003		210,508	174,116	1,212,518	127,901	47,667	105,452	99,141	125,097
2004		209,708	164,761	1,232,244	120,360	48,532	102,190	101,775	122,831
2005		208,909	155,406	1,251,971	112,818	49,397	98,927	104,409	120,564
2006		208,109	146,051	1,271,697	105,276	50,262	95,665	107,042	118,297
2007		207,310	136,696	1,291,424	97,735	51,127	92,403	109,676	116,030
2008		206,511	127,341	1,311,150	90,193	51,992	89,141	112,310	113,763
2009		205,711	117,986	1,330,877	82,652	52,857	85,878	114,943	111,496
2010		204,528	117,151	1,323,102	82,398	52,625	84,965	114,382	111,140
2011		204,081	116,944	1,321,347	83,283	52,643	87,511	114,296	111,248
2012		203,535	116,681	1,319,306	84,551	52,647	90,357	114,259	111,476
2013		203,380	116,570	1,317,847	86,271	52,647	93,256	114,218	111,710
2014		203,076	116,366	1,316,306	87,702	52,603	96,158	114,183	111,992

表 6.2.5 臺灣地區森林主產物伐採量

年度	面積（公頃）		林木材積（立方公尺）					竹類（支）
	林地	竹林	天然針葉林	天然闊葉林	人工針葉林	人工闊葉林	薪材	
1990	1,917	1,479	6,292	54,207	85,517	17,481	39,715	5,795,941
1991	1,046	1,683	4,191	26,244	64,436	7,885	23,303	4,318,917
1992	1,036	781	5,428	13,662	69,813	7,361	22,059	3,312,710
1993	575	675	4,457	2,724	50,683	5,245	8,625	2,176,352
1994	439	532	3,182	3,735	36,679	6,396	6,136	1,907,854
1995	625	587	5,536	349	35,440	4,876	16,976	2,161,413
1996	500	293	4,515	328	38,665	3,154	9,700	2,323,761
1997	448	184	4,597	309	32,831	3,071	11,365	1,232,119
1998	458	260	5,679	197	27,349	3,262	13,042	1,508,053
1999	393	493	3,177	964	22,267	6,540	9,997	1,841,708
2000	632	383	0	3,507	22,500	4,039	5,134	1,716,292
2001	405	124	0	7,414	21,171	11,741	7,533	558,927
2002	624	390	0	3,642	26,019	24,010	7,388	1,268,416
2003	739	455	128	771	56,764	9,597	18,282	2,174,351
2004	705	333	0	128	37,968	20,616	12,089	1,572,353
2005	500	342	2	533	35,393	16,649	7,481	1,694,291
2006	587	622	72	252	35,214	17,127	10,931	3,046,946
2007	326	339	1	145	40,253	15,182	11,638	2,864,482
2008	180	465	2	30	36,596	7,140	7,340	2,509,139
2009	158	438	0	760	32,058	7,774	3,690	3,266,805
2010	159	562	6	1,432	19,115	11,933	313	3,326,833
2011	142	370	117	131	27,674	8,216	774	1,875,466
2012	151	378	70	194	37,189	5,971	2,807	1,772,876
2013	170	285	25	400	26,461	7,516	7,817	1,532,111
2014	155	394	11	337	51,350	6,325	4,247	2,427,516

資料來源：林務局之林業統計

法以統計之方式估算不確定性，且其為國家統計資料，是唯一的資料來源，因此此部分的不確定性暫時予以忽略。在此背景之下，臺灣林地移除量的不確定性分析以轉換係數為主要對象（包含碳轉換係數與年生長量）。

進行不確定性分析有四個主要步驟。首先，整理碳轉換係數文獻中的研究成果與標準差或標準誤，不確定性是由平均值和標準差所推估（95% 信賴區間），以下列式 14 與式 15 計算每篇文獻各樹種之不確定性；第二步則視取平均與中位數的過程為不同變量相加，採用誤差傳遞法的加法規則（式 16）計算出各係數之不確定性；因估算林地移除量時，各個轉換係數為相乘的關係，故依據誤差傳遞法乘法規則（式 17）來合併係數之不確定性；最後，國家林業部門溫室氣體清冊是將各林型排放 / 移除的移除量相加，因此再以加法規則合併各林型不確定性，再合併林地維持林地與土地轉變為林地兩部分之不確定性。

$$SD = \sqrt{\frac{\sum(\chi_i - \bar{\chi})^2}{n - 1}} \quad (14)$$

SD 標準差
 χ_i 第 i 筆 CF 數值
 $\bar{\chi}$ 文獻收集之 CF 平均值
 n CF 數據筆數

$$U = \frac{SD \times 1.96}{\bar{\chi}} \times 100\% \quad (15)$$

$$U = \sqrt{\frac{(U_1 \times E_1)^2 + (U_2 \times E_2)^2 + \dots + (U_n \times E_n)^2}{E_1 + E_2 + \dots + E_n}} \quad (16)$$

U_1, U_2, U_n 不同變量的不確定性
 E_1, E_2, E_n 不同變量

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2} \quad (17)$$

表 6.2.6 受干擾影響的森林面積與損失材積

年	次數 *	面積 (公頃)	林木材積 (立方公尺)	竹類 (支)
1990	352	4,031	3,395	0
1991	362	1,125	1,357,423*	163,220
1992	292	401	2,235	20,154
1993	359	1,251	9,944	24,196
1994	441	3,860	5,246	264,490
1995	336	546	1,873	105,600
1996	511	7,519	43,984	6,255,093
1997	305	2,969	14,572	2,330,329
1998	252	1,642	20,233	3,131,407
1999	429	2,440	75,991	2,692,378
2000	272	4,353	103,385	1,966,948
2001	263	1,621	645,328**	252,545
2002	347	742	3,670	35,657
2003	491	800	624	27,448
2004	251	1,006	26,764	394,651
2005	219	3,133	65,112	2,013,673
2006	210	158	2,017	99,200
2007	231	1,049	37,751	257,027
2008	317	284	4,182	26,962
2009	455	5,834	1,563,005***	2,486,573
2010	419	97	5,202	1,608
2011	476	33	297	731
2012	445	10	109	0
2013	413	15	411	750
2014	380	30	494	0

資料來源：行政院農業委員會林務局之林業統計

* 1991 年於南投縣信義鄉及嘉義縣阿里山鄉塔塔加地區發生森林大火，範圍延燒約 300 多公頃，致林木損失材積量大。

** 2001 年除丹大、梨山、雪山東峰及陽明山國家公園所發生之五次森林大火外，尚發生 59 次小火警，火災受損面積廣達 395 公頃，森林資源損失慘重。

*** 2009 年莫拉克風災對臺灣中、南部造成嚴重災害，尤其在高雄、屏東部分地區 3 天內降下超過 2,500 公釐的雨量，產生約 125 萬公噸漂流木，致林木損失材積量大。

各林型中以人工針葉林與天然針葉林的不確定性最高，分別為 35.05% 與 34.78%，主要是因為針葉樹之 R 值採用 IPCC 預設值，有較高之不確定性；又以天然闊葉林之不確定性最低，為 18.41%。竹林則因為大多數係數採用的文獻並未註明標準差或標準誤，無法估算不確定性，暫時忽略不計，因而促使不確定性低。

計算林地維持林地移除量變化時，是將各林型之移除量相加，因此計算不確定性分析時，先以誤差傳遞法之加法規則，合併各林型係數之不確定性，再合併生物量年碳

儲存增加量、伐採損失移除量、薪材收穫損失移除量與干擾損失移除量之不確定性。計算結果如下表所示，各年度林地維持林地移除量之不確定性界於 7.21 % 至 8.89 % 之間。

(2) 時間序列一致性

活動數據主要採自全國森林資源調查數據，然全國森林資源調查並非每年進行調查，為符合時間序列的一致性，參考 IPCC 2006 指南，兩次調查間的年度以內插法推得各林型。又因第三次與第四次林資源調查相隔久遠（約 18 年），考量到調查技術之提升，以外推法可能會有高

表 6.2.7 臺灣 1990 至 2014 年林地維持林地之移除量變化

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年	生物量生長之年 碳貯存增加量 (ΔC_G)	生物量年碳儲存損失量 ΔC_L			移除量變化 (ΔC)	移除量變化 (ΔCO_2)
		商用木材伐採所 引起的年碳貯存 減少量 ($L_{wood-removals}$)	薪材收穫所引起的年 碳貯存減少量 ($L_{fuelwood}$)	干擾等其他因素所引 起的年碳貯存減少量 ($L_{disturbance}$)		
1990	-6,519	142.93	21.25	1.43	-6,353	-23,295
1991	-6,519	96.25	12.47	573.90	-5,836	-21,399
1992	-6,467	77.84	11.80	1.21	-6,376	-23,380
1993	-6,416	49.73	4.62	4.51	-6,357	-23,308
1994	-6,364	42.73	3.28	5.72	-6,312	-23,145
1995	-6,313	43.81	9.08	2.19	-6,257	-22,944
1996	-6,261	45.70	5.19	101.65	-6,108	-22,398
1997	-6,209	29.41	6.08	37.11	-6,137	-22,502
1998	-6,158	31.80	6.98	50.14	-6,069	-22,253
1999	-6,106	36.12	5.35	67.79	-5,997	-21,989
2000	-6,055	33.60	2.75	69.69	-5,949	-21,812
2001	-6,003	24.03	4.03	275.16	-5,700	-20,900
2002	-5,952	39.46	3.95	2.02	-5,906	-21,656
2003	-5,900	51.51	9.78	0.63	-5,838	-21,406
2004	-5,848	43.39	6.47	16.52	-5,782	-21,201
2005	-5,797	42.33	4.00	54.19	-5,696	-20,887
2006	-5,745	60.38	5.85	2.17	-5,677	-20,815
2007	-5,694	58.34	6.23	19.32	-5,610	-20,570
2008	-5,642	48.16	3.93	2.12	-5,588	-20,489
2009	-5,591	57.60	1.97	691.37	-4,840	-17,746
2010	-5,561	57.10	0.17	2.21	-5,502	-20,174
2011	-5,566	37.73	0.41	0.13	-5,528	-20,269
2012	-5,573	38.04	1.50	0.05	-5,534	-20,290
2013	-5,584	32.54	4.18	0.18	-5,547	-20,338
2014	-5,593	51.23	2.27	0.21	-5,537	-20,311

註： $\Delta C = \Delta C_G - (L_{WOOD-REMOVALS} + L_{fuelwood} + L_{disturbance})$

表 6.2.8 碳轉換係數不確定性分析結果

林型 \ 係數	BCEF/BEF	R	CF	年生長量	合併
天然針葉林	2.18	32.30	2.89	12.37	34.78
天然針闊葉混淆林	7.62	16.88	1.80	15.83	24.43
天然闊葉林	11.79	13.06	2.13	5.00	18.41
人工針葉林	2.18	32.30	2.89	13.13	35.05
人工針闊葉混淆林	7.62	16.88	1.80	20.08	27.38
人工闊葉林	11.79	13.06	2.13	24.93	30.59
木竹混淆林	7.62	16.88	1.80	24.38	30.67
竹林	-	-	2.15	-	2.15

估變動之情形，故第四次森林資源調查（2009 年以後）使用替代數據一崩場地圖層，來估算林地面積，待未來得到下一次的森林資源調查數據（或其他全國林地面積數據），再以内插法修正數據。

4 林業移除量的 QA/QC 及查證

查證的定義：「查證指在清冊規劃、發展及完成後，收集可能有助於建立可信度的活動資料和程序步驟，以供清冊的查證程序使用。」。換言之，「查證（Verification）」是對清冊報告中的排放 / 移除量作定期審查，以建立清冊可信度。查證過程應做為品質保證（QA）和品質控制（QC）程序的一部分，以促進發展國家溫室氣體排放清冊的透明度、一致性、可比較性、完整性和準確性。

目前已完成蒐集 IPCC 相關查證方法學，後續將依前開規範及步驟進行相關查證。另配合由行政院環境保護署整合各部會就主管產業提報溫室氣體排放或移除量，完成估算林業部門 1990 年至 2014 年森林及其他木質生物蓄積量的淨改變對於溫室氣體減量貢獻，業經 104 年 5

月 6 日、20 日林業、農業部門專家研商會議審議通過，業依委員所提有關在林木生長移除量的計算上應扣除天然災害導致崩塌、伐採收穫面積等意見修正報告數據。

5. 林業移除量的重新計算

林業部門溫室氣體清冊中，林地維持林地使用之活動數據主要採自全國森林資源調查數據，過去提報之林業清冊報告因僅有第三次全國森林資源調查成果，故主要採用該數據，再搭配各年度崩場地圖層與伐採面積，扣除後得到歷年林地面積。而第四次森林資源調查的成果已於 2015 年整理完成，獲得最新全島森林林型分布面積及其蓄積資訊，本清冊報告業全數引用最新之分析結果進行估算，提高林業移除量數據之精確性。

過去提報林業清冊報告，年生長量是採用文獻數據，取自林務局於 1982 年出版的「臺灣林木資源之生長及枯死」，因現有兩次森林資源調查的單位面積材積數據，故藉此估算年平均生長量，以更加符合兩次調查間林木生長之狀況。

表 6.2.9 1990 至 2014 年林地維持林地不確定性

(單位：%)

年	生物量生長之年碳貯存增加量 (ΔC_G)	生物量年碳儲存損失量 ΔC_L			合計
		商用木材伐採所引起的年碳貯存減少量 ($L_{\text{wood-removals}}$)	薪材收穫所引起的年碳貯存減少量 (L_{fuelwood})	干擾等其他因素所引起的年碳貯存減少量 ($L_{\text{disturbance}}$)	
1990	7.80	7.53	17.72	18.61	7.61
1991	7.80	7.63	17.72	18.54	7.21
1992	7.80	9.63	17.72	14.49	7.70
1993	7.82	10.78	17.72	17.28	7.75
1994	7.84	9.30	17.72	7.30	7.77
1995	7.86	8.74	17.72	6.83	7.79
1996	7.89	8.98	17.72	3.82	7.71
1997	7.93	11.82	17.72	3.56	7.84
1998	7.98	9.31	17.72	3.63	7.86
1999	8.03	7.12	17.72	8.86	7.89
2000	8.09	7.36	17.72	11.66	7.95
2001	8.15	12.00	17.72	18.38	7.80
2002	8.23	11.32	17.72	14.25	8.17
2003	8.31	11.78	17.72	7.90	8.22
2004	8.40	11.48	17.72	12.72	8.30
2005	8.50	10.46	17.72	9.48	8.35
2006	8.60	7.47	17.72	7.41	8.50
2007	8.72	8.21	17.72	15.32	8.59
2008	8.84	8.29	17.72	15.47	8.76
2009	8.97	6.30	17.72	17.72	8.14
2010	8.96	4.92	17.72	18.43	8.87
2011	8.95	8.35	17.72	17.27	8.89
2012	8.93	10.45	17.72	18.61	8.87
2013	8.91	9.17	17.72	17.59	8.86
2014	8.90	10.61	17.72	18.61	8.81

另外，為提升本土碳轉換係數數值準確度，蒐集國內相關文獻研究，並於 2015 年 3 月 19 日與 7 月 1 日邀請專家學者召開碳轉換係數之專家諮詢會議與工作委員會，重新商討碳轉換係數之採用方法與數據，確認各林型之碳轉換係數引用原則，研究區域為全國性文獻為優先，若無全國性文獻，其次選用地區性研究報告，最後才選擇單一地點之文獻。本清冊報告業採用前揭係數作為移除量估算之依據，提高估算之準確性。

6. 特定排放源的改善計畫

- (1) 活動數據有關各林型或土地利用型圖，為土地使用變遷的依據，亦為森林碳吸存量的估算基礎，後續將繼續研析各國有關森林面積活動數據之調查產製方式，配合林務局森林資源調查成果土地覆蓋型圖資更新維護作法，搭配衛星影像監測或國土利用調查成果更新維護資料，研議適當之林業溫室氣體清冊年度森林面積活動數據產製方式。
- (2) 查證過程為品質保證 (QA) 和品質控制 (QC) 程序的一部分，以促進發展國家溫室氣體排放清冊的透明度、一致性、可比較性、完整性和準確性。目前已完成蒐集 IPCC 相關查證方法學，後續將依前開規範及步驟進行相關查證。

6.2.2 其他土地轉變為森林 (4.A.2)

1. 排放源及匯分類的敘述

土地轉變為森林之碳庫 (carbon pool) 與林地維持林地相同，區分為生物量 (Biomass) (包含地上部及地下部生物量)、死有機質 (Dead organic matter) (包含死木與枯落物)、土壤 (Soils) (包含土壤有機質) 等 3 大類。各類碳庫說明如表 6.2.1 所示。

2. 方法學議題：

(1) 計算方法：

A. ΔC_B 生物量 (Biomass) 碳貯存量的變化

有關生物量碳貯量變化，採用前 6.2.1.2 整理公式 1 至式 13 計算。

B. ΔC_{DOM} 死有機物質 (Dead organic matter) 碳貯存量變化

採用層級一方法，對於這些碳庫中的碳貯存量變化並不明顯，因此其預設值可假設為零，即投入與損失相抵，因此死有機質碳貯存量變化淨值為零。當國家於報告年間沒有經歷森林類型、擾動或經營體制的重大轉變，這是個安全的假設。

C. ΔC_{Soils} 土壤 (Soils) 碳貯存量變化

上述假設可同樣應用於土壤碳庫，淨碳儲存變化量為零。

表 6.2.10 IPCC 查證方法比較

方法	方法一 其他成果比較法	方法二 更高層級比較法	方法三 直接測量法	方法四 遙測法	方法五 模型法
土地面積	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	不適用	合適	不適用
碳庫					
地上部生物量	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	合適 (需要地面數據)	合適 (迴歸、生態系及生長模式)
地下部生物量	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	不適用	合適 (迴歸、生態系及生長模式)
死木	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	不適用	適用 (生態系統及調查基準的模式)
枯落物	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	不適用	適用 (生態系統及調查基準的模式)
土壤有機物質	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	不適用	適用 (生態系統及調查基準的模式)
非二氧化碳溫室氣體 Non- 二氧化碳	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	不適用	合適 (生態系統模式)
轉換係數	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	不適用	合適 (生態系統模式)
基於活動 / 土地的報告					
林地、草地、農地、 其他土地利用	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	合適，特別在辨別土地利用 及其之間的轉變	合適，數據密集型，當不 允許直接測量或遙測時， 可作為替代的方法
造林、再造林、毀林、 專案 (project)	可獲得數據，合適	可獲得數據，合適	合適 成本高	合適，特別在辨別土地利用 及其之間的轉變	不實際

(2) 轉換係數

碳轉換係數方面，基本比重(D)、生物量擴展係數(BEF_I、BEF_R)、根莖比(R)及乾物質碳含量比例(CF)採用與林地維持林地相同之數值，如表 6.2.2 所示。

材積生長量則依林俊成等人(2002)²³對全民造林運動碳吸存潛力之評估結果，以樟樹、臺灣檫、相思樹、光臘樹等四種樹種之平均生長量做為闊葉林造林材積計算基準，而以肖楠、柳杉、杉木等三種樹種之平均生長量做為針葉林造林材積計算基準，針闊葉混淆林平均生長量則為針葉林及闊葉林之平均值。竹林的平均生長量則依林裕仁等(2011)²¹的研究結果，平均每公頃竹椰年生長量為 13.84 公噸。

(3) 活動數據

1992 至 2009 年土地轉變為林地的總面積以第三次森林資源調查到第四次森林資源調查間增加的森林覆蓋面積為主，並搭配林業統計造林資料輔助林型分類，扣

除林業統計 1992 至 2009 年之造林面積，剩餘增加之面積則視為天然更新，平均分配至各林型計算；其餘年度以林業統計的造林面積為主。各年度土地轉變為林地之面積如表 6.2.11 所示。

(4) 碳移除量

1990 至 2014 年「其他土地轉變為林地」年移除量變化結果如表 6.2.12，主要隨著新植造林面積的累積，碳移除量逐年增加，至 2014 年二氧化碳移除量已達 116.6 萬公噸。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關土地轉變為林地之不確定性分析，採用前 6.2.1.3 整理公式 14 至式 17 計算。

以誤差傳遞法之加法原則，將各林型轉換係數之不確定性依排放量進行合併，估算各年度土地轉變為林地之不確定性如表 6.2.13，介於 12.24% 至 16.17% 之間。

表 6.2.11 1990 至 2014 年土地轉變為林地面積

(單位：公頃)

年	針葉林		針闊葉混淆林		闊葉林		竹林	合計
	林業統計面積	總面積	林業統計面積	總面積	林業統計面積	總面積	林業統計面積	
1990	959	959	67	67	2,696	2,696	161	3,883
1991	1,350	1,350	52	52	3,002	3,002	252	4,656
1992	1,780	1,817	48	85	2,975	3,012	279	5,191
1993	1,481	1,518	0	37	2,999	3,036	303	4,893
1994	1,005	1,042	0	37	3,487	3,524	129	4,732
1995	614	651	0	37	2,832	2,869	112	3,669
1996	1,222	1,259	0	37	3,901	3,938	108	5,341
1997	1,709	1,746	0	37	3,438	3,474	100	5,357
1998	1,441	1,478	0	37	5,978	6,014	70	7,599
1999	1,516	1,553	2	39	6,653	6,690	129	8,411
2000	1,032	1,069	0	37	4,125	4,162	70	5,338
2001	796	833	0	37	4,068	4,105	70	5,045
2002	853	890	4	41	6,556	6,593	71	7,594
2003	492	529	31	68	6,717	6,754	45	7,396
2004	638	675	4	40	4,092	4,129	134	4,978
2005	62	99	0	37	1,477	1,514	57	1,707
2006	59	96	0	37	345	382	5	520
2007	313	350	0	37	818	855	5	1,246
2008	87	124	0	37	426	462	5	629
2009	671	708	0	37	2,595	2,632	1	3,378
2010	250	250	0	0	2,580	2,580	0	2,830
2011	291	291	0	0	6,807	6,807	1	7,099
2012	233	233	0	0	4,732	4,732	0	4,965
2013	424	424	0	0	2,210	2,210	0	2,634
2014	272	272	0	0	1,935	1,935	0	2,208

資料來源：林務局之林業統計

* 因 2005 年起停止全民造林政策致造林面積減少

23 林俊成、鄭美如、劉淑芬、李國忠，全民造林運動二氧化碳吸存潛力之經濟效益評估，台灣林業科學 17 (3)：311-321，2002。

有關 1990 至 2014 年森林資源整體年移除量之不確定性如表 6.2.14 所示，為 7.18% 至 8.44% 之間。

(2) 時間序列一致性

活動數據主要採自全國森林資源調查數據，以兩次資源調查間增加的面積為土地轉變為林地面積，然全國森林資源調查並非每年進行調查，為符合時間序列的一

致性，參考 IPCC 2006 指南，以內插法將總面積分配至兩次調查間的年度，另外再搭配歷年林業統計的造林面積分類林型。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

查證的定義：「查證指在清冊規劃、發展及完成後，收集可能有助於建立可信度的活動資料和程序步

表 6.2.12 1990 至 2014 年土地轉變為森林之年移除量變化

(單位：千公噸)

年	生物量年碳儲存增加量 ΔC_G				碳移除量變化 ΔC	二氧化碳碳移除量變化 ΔCO_2
	針葉林	針闊葉混淆林	闊葉林	竹林		
1990	-3.58	-0.36	-18.66	-2.16	-25	-91
1991	-3.58	-0.36	-18.66	-2.16	-25	-91
1992	-5.77	-0.36	-25.43	-5.53	-37	-136
1993	-8.76	-0.62	-31.71	-9.26	-50	-185
1994	-9.43	-0.51	-40.34	-13.32	-64	-233
1995	-9.46	-0.61	-53.53	-15.05	-79	-288
1996	-9.56	-0.74	-62.35	-14.39	-87	-319
1997	-13.09	-0.85	-81.99	-12.46	-108	-397
1998	-17.71	-1.02	-92.90	-10.07	-122	-446
1999	-20.43	-1.17	-124.33	-6.95	-153	-561
2000	-24.86	-1.35	-148.09	-6.94	-181	-665
2001	-26.87	-1.47	-151.62	-6.37	-186	-683
2002	-28.87	-1.60	-170.57	-5.87	-207	-759
2003	-31.20	-1.74	-206.72	-5.48	-245	-899
2004	-32.59	-2.00	-231.72	-5.15	-271	-995
2005	-36.08	-2.01	-238.00	-5.22	-281	-1,031
2006	-36.33	-2.15	-241.72	-5.05	-285	-1,046
2007	-38.35	-2.27	-249.74	-4.18	-295	-1,080
2008	-40.48	-2.40	-265.28	-3.30	-311	-1,142
2009	-40.64	-2.51	-271.98	-2.77	-318	-1,166
2010	-43.67	-2.61	-290.83	-0.99	-338	-1,240
2011	-40.66	-2.35	-284.51	-0.23	-328	-1,202
2012	-38.51	-2.26	-308.92	-0.16	-350	-1,283
2013	-34.34	-2.06	-298.00	-0.10	-334	-1,226
2014	-31.80	-1.99	-284.12	-0.03	-318	-1,166

註：資料總計因小數點取捨，取與各林型加總有些會有差異。

表 6.2.13 1990 至 2014 年土地轉變為林地年移除量變化不確定性

(單位：%)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
生物量年碳儲存增加量 ΔC_G	14.16	14.16	13.17	12.52	12.24	12.69	13.19	13.97	14.33	15.05	15.15	15.16	15.30
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
生物量年碳儲存增加量 ΔC_G	15.51	15.62	15.56	15.58	15.61	15.68	15.72	15.81	15.91	16.05	16.14	16.17	

表 6.1.4 1990 至 2014 年森林資源整體年除移量變化不確定性

(單位：%)

年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
林地維持林地	7.61	7.21	7.70	7.75	7.77	7.79	7.71	7.84	7.86	7.89	7.95	7.80	8.17
其他土地轉變為林地	14.16	14.16	13.17	12.52	12.24	12.69	13.19	13.97	14.33	15.05	15.15	15.16	15.30
合計	7.58	7.18	7.65	7.69	7.70	7.70	7.60	7.71	7.71	7.70	7.73	7.57	7.91
年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
林地維持林地	8.22	8.30	8.35	8.50	8.59	8.76	8.14	8.87	8.89	8.87	8.86	8.81	
其他土地轉變為林地	15.51	15.62	15.56	15.58	15.61	15.68	15.72	15.81	15.91	16.05	16.14	16.17	
合計	7.92	7.96	7.99	8.13	8.20	8.33	7.70	8.41	8.44	8.40	8.40	8.38	



驟，以供清冊的查證程序使用。」。換言之，「查證（Verification）」是對清冊報告中的排放/移除量作定期審查，以建立清冊可信度。查證過程應做為品質保證（QA）和品質控制（QC）程序的一部分，以促進發展國家溫室氣體排放清冊的透明度、一致性、可比較性、完整性和準確性。

5. 特定排放源的重新計算

過去林業部門溫室氣體清冊中，因僅有一次全國森林資源調查數據，故土地轉變為林地之活動數據是採用歷年林業統計的造林面積。而第四次森林資源調查的成果已於2015年整理完成，與第三次比較，兩次資源調查間增加的面積視為土地轉變為林地之活動數據（並搭配歷年林業統計的造林面積分類林型），以此重新計算活動數據。第四次調查與第三次調查比較，森林面積增加約8萬多公頃，主要增加區位在國有林事業區外之山坡地與平地。


6. 特定排放源的改善計畫

- (1) 活動數據有關土地轉變為林地部分，林務局已規劃森林資源調查成果土地覆蓋型圖資更新維護作法，後續可透過航照圖圈繪變異區域，作為土地轉變為林地面積基礎。
- (2) 查證過程為品質保證（QA）和品質控制（QC）程序的一部分，以促進發展國家溫室氣體排放清冊的透明度、一致性、可比較性、完整性和準確性。目前已完成蒐集IPCC相關查證方法學，後續將依前開規範及步驟進行相關查證。

參考文獻

1. IPCC, 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventory, 2006.
2. 王兆桓、劉知妤，森林蓄積量與生物量轉換模式之建立，2006 森林碳吸存研討會論文集：200-215，2006。
3. 王兆桓，森林蓄積量與生物量轉換模式之建立（3/3），2008。
4. 王義仲、陳周宏，台灣產竹種工藝利用價值之評估（I），林產工業 14（1）：82-94，1995。
5. 王義仲，竹林生物量調查回顧與展望，2006 森林碳吸存研討會論文集：167-188，2006。
6. 呂錦明、陳財輝，桂竹之林分構造及生物量一桶頭一桂竹林分之例。林業試驗所研究報告季刊 7（1）：1-13，1992。

7. 林俊成、鄭美如、劉淑芬、李國忠，全民造林運動二氧化碳吸存潛力之經濟效益評估。台灣林業科學 17（3）：311-321，2002。
8. 行政院農業委員會林務局，第三次台灣森林資源及土地利用調查，1995。
9. 林國銓、何淑玲，由生物量推估台灣不同林分之碳儲存量，森林經營對二氧化碳吸存之貢獻研討會論文集：97-108，2005。
10. 林國銓、杜清澤、黃菊美、王巧萍，亞熱帶闊葉林林木粗根生物量和養分含量之估算，臺灣林業科學 21（2）：155-166，2006。
11. 林國銓、杜清澤、黃菊美，苗栗地區相思樹和木油桐人工林碳和氮累積量及生產量之估算，中華林學季刊 40（2）：201-218，2007。
12. 林國銓、杜清澤、黃菊美，台東地區相思樹與楓香兩人工林碳累積量，林業研究季刊 31（3）：55-68，2009。
13. 林國銓、杜清澤、黃菊美，光蠟樹人工林碳貯存量和吸存量之估算，中華林學季刊 43（2）：261-276，2010。
14. 林國銓、洪富文、游漢明、馬復京。福山試驗林闊葉林生態系生物量與葉面積指數的累積與分布。林業試驗所研究報告季刊 9（4）：299-315，1994。
15. 林國銓、黃菊美、杜清澤，檉木人工林造林木碳貯存量和吸存量之估算，國家公園學報 18（2）：45-58，2008。
16. 林裕仁、王秋嫻、Sara Wu，四種臺灣竹材碳轉換係數之分析，臺灣林業科學 26（4）：341-355，2011。
17. 林裕仁、劉瓊霏、林俊成，臺灣地區主要用材比重與碳含量測定，臺灣林業科學 17（3）：291-299，2002。
18. 柯淑惠，台灣檉木人工林生物量及碳儲存量之研究，國立中興大學森林學系碩士論文。台中，2006。
19. 許原瑞、洪昆源、王巧萍、吳孟鈴、邱祈榮，2006 海岸林分生物量調查規劃，2006 年森林碳吸存研討會論文集：217-235，2006。
20. 許原瑞，桉樹類的生物量與碳蓄積量，97 年度森林碳管理研討會論文集：17-29，2008。
21. 陳財輝、呂錦明，苗栗海岸砂丘木麻黃人工林之生長及林分生物量，林業試驗所研究報告季刊 3（1）：333-343，1988。
22. 陳財輝、許博行、張峻德，四湖木麻黃林分生物量及養分量聚集，臺灣林業科學 13（4）：325-349，1998。



第七章 廢棄物部門 (CRF SECTOR 5)



7.1 部門概述


7.2 固體廢棄物處理

7.3 固體廢棄物之生物處理

7.4 廢棄物之焚化與露天燃燒

7.5 廢水處理與放流

7.6 廢棄物部門溫室氣體排放不確定性分析



第七章 廢棄物部門 (CRF SECTOR 5)

7.1 部門概述

依據 2006 IPCC 國家溫室氣體排放清冊指南 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 以下簡稱 2006 IPCC 指南), 廢棄物部門之溫室氣體排放源範疇包括: 固體廢棄物處理、廢棄物生物處理、廢棄物焚化與露天燃燒、廢水處理排放及其他廢棄物管理衍生之溫室氣體排放, 如表 7.1.1 所示, 主要計算規定如下:

- 一、凡涉及能源部門之內容, 如回收掩埋場沼氣進行發電及大型焚化爐加入發電機制, 此部分屬燃料燃燒能源利用, 依 IPCC 指南建議, 其溫室氣體排放應列於能源部門, 從廢棄物部門扣除, 以避免部門間重複計算。
- 二、屬生物成因 (Biogenic origin) 之單元, 單元產生之二氧化碳不納入排放量計算, 由於廢棄物在生物界中就會被細菌分解成二氧化碳, 因此不納入計算,

如廢水廠好氧處理產生之二氧化碳。

依據清冊指南規範, 掩埋場回收沼氣發電之甲烷排放及大型焚化爐加入發電機制之溫室氣體排放皆不納入廢棄物部門, 而歸屬能源部門。以 2006 IPCC 指南建置更新廢棄物部門歷年 (1990~2014) 溫室氣體排放量, 如表 7.1.2 及圖 7.1.1 所示。

其中甲烷與氧化亞氮當量換算係依據 IPCC 第 4 次評估報告溫暖化潛勢值 (Global Warming Potential, 以下簡稱 GWP) (表 7.1.3), 甲烷 GWP 為 25, 而氧化亞氮 GWP 為 298。

臺灣廢棄物部門歷年排放量以 1999 年為最大, 主要以廢棄物掩埋為主, 隨著環保政策之演進, 改以資源回收與焚化為主, 掩埋排放量逐年降低, 而生活污水則由於接管率逐年增加, 因此排放量亦逐年降低, 統計至 2014 年, 廢棄物部門排放量為 4,264.3 千公噸二氧化碳當量, 較 1990 年減少 53%。

2014 年廢棄物部門整體溫室氣體排放較 2013 年減少 4.9%。其中來自掩埋排放為 1,427.7 千公噸二氧化碳當量、生活污水排放為 1,625.8 千公噸二氧化碳當量、事

表 7.1.1 IPCC 指南廢棄物部門排放源分類

		排放分類定義	排放氣體
5.A	固體廢棄物處	✓ 甲烷由固體廢棄物掩埋場中之有機物質於厭氧狀態下經微生物分解而產生。 ✓ 二氧化碳亦會產生, 但此處僅列入由非生物或非有機廢棄物來源所產生之二氧化碳。	二氧化碳、甲烷、氧化亞氮
	5.A.1 妥善管理之廢棄物掩埋場	妥善管理之廢棄物掩埋場必須具備受控制的廢棄物放置地點, 且包含以下其中一種: 覆蓋材料、機械壓實、或廢棄物整平等措施。	甲烷、氧化亞氮
	5.A.2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	不屬於以上妥善管理之廢棄物掩埋場之其他形式廢棄物掩埋場。	甲烷、氧化亞氮
	5.A.3 其他	其他廢棄物掩埋場。	甲烷、氧化亞氮
5.B	廢棄物生物處理	廢棄物堆肥與其他生物處理; 沼氣發電設施的排放, 應列於能源部門 (1.A.4) 下。	二氧化碳、氧化亞氮
5.C	廢棄物焚化與露天燃燒	✓ 廢棄物焚化, 但不包括廢棄物發電設備。 ✓ 廢棄物燃燒發電所產生之排放應列於能源部門 (1.A)。 ✓ 而農作物、森林與草地等燃燒, 所產生的排放應列於農業部門 (3.C)。	二氧化碳、甲烷、氧化亞氮
	5.C.1 廢棄物焚化	於可控制之焚化設施中燃燒的固體廢棄物。	二氧化碳、甲烷、氧化亞氮
	5.C.2 廢棄物露天燃燒	露天或露天垃圾場中的廢棄物燃燒。	二氧化碳、甲烷、氧化亞氮
5.D	廢水處理及排放	✓ 甲烷與氮氧化物由有機物於污水設備與食物處理及其他工業設備之廢水處理過程中經細菌厭氧分解所產生。 ✓ 氧化亞氮亦可能由污水處理與人類的排泄物所釋出。 ✓ 甲烷排放包含於事業廢水及生活與住商污水類別, 氮氧化物排放包含於生活與住商污水類別。	二氧化碳、甲烷、氧化亞氮
	5.D.1 生活及住商污水	✓ 住宅與商業來源之液態廢棄物與污泥處理 (包括人體排泄物) 透過: 污水收集與處理、露天廁所、污水池或逕流釋放。 ✓ 由人體排泄物排放至環境水之氧化亞氮亦包含於此類別。	甲烷、氧化亞氮
	5.D.2 事業廢水	✓ 自於工業製程之液態製程之液體廢棄物及污泥處理: 食物處理、紡織業、紙漿及造紙業。 ✓ 此類別可能包括廢水收集與處理、廢水池或逕流釋放。 ✓ 排放到民用污水系統的事業廢水, 應納入 5.D.1 下。	甲烷、氧化亞氮
5.E	其他	其他廢棄物處理活動所釋放出之溫室氣體; 如醫療廢棄物、有害廢棄物與農業廢棄物等。	二氧化碳、甲烷、氧化亞氮



表 7.1.2 廢棄物部門 1990 至 2014 年溫室氣體排放量

(單位:千公噸二氧化碳當量)

年	廢棄物掩埋甲烷產生量	生活與住商廢水甲烷產生量	生活與住商廢水氧化亞氮產生量	事業廢水甲烷產生量	焚化爐二氧化碳產生量	焚化爐氧化亞氮產生量	堆肥甲烷產生量	堆肥氧化亞氮產生量	廢棄物部門溫室氣體排放量
1990	5,831.8	2,176.3	284.5	730.7	20.5	1.1	11.3	10.1	9,066.2
1991	5,917.4	2,198.1	283.8	863.7	8.3	0.4	0.5	0.5	9,272.6
1992	5,928.2	2,218.1	293.8	896.4	65.0	3.6	0.8	0.7	9,406.6
1993	6,322.9	2,237.7	307.4	862.1	63.1	3.5	0.5	0.4	9,797.5
1994	7,060.8	2,256.1	307.5	878.5	110.1	5.8	0.1	0.1	10,619.0
1995	7,719.3	2,274.2	315.5	905.1	397.9	18.2	0.6	0.6	11,631.4
1996	8,080.1	2,288.1	318.1	960.9	386.6	19.1	0.3	0.2	12,053.4
1997	8,212.3	2,303.0	331.7	937.7	104.9	3.8	1.4	1.3	11,896.1
1998	8,371.8	2,285.5	315.2	898.6	116.6	5.7	0.1	0.0	11,993.5
1999	8,596.2	2,174.7	324.2	867.6	65.0	3.2	1.9	1.7	12,034.6
2000	8,512.4	2,081.1	322.4	834.9	259.0	8.0	0.3	0.2	12,018.4
2001	7,732.4	2,054.8	310.0	836.5	539.9	30.0	0.0	0.0	11,503.7
2002	7,214.1	2,020.3	321.3	844.1	612.1	26.3	0.4	0.3	11,039.0
2003	6,675.3	2,000.6	326.9	929.0	417.3	23.9	2.2	2.0	10,377.1
2004	6,100.9	1,938.8	313.8	879.7	512.4	23.1	6.7	6.0	9,781.3
2005	5,525.2	1,879.5	313.6	935.1	347.8	27.4	9.8	8.7	9,047.0
2006	4,930.2	1,820.9	310.0	936.2	469.6	30.5	11.3	10.1	8,518.7
2007	4,378.8	1,750.7	317.8	1,047.7	562.1	29.7	14.5	12.9	8,114.1
2008	3,813.5	1,693.8	292.9	1,010.8	443.2	20.6	16.5	14.7	7,306.0
2009	3,246.1	1,619.4	302.0	1,022.2	154.3	8.6	17.9	16.0	6,386.7
2010	2,748.9	1,555.2	307.4	979.3	208.2	10.8	20.9	18.7	5,849.5
2011	2,352.5	1,480.5	313.3	1,004.4	115.0	7.2	26.2	23.4	5,322.2
2012	1,997.3	1,408.0	313.8	1,078.3	61.0	3.5	24.4	21.8	4,908.1
2013	1,688.3	1,356.5	305.7	1,084.8	4.5	0.3	22.6	20.2	4,482.8
2014	1,427.7	1,310.9	314.9	1,075.7	90.8	5.4	20.4	18.3	4,264.3




圖 7.1.1 臺灣廢棄物部門 1990 至 2014 年溫室氣體排放量趨勢

表 7.1.3 IPCC 評估報告溫暖化潛勢值

次數	二氧化碳	甲烷	氧化亞氮
1	1	11	270
2	1	21	310
3	1	23	296
4	1	25	298

業廢水排放為 1,075.7 千公噸二氧化碳當量、焚化排放為 96.2 千公噸二氧化碳當量、堆肥排放為 38.7 千公噸二氧化碳當量，其中排放氣體部分，甲烷為 3,834.9 千公噸二氧化碳當量、氧化亞氮為 338.6 千公噸二氧化碳當量、二氧化碳為 90.8 千公噸二氧化碳當量。

由於廢棄物掩埋排放計算採一階衰減法，且掩埋場回收甲烷發電及大型焚化爐焚化發電之排放列於能源部門，依據歷年溫室氣體排放計算結果，就排放來源比例之逐年趨勢，均以掩埋處理排放為最大宗（約 40% 以上），於 1999 年達到最大比例（約 71%），而 2000 年後逐年下降，於 2014 年約佔 33.5%。

生活污水與事業廢水排放量趨勢分別為逐年下降與變化和緩，然隨著垃圾處理以焚化為主，使掩埋處理量大幅下降，故生活污水與事業廢水年度排放比例約從 2000 年起逐年增加，至 2014 年較 2002 年約增加 34.5%；統計至 2014 年，排放來源比例分別為：掩埋處理排放比例約 33.5%、生活污水排放約 38.1%、事業廢水排放約 25.2%、焚化排放約 2.3%、堆肥排放約 0.9%。

有關排放物種逐年趨勢（如圖 7.1.2），長期均以甲烷為主（約 89% 至 97%），至 2014 年物種排放比例：甲烷約 89.9%，氧化亞氮約 7.9%，二氧化碳約 2.1%。

7.2 固體廢棄物處理（5.A）

針對一般廢棄物掩埋場分為「有管理」、「無管理」及「其他」三類，然依據 IPCC 定義「其他」為其他廢棄物掩埋場，臺灣並無其他廢棄物掩埋場，故無此部分排

放。臺灣『衛生掩埋場』屬「有管理、妥善管理」之掩埋場；『一般掩埋場』屬「未妥善管理」之掩埋場，含一般掩埋、堆置及其他之陸上垃圾處理場。

以下分別就妥善管理之廢棄物掩埋場（5.A.1）及未妥善管理之廢棄物掩埋場（5.A.2）分述其內容。

7.2.1 妥善管理之廢棄物掩埋場（5.A.1）

1. 排放源及匯分類的描述

依據 104 年中華民國環境保護統計年報之分類總結說明 103 年廢棄物之處理內容，關於垃圾處理方式可分為焚化、掩埋、堆置、資源回收、巨大垃圾回收再利用及廚餘回收等。103 年執行機關垃圾處理方式以資源回收占 44.92% 居首位，焚化占 43.28% 次之，廚餘回收占 9.78% 居第 3；其中掩埋又區分為「衛生」與「一般」掩埋。而妥善管理之廢棄物掩埋則屬衛生掩埋，排除一般掩埋與資源回收等項目。

妥善掩埋場之活動數據是參閱中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 89 年至 103 年，引用（四）廢棄物管理表 4-1 垃圾清理狀況，其中關於垃圾清運之「衛生掩埋」數據；及引用表 4-6 垃圾性質，其中關於可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」百分比數據。

2. 方法論議題

（1）計算方法

根據 2006 IPCC 指南統計方法，廢棄物掩埋產生甲烷




圖 7.1.2 臺灣廢棄物部門 1990 至 2014 年各類溫室氣體排放量趨勢



排氣量應該以一階衰減法計算，並須延長 50 年統計年限，根據指南所提供之計算表單，其建議回溯至 1950 年來進行統計分析，由於並未有 1990 年前之掩埋資料，IPCC 統計方法說明可依人口量與垃圾量之比例換算。有關計算順序說明如下：

- 依據 1990 年之人口量與掩埋量回推至 1950 年之掩埋量並以 1990 年之垃圾組成之成分作為 1950 至 1989 年之垃圾組成。
- 依據一階衰減法計算 1950 至 1989 年之累積可分解有機碳含量（累積 DOC）。
- 以 1989 年計算累積 DOC 結果，作為 1990 年前之累積 DOC 計算基準，再依據中華民國環境保護統計年報實際垃圾量與組成，根據一階衰減法計算 1990 年至 2014 年甲烷排放量。

廢棄物掩埋產生甲烷的計算公式，如公式 7.2.1.1 所示，主要定義了每年「可分解的 DOC 量（DDOCm）」參數，此參數則以一階衰減法估算，詳如公式 7.2.1.2 所示，在估算採用 DDOCm 時，2006 IPCC 指南表示至少需計算 50 年的處置資料，該時限為大部分通用處置作法和條件提供了一個可接受的精確結果，如果選擇了更短的時限，則應當證明沒有明顯低估排放。

公式 7.2.1.1：

$$\text{甲烷排放量 (Gg/yr)} = (\text{DDOCm decomp}_T \times F \times 16/12 - R) \times (1 - \text{OX})$$

DDOCm decomp_T = 第 T 年分解之 DDOCm (Gg/yr)

F：掩埋場產氣中甲烷之比例（預設為 0.5、體積比）
 16/12：分子量比例（CH₄/C）
 R：甲烷回收量（Gg/yr）
 OX：氧化係數（預設值為 0）
 DDOCm：可分解 DOC 量（Gg/yr），W×MCF×DOC×DOC_F
 W：廢棄物掩埋量（mass of waste deposited）（Gg/yr）
 MCF：甲烷修正係數（CH₄ correction factor for aerobic decomposition）
 DOC：可降解有機碳比例（Degradable Organic Carbon）
 DOC_F：DOC 可被分解之比例（fraction of DOC that can decompose）

公式 7.2.1.2：

$$\text{DDOCm}_{aT} = \text{DDOCm}_{dT} + (\text{DDOCm}_{aT-1} \times e^{-k})$$

$$\text{DDOCm decomp}_T = \text{DDOCm}_{aT-1} \times (1 - e^{-k})$$

T：年份
 DDOCm_{aT}：第 T 年末累積之 DDOCm (Gg/yr)
 DDOCm_{aT-1}：第 (T-1) 年末累積之 DDOCm (Gg/yr)
 DDOCm_{dT}：第 T 當年沉積之 DDOCm (Gg/yr)
 DDOCm decomp_T：第 T 年分解之 DDOCm (Gg/yr)
 k = 反應常數，k = ln(2) / t_{1/2}
 t_{1/2} = 半衰期時間 (yr)

(2) 排放係數

有關公式 7.2.1.1 與公式 7.2.1.2 的各項參數，說明如下：

A. MCF：甲烷修正係數（CH₄ correction factor for aerobic decomposition）

表 7.2.1 為 2006 IPCC 指南掩埋場型式與對應之甲烷修正係數，主要詳細說明各種掩埋場型式之處理情形，以及定義未分類者之 MCF 引用條件。依據 2006 IPCC 指南說明，設定妥善管理廢棄物掩埋場之甲烷修正參數值為 1.0。

B. DOC：可降解有機碳比例（Degradable Organic Carbon）

表 7.2.2 為 2006 IPCC 指南廢棄物之可降解有機碳含量以及提供化石碳占總碳之比例。可降解有機碳含量可作

表 7.2.1 IPCC 指南掩埋場型式與對應之甲烷修正係數（MCF）

固體廢棄物處置場所（SWDS）	MCF 預設值
管理 - 厭氧 ¹	1
管理 - 半有氧 ²	0.5
未管理 - 深（深層掩埋 ≥ 5 公尺）和（或）地下水水位高 ³	0.8
未管理 - 淺（淺層掩埋 < 5 公尺） ⁴	0.4
未分類之掩埋場 ⁵	0.6

1. 厭氧管理固體廢棄物處置場所：這些必須已控制廢棄物放置（即，將廢棄物指定到特定處置區域，一定程度的淨化控制和一定程度的火災控制），並至少要包括如下其中一個：(i) 覆蓋材料；(ii) 機械壓實；或 (iii) 廢棄物平整。
 2. 半有氧管理固體廢棄物處置場所：這些必須已控制廢氣物放置，並包括如下所有將空氣引入廢氣物層的以下結構：(i) 可滲透覆蓋材料；(ii) 濾液排放系統；(iii) 控制貯水量；和 (iv) 氣體通風系統。
 3. 未管理固體廢棄物處置場所 - 深和 / 或地下水水位高所有不符合管理 SWDS 標準的 SWDS，其深度大於或等於 5 米和 / 或高地下水水位近似地平面。後種情形相當於廢棄物充填內陸水域，如池塘、河流或濕地。
 4. 未管理淺固體廢棄物處置場所：所有不符合 SWDS 管理標準的 SWDS，其深度不足 5 米。
 5. 未歸類固體廢棄物處置場所：只有當各國不能將其 SWDS 歸類為上述四種類別的管理和未管理 SWDS 時，才可使用此類別的 MCF。

資料來源：IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, P.3-14, table 3.1, 2006.

為生物處理（如掩埋、堆肥）等計算甲烷之參數；化石碳則可作為焚化處理之計算二氧化碳之參數。由本國之垃圾組成並套用表 7.2.2 所列各類垃圾的建議 DOC 值。

C. DOCf：DOC 可被分解之比例（fraction of DOC that can decompose）

2006 IPCC 指南預設值 0.5。

D. OX：氧化係數

氧化係數（OX）反應了源自在土壤或覆蓋廢棄物的其他材料裡，被固體廢棄物處置場所（Solid Waste Disposal Sites，以下簡稱 SWDS）的甲烷量。

2006 IPCC 指南氧化係數預設值是 0，但是對於覆蓋且管理完善的掩埋場，則使用氧化係數值 0.1，如表 7.2.3。由於衛生掩埋規定皆須進行覆土，因此會有部分甲烷氧化成二氧化碳，因此加入氧化係數 0.1 計算。

E. 反應常數（k）

表 7.2.4 為 2006 IPCC 指南廢棄物之反應常數（k）值，

可供以計算每年累積之 DDOC 量。臺灣選取熱帶、潮濕氣候帶之預設參數值計算。

反應常數（k）係使用 2006 IPCC 指南所公布的廢棄物種類（紙張 / 紡織品係數、木材係數及食品廢棄物）以及廢棄物成分組成計算，其中在 1950 至 1990 年之反應常數皆依據 1990 年之廢棄物組成加權計算，1990 至 2014 年則根據每年之廢棄物組成與剩餘未分解之反應常數進行加權平均計算，得到每年度之反應常數值。

廢棄物妥善掩埋場甲烷排放量依據公式 7.2.1.1 及公式 7.2.1.2 計算，相關參數採用原則列於表 7.2.5 所示。

（3）活動數據

依據中華民國環境保護統計年報，彙整 1990 年至 2014 年垃圾清運之「衛生掩埋」數據，及 1992 年至 2014 年可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」百分比數據，如表 7.2.6 所示。

表 7.2.2 IPCC 指南廢棄物之可分解有機碳含量（DOC）

MSW 成分	乾物質含量占濕重的 %	DOC 含量占濕廢棄物的 %		DOC 含量占乾廢棄物的 %		總碳含量占乾重的 %		化石碳比例占總碳的 %	
	預設值	預設值	範圍	預設值	範圍	預設值	範圍	預設值	範圍
紙張 / 紙板	90	40	36-45	44	40-50	46	42-50	1	0-5
紡織品	80	24	20-40	30	25-50	50	25-50	20	0-50
食物垃圾	40	15	8-20	38	20-50	38	20-50	-	-
木材	85	43	39-46	50	46-54	50	46-54	-	-
庭園和公園廢棄物	40	20	18-22	49	45-55	49	45-55	0	0
尿布	40	24	18-32	60	44-80	70	54-90	10	10
橡膠和皮革	84	(39)	(39)	(47)	(47)	67	67	20	20
塑膠	100	-	-	-	-	75	67-85	100	95-100
金屬	100	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA
玻璃	100	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA
其他，惰性廢棄物	90	-	-	-	-	3	0-5	100	50-100

備註：橡膠和皮革在掩埋場厭氧條件下可能不會降解。

資料來源：IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, P.2-14, table 2.4, 2006.

表 7.2.3 IPCC 指南掩埋場之氧化係數

掩埋場型式	氧化係數（OX）預設值
管理 ¹ 、未管理和未歸類掩埋場	0
覆蓋有甲烷氧化材料 ² 的管理	0.1

1 管理但未覆蓋通風材料。
2 例如土壤、堆肥。

資料來源：IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, P.3-15, table 3.2, 2006.

(4) 排放量

妥善管理廢棄物掩埋場產生之甲烷排放量係依據公式 7.2.1.1 及公式 7.2.1.2 計算，結果如表 7.2.7 及圖 7.2.1。

由於 1997 年~1999 年推動資源回收、廢棄物零掩埋、垃圾焚化處理政策，故 2000 年起垃圾掩埋處量大幅下降。2014 年相較 1990 年垃圾掩埋量（衛生掩埋與一般掩埋、

堆置、其他總和）減少 98.7%，2014 年相較 2013 年垃圾掩埋量減少 9%。

另從 1999 年起國內 4 大掩埋場回收沼氣進行發電，即甲烷回收量（R），此部分排放歸屬能源部門；回收沼氣發電其甲烷回收量於 2002 年達到最大值（約 24.22 千公噸），2014 年回收沼氣發電之甲烷回收量比例約 7.3%。

表 7.2.4 IPCC 指南掩埋場甲烷生成率（k）值

廢棄物類型		氣候帶							
		北溫帶 (MAT ≤ 20 °C)				熱帶 (MAT > 20 °C)			
		乾 (MAP/PET < 1)		濕 (MAP/PET > 1)		乾 (MAP < 1000mm)		濕潤、潮濕 (MAP ≥ 1000mm)	
		預設值	範圍	預設值	範圍	預設值	範圍	預設值	範圍
緩慢分解的廢棄物	紙張 / 紡織品廢棄物	0.04	0.03-0.05	0.06	0.05-0.07	0.045	0.04-0.06	0.07	0.06-0.085
	木材 / 秸稈廢棄物	0.02	0.01-0.03	0.03	0.02-0.04	0.025	0.02-0.04	0.035	0.03-0.05
輕度降解的廢棄物	其他（非食品）有機易腐 / 庭園和公園廢棄物	0.05	0.04-0.06	0.1	0.06-0.1	0.065	0.05-0.08	0.17	0.15-0.2
快速降解的廢棄物	食品廢棄物 / 污水污泥	0.06	0.05-0.08	0.185	0.1-0.2	0.085	0.07-0.1	0.4	0.17-0.7
批量廢棄物		0.05	0.04-0.06	0.09	0.08-0.1	0.065	0.05-0.08	0.17	0.15-0.2

註：MAT – 年均溫度；MAP – 年均降水量；PET – 可能蒸發量。

資料來源：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, P.3-17, table 3.3.

表 7.2.5 IPCC 指南掩埋處理甲烷排放計算一覽表

	2006 IPCC 指南計算方法或預設值	臺灣計算方法及採用數據	國內數據來源
累積 DDOC 量	以一階衰減法估算累積量並至少追朔 50 年。	• 依據人口數回推掩埋廢棄物量。 • 1950 至 1990 年各年之 DOC 含量，依據 1990 年之分析結果計算。	人口數取內政部統計資料 中華民國環境保護年報
反應常數 (k)	公布各種氣候與不同廢棄物類型之反應常數	• 依據 IPCC 提供之反應常數值計算。 • 根據氣象局資料，全國 1971 至 2009 平均溫度為 21°C，年平均降水量大於 1000mm，引用之反應常數 紙張 / 紡織品係數 0.07 木材係數 0.035 食品廢棄物係數 0.4 • 據每年之成分組成加權計算反應常數	中華民國環境保護年報 IPCC 預設值
甲烷修正係數 (MCF)	分為妥善管理、妥善管理（半有氣掩埋）、未妥善管理（掩埋深度 >5 公尺）、未妥善管理（掩埋深度 <5 公尺）、未分類掩埋場等四類參數。	• 依據 IPCC 針對不同型態之固態廢棄物掩埋場所提供之甲烷修正係數。 • 依據國內分類方式，採用衛生掩埋、一般掩埋、堆置、其他 4 類；衛生掩埋採妥善管理 1.0 及其餘採未分類 0.5 計算。	IPCC 預設值
可降解有機碳比例 (DOC)	依據不同之廢棄物 DOC 預設值計算 ▶ 紙類預設值 40% ▶ 紡織品類預設值 24% ▶ 花（公）園廢棄物預設值 20% ▶ 廚餘類預設值 15% ▶ 木竹稻草類預設值 43%	• 依據臺灣一般垃圾垃圾性質分析含移除量計算 • 由於我國垃圾性質分析含移除量含有有機碳與礦物碳成分，因此取垃圾性質分析含移除量計算與國內研究資料兩者較低者作為計算值。	中華民國環境保護年報
DOC 可被分解之比例 (DOCF)	預設值 0.5	使用以 IPCC 預設值 0.5 計算。	IPCC 預設值
掩埋場產氣中甲烷之比例 (F)	預設值 0.5	採用 IPCC 預設值 0.5。	IPCC 預設值
甲烷回收量 (R)	各國自行調查結果	甲烷回收量則以國內福德坑、山豬窟、台中文山與高雄西青埔掩埋場之發電量回推回收量。	國內掩埋場實際發電量
氧化係數 (OX)	• 針對蓋有甲烷氧化材料者氧化係數值為 0.1 其餘為 0 • 預設值 0	國內衛生掩埋場皆有進行土壤覆蓋作業，採用 IPCC 公布值 0.1 計算，一般掩埋場則以 0 計算。	IPCC 公布值

2014年妥善管理掩埋場甲烷排放量相較1990年減少71%，較2013年也減少15.4%。

此排放趨勢符合我國廢棄物處理政策，早期（1984年以前）以掩埋處理為主，後期（1991年後）轉為以焚化處理為主，並推動資源回收。因焚化減少掩埋量，垃圾分類資源回收又進一步降低掩埋量與焚化量、也減少掩埋廢棄物有機物質之比例，同時衛生掩埋場進行沼氣燃燒減少甲烷排放，1999年後北中南四大掩埋場更回收沼氣發電，進一步降低甲烷排放量。

(5) 完整性

保護統計年報記載1990年至2014年衛生掩埋量，廢棄物組成百分比數據僅記載1992年至2014年，缺少1990年及1991年，處理方式詳時間序列的一致性。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關廢棄物部門整體排放量不確定性，及各來源排放

量不確定性之評估方法及估算結果，請另詳7.6節廢棄物部門溫室氣體排放量不確定度分析。

(2) 時間序列的一致性

妥善掩埋場甲烷排放估算，依國家清冊統計規定，採用IPCC 2006指南建議之「一階衰減法」公式進行計算。各年期（1990年至2014年）估算方法一致。活動數據蒐集方面：依據中華民國環境保護統計年報，完整彙整1990年至2014年垃圾清運之「衛生掩埋」數據，及1992年至2014年可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」及「化學分析含移除量」百分比數據，其中缺少1990年與1991年之數據，則引用行政院環境保護署2009年「國家通訊及溫室氣體排放清冊建置應用」報告該兩年期數據，以建立各年期排放估算之完整性。

4. 特定排放源的QA/QC及查證

符合方法一（Tier 1），為利用國家妥善管理廢棄物掩埋場活動數據為基礎，以IPCC建議排放係數，並

表 7.2.6 臺灣 1990 至 2014 年妥善管理掩埋場活動數據統計

年	衛生掩埋 (千公噸)	廢棄物組成 (%)									
		紙類	纖維布類	皮革 橡膠類	廚餘類	木竹稻草 落葉類	塑膠	其他	水分	化學分析 含移除量	
1990	3,979.6	29.44	2.72	1.31	9.67	4.66	19.14	2.45	51.97	-	
1991	4,323.5	22.80	1.82	0.37	11.79	5.09	19.14	2.45	51.97	-	
1992	5,087.5	24.86	3.97	1.73	25.73	5.06	19.14	2.45	51.97	16.50	
1993	5,090.8	27.84	5.13	1.55	23.47	5.79	18.01	1.15	51.06	17.04	
1994	5,574.4	29.98	4.81	0.80	23.50	4.69	18.90	4.31	53.21	19.08	
1995	4,362.8	32.17	6.21	0.88	17.94	5.82	18.27	3.34	48.14	18.60	
1996	4,824.0	30.95	5.05	1.08	18.97	5.89	17.83	4.72	50.60	18.99	
1997	5,129.7	29.13	5.80	1.13	24.90	4.86	19.57	2.11	46.03	20.44	
1998	5,598.0	32.77	5.27	0.83	18.29	4.81	20.14	4.54	51.06	18.47	
1999	5,366.9	35.83	5.20	0.60	21.83	4.89	19.85	1.97	50.76	18.87	
2000	3,822.1	26.37	6.06	1.35	27.76	3.36	22.00	0.44	45.02	21.12	
2001	2,996.8	26.55	4.81	0.48	27.32	4.06	21.10	5.06	55.80	18.24	
2002	2,116.4	30.01	3.65	0.60	23.34	4.43	20.23	8.17	51.24	20.45	
2003	1,700.4	32.97	3.78	0.22	27.19	3.88	21.36	3.58	55.69	18.71	
2004	1,474.2	31.56	4.90	0.87	29.76	4.91	20.60	0.98	51.19	20.60	
2005	1,184.6	38.64	2.38	0.43	38.15	1.93	13.78	0.67	54.03	17.98	
2006	851.0	44.30	1.84	0.19	34.57	1.74	14.63	0.36	52.41	20.58	
2007	504.9	41.75	3.20	0.51	32.86	1.83	17.13	0.33	51.55	21.44	
2008	236.1	44.54	2.63	0.36	30.56	1.99	17.28	0.48	50.94	24.14	
2009	185.8	38.87	2.29	0.41	37.42	1.76	16.74	0.44	54.19	22.53	
2010	181.8	39.57	2.52	0.51	35.68	1.74	16.57	0.52	52.66	22.90	
2011	142.2	38.31	2.04	0.23	39.21	1.39	15.66	0.61	55.06	21.70	
2012	102.1	38.85	2.52	0.20	38.33	1.46	15.61	0.49	53.97	22.36	
2013	91.4	47.10	2.35	0.36	35.07	1.32	16.57	0.52	54.08	22.26	
2014	83.1	39.4	2.34	0.14	37.64	1.31	16.56	0.60	55.17	22.03	

資料來源：行政院環境保護署，中華民國環境保護統計年報，2014年。
備註：廢棄物組成皆為一般垃圾組成。



表 7.2.7 臺灣 1990 至 2014 年妥善管理掩埋場甲烷排放量

年	衛生掩埋 (千公噸)	加權 (MCF)	廢棄物組成 (%)		處置 DOC 量 (千公噸)	累積 DOC 量 (千公噸)	分解 DOC 量 (千公噸)	反應常數 (k)	有機物分解比例 (DOCF)	甲烷生成比例 (F)	轉換係數 16/12	甲烷回收量 (R) (Gg)	氧化係數 (OX)	甲烷排放量 (Gg)
			組成分析含移除量	可分解有機碳 (DOC)										
1990	3,979.6	1.0	15.88	15.88	632.08	4,546.2	566.3	0.135	0.5	0.5	1.333	-	0.1	169.86
1991	4,323.5	1.0	13.51	13.51	584.27	4,555.8	574.64	0.135	0.5	0.5	1.333	-	0.1	172.35
1992	5,087.5	1.0	16.93	16.50	839.43	4,819.4	575.86	0.138	0.5	0.5	1.333	-	0.1	172.71
1993	5,090.8	1.0	18.38	17.04	867.47	5,066.1	620.80	0.149	0.5	0.5	1.333	-	0.1	186.19
1994	5,574.4	1.0	18.69	18.69	1,041.75	5,408.7	699.17	0.155	0.5	0.5	1.333	-	0.1	209.70
1995	4,362.8	1.0	19.55	18.60	811.48	5,444.7	775.46	0.161	0.5	0.5	1.333	-	0.1	232.58
1996	4,824.0	1.0	18.97	18.97	915.12	5,552.3	807.49	0.161	0.5	0.5	1.333	-	0.1	242.19
1997	5,129.7	1.0	18.87	18.87	967.91	5,695.9	824.35	0.162	0.5	0.5	1.333	-	0.1	247.24
1998	5,598.0	1.0	19.18	18.47	1,033.95	5,878.2	851.67	0.167	0.5	0.5	1.333	-	0.1	255.44
1999	5,366.9	1.0	20.96	18.87	1,012.74	5,988.5	902.42	0.167	0.5	0.5	1.333	3.13	0.1	267.53
2000	3,822.1	1.0	17.61	17.61	673.12	5,742.8	918.82	0.168	0.5	0.5	1.333	5.48	0.1	270.09
2001	2,996.8	1.0	17.62	17.62	527.98	5,384.6	886.21	0.172	0.5	0.5	1.333	20.19	0.1	245.61
2002	2,116.4	1.0	18.29	18.29	387.00	4,919.3	852.23	0.176	0.5	0.5	1.333	24.22	0.1	231.39
2003	1,700.4	1.0	19.84	18.71	318.15	4,444.4	793.04	0.177	0.5	0.5	1.333	21.06	0.1	216.79
2004	1,474.2	1.0	20.38	20.38	300.37	4,023.7	721.12	0.179	0.5	0.5	1.333	15.47	0.1	200.81
2005	1,184.6	1.0	22.58	17.98	212.99	3,578.6	658.09	0.180	0.5	0.5	1.333	13.39	0.1	183.99
2006	851.0	1.0	24.10	20.58	175.14	3,162.8	590.91	0.183	0.5	0.5	1.333	11.52	0.1	165.71
2007	504.9	1.0	23.18	21.44	108.26	2,742.3	528.76	0.184	0.5	0.5	1.333	10.15	0.1	148.44
2008	236.1	1.0	23.89	23.89	56.40	2,337.3	461.42	0.185	0.5	0.5	1.333	8.58	0.1	129.82
2009	185.8	1.0	22.47	22.47	41.74	1,984.2	394.83	0.185	0.5	0.5	1.333	7.77	0.1	110.65
2010	181.8	1.0	22.53	22.53	40.96	1,689.6	335.59	0.186	0.5	0.5	1.333	6.88	0.1	93.77
2011	142.2	1.0	22.29	21.70	30.85	1,433.6	286.85	0.187	0.5	0.5	1.333	5.60	0.1	80.44
2012	102.1	1.0	22.52	22.36	22.82	1,212.1	244.27	0.188	0.5	0.5	1.333	4.89	0.1	68.37
2013	91.4	1.0	23.08	22.26	20.34	1,025.0	207.43	0.188	0.5	0.5	1.333	4.39	0.1	57.82
2014	83.1	1.0	22.54	22.03	18.31	867.3	176.00	0.189	0.5	0.5	1.333	3.86	0.1	48.92




圖 7.2.1 臺灣 1990 至 2014 年妥善管理廢棄物掩埋場甲烷排放量趨勢

參考 IPCC 2000 年良好作法指南及不確定性管理 (Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 以下簡稱 2000 GPG), 計算溫室氣體排放量。

針對本範疇之計算方式、引用參數及計算結果, 業已於 104 年 5 月、10 月召開專家會議, 針對計算方式、引用參數與活動數據研析其合理性進行確認。

另, 參考 2000 GPG 指南中「方法 1 一般清單水準品質控制程序」(如表 7.2.8), 透過交叉檢查重新計算及目測過濾, 來檢核數據與引用數據來源內容是否一致; 同時在對大量輸入資料進行查核過程中, 為了避免檢核過程之錯誤, 人工和自動檢查相結合是最有效的方法, 故利用程式設計輔助人工檢核及簡化判讀等程序。

5. 特定排放源的重新計算

本年度清冊採用之計算方法、活動數據時間序列一致性完整性已查證, 相關參數及活動係數之引用已說明確認, 符合 2000 GPG。下一年度如前述各年期排放估算採用之計算方法、活動數據或引用相關排放係數值有變更, 才會涉及排放量之重新計算。

6. 特定排放源的改善計畫

由於妥善管理之廢棄物掩埋場掩埋處理量之統計年報

活動數據與組成僅有全國之彙整數據, 建議環保署未來可考量區分各處理掩埋單位之活動數據與組成, 將能更完整反應實際數據與組成, 進而計算各處理掩埋單位之溫室氣體排放。

針對掩埋處理甲烷排放的計算參數, 沼氣中甲烷之比例 F 值, 目前採 IPCC 建議的定值 0.5 計算, 但沼氣中 F 值是否亦會隨掩埋年限變動或逐年下降的議題仍待研究。環保署擬蒐集檢討我國歷年 (16 至 17 年) 沼氣發電掩埋場產氣組成變化, 了解 F 值長期變動趨勢, 作為採用本土計算參數 F 值之參考。

另外, 有關計算參數甲烷回收量 R 值的採用數據, 目前係以國內福德坑、山豬窟、台中文山與高雄西青埔掩埋場之發電量回推回收量。可進一步進行我國掩埋場設置沼氣收集管線燃燒處理的普及性調查研究, 評估掩埋場沼氣產生量可再扣除燃燒處理之比例。

7.2.2 無管理之廢棄物掩埋場 (5.A.2)

1. 排放源及匯分類的描述

依據 104 年中華民國環境保護統計年報之分類總結說明 103 年廢棄物之處理內容, 關於垃圾處理方式可分為焚化、掩埋、堆置、資源回收、巨大垃圾回收再利用及廚餘回收等。103 年執行機關垃圾處理方式以資源回收占 44.92%

表 7.2.8 妥善管理掩埋場一般清單品質控制程序檢核表

品質控制活動	確認程序
檢查被記載的所選活動水準資料和排放因數的假設和標準	• 交叉檢查排放源類別資訊活動水準資料 (垃圾衛生掩埋、垃圾組成) 和排放因數 (IPCC 建議值) 的種類並確保其正確記錄並歸檔
檢查資料登錄和參考文獻的轉錄誤差	• 確認正確引用「中華民國環境保護統計年報」結果
檢查排放計算的準確性	• 條列各項參數與活動數據, 簡化運算規則, 複查計算結果準確性
檢查被正確記錄的參數和排放單位及被採用的適當的轉換因數	• 確認各欄位單位標記的準確性 • 確認整個計算過程中單位使用的準確性 • 確認轉換因數的準確性 • 無時間和空間校正因數應用
檢查資料庫檔的完整性	• 簡明條列明確欄位與計算欄位
檢查排放源類別間資料的一致性	• 確認引用適用多種排放源類別的活動水準資料常數與參數之一致性與複檢結果
檢查處理過程中清單資料轉移的正確性	• 避免有轉錄情事, 並加強複查檢核 • 無計算轉錄計算情事
檢查排放不確定性和轉換的正確估算和計算	• 檢查提供不確定性估算的專家判斷的獨立資格 • 檢查所記錄的資格假定和專家判斷檢查不確定性計算的完整性與準確性 • 目前版本相關參數引用 IPCC 指南建議值
開展內部檔的審評	• 詳細登錄資料來源引用與版本差異 • 檢查歸檔並存儲的清單資料支援資料和清單記錄以有利於展開詳盡的審評
檢查導致重新計算的方法和資料變化	• 確認每個排放源類別輸入資料的時間序列一致性 • 確認用於整個時間序列計算的運算法則 / 方法的一致性 • 無時間序列一致性缺漏情事
開展完全檢查	• 確認提交的評估報告涵蓋了從指定基年到當前清單時段內所有年份排放源類別
比較現有估算和原始估算	• 對於每個排放源類別應將當前的清單估算和以前的估算進行比較如果與設想情況有重大的變化或差距應重新檢查估算並分析不同之處 • 本年度並無重新計算情事

居首位，焚化占 43.28% 次之，廚餘回收占 9.78% 居第 3；其中掩埋又區分為「衛生」與「一般」掩埋。而無管理之廢棄物掩埋則屬一般掩埋、堆置、與其他處理方式。

一般掩埋場之活動數據是參閱中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 89 年至 103 年，引用（四）廢棄物管理表 4-1 垃圾清理狀況，其中關於垃圾清運之「衛生掩埋」數據；及引用表 4-6 垃圾性質，其中關於可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」百分比數據。

2. 方法論議題

（1）計算方法

根據 2006 IPCC 指南統計方法，廢棄物掩埋產生甲烷排放量應該以一階衰減法計算，並須延長 50 年統計年限，根據指南所提供之計算表單，其建議回溯至 1950 年來進行統計分析，由於並未有 1990 年前之掩埋資料，IPCC 統計方法說明可依人口量與垃圾量之比例換算。有關計算順序說明如下：

- A. 依據 1990 年之人口量與掩埋量回推至 1950 年之掩埋量並以 1990 年之垃圾組成之成分作為 1950 至 1989 年之垃圾組成。
- B. 依據一階衰減法計算 1950 至 1989 年之累積可分解有機碳含量（累積 DOC）。
- C. 以 1989 年計算累積 DOC 結果，作為 1990 年前之累積 DOC 計算基準，再依據中華民國環境保護統計年報實際垃圾量與組成，根據一階衰減法計算 1990 年至 2014 年甲烷排放量。

廢棄物掩埋產生甲烷的計算公式，如公式 7.2.1.1 所示，主要定義了每年「可分解的 DOC 量（DDOCm）」參數，此參數則以一階衰減法估算，詳如公式 7.2.1.2 所示，在估算採用 DDOCm 時，2006 IPCC 指南表示至少需計算 50 年的處置資料，該時限為大部分通用處置作法和條件提供了一個可接受的精確結果，如果選擇了更短的時限，則應當證明沒有明顯低估排放。

（2）排放係數

依據公式 7.2.1.1 與公式 7.2.1.2 的各項參數，引用說明如下：

A. MCF：甲烷修正係數（CH₄ correction factor for aerobic decomposition）

表 7.2.1 為 2006 IPCC 指南掩埋場型式與對應之甲烷修正係數，詳細說明各種掩埋場型式之處理情形，以及定義未分類者之 MCF 引用條件。依據 2006 IPCC 指南說明，除了非屬於其表格所列之處理方式才可以引用未分類掩埋場，因此修正一般掩埋之甲烷修正參數值。故設定未妥善管理之廢棄物掩埋場之甲烷修正參數值為 0.5。

B. DOC：可降解有機碳比例（Degradable Organic Carbon）

表 7.2.2 為 2006 IPCC 指南廢棄物之可分解有機碳含量以及提供化石碳占總碳之比例。可分解有機碳含量可作為生物處理（如掩埋、堆肥）等計算甲烷之參數；化石碳則可作為焚化處理之計算二氧化碳之參數。由本國之垃圾組成並套用表 7.2.2 所列各類垃圾的建議 DOC 值。

C. DOC_f：DOC 可被分解之比例（fraction of DOC that can decompose）

2006 IPCC 指南預設值 0.5。

D. OX：氧化係數

氧化係數（OX）反映了源自在土壤或覆蓋廢棄物的其他材料裡，被氧化 SWDS 的甲烷排放量。

2006 IPCC 指南氧化係數預設值是 0，但是對於覆蓋且管理完善的掩埋場，則使用氧化係數值 0.1，如表 7.2.3。由於一般掩埋場處理較未完善，覆土不完整，甲烷易直接逸散，因此氧化係數以 0 計算。

E. 反應常數（k）

表 7.2.4 為 2006 IPCC 指南廢棄物之反應常數（k）值，可供以計算每年累積之 DDOC 量。臺灣選取熱帶、潮濕氣候帶之預設參數值計算。一般掩埋場反應常數（k）比照妥善管理之廢棄物掩埋場計算方式。

（3）活動數據

依據中華民國環境保護統計年報，彙整 1990 年至 2014 年垃圾清運之「一般掩埋」、「堆置」、「其他」數據，及 1992 年至 2014 年可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」百分比數據，如表 7.2.9 所示。

(4) 排放量

依據 IPCC 估算廢棄物掩埋場甲烷排放之公式（公式 7.2.1.1、公式 7.2.1.2）及中華民國環境保護年報之資訊，未妥善管理之廢棄物掩埋場之類別包括「一般掩埋」、「堆置」、「其他」等三項廢棄物類別，另由於目前垃圾掩埋沼氣回收處理僅有衛生掩埋場，故未妥善管理之廢棄物掩埋場之甲烷回收量（R）為 0。排放估算結果如表 7.2.10 及圖 7.2.2 所示。

環保署統計年報數據顯示，從 2000 年起垃圾妥善處理率已超過九成，2004 年已達 99% 以上，故未妥善管理廢棄物掩埋場產生甲烷排放量亦隨著臺灣垃圾妥善處理率增加而大幅下降。

(5) 完整性

中華民國環境保護統計年報記載 1990 年至 2014 年衛生掩埋量，廢棄物組成百分比數據僅記載 1992 年至

2014 年，缺少 1990 年及 1991 年，處理方式詳時間序列的一致性。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關廢棄物部門整體排放量不確定性，及各來源排放量不確定性之評估方法及估算結果，請另詳 7.6 節廢棄物部門溫室氣體排放量不確定度分析。

(2) 時間序列的一致性

未妥善管理掩埋場甲烷排放估算，依國家清冊統計規定，採用 IPCC 2006 指南建議之「一階減法」公式進行計算，各年期（1990 年至 2014 年）估算方法一致。活動數據蒐集方面：依據中華民國環境保護統計年報，完整彙整 1990 年至 2014 年垃圾清運之垃圾清運之「一般掩埋」、「堆置」、「其他」數據，及 1992 年至 2014 年可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木

表 7.2.9 臺灣 1990 至 2014 年未妥善管理掩埋場活動數據統計

年	一般掩埋（千公噸）			廢棄物組成（%）								
	一般掩埋	堆置	其他	紙類	纖維布類	皮革橡膠類	廚餘類	木竹稻草落葉類	塑膠	其他	水分	化學分析含移除量
1990	2,046.6		627.8	29.44	2.72	1.31	9.67	4.66	19.14	2.45	51.97	-
1991	2,409.3		471.9	22.80	1.82	0.37	11.79	5.09	19.14	2.45	51.97	-
1992	2,148.9		501.6	24.86	3.97	1.73	25.73	5.06	19.14	2.45	51.97	16.50
1993	2,449.6		427.9	27.84	5.13	1.55	23.47	5.79	18.01	1.15	51.06	17.04
1994	2,058.6		446.0	29.98	4.81	0.80	23.50	4.69	18.90	4.31	53.21	19.08
1995	2,537.6		500.0	32.17	6.21	0.88	17.94	5.82	18.27	3.34	48.14	18.60
1996	2,090.5		454.8	30.95	5.05	1.08	18.97	5.89	17.83	4.72	50.60	18.99
1997	1,536.4		508.9	29.13	5.80	1.13	24.90	4.86	19.57	2.11	46.03	20.44
1998	1,088.9	296.5	155.4	32.77	5.27	0.83	18.29	4.81	20.14	4.54	51.06	18.47
1999	857.3	245.2	56.2	35.83	5.20	0.60	21.83	4.89	19.85	1.97	50.76	18.87
2000	697.1	119.1	4.7	26.37	6.06	1.35	27.76	3.36	22.00	0.44	45.02	21.12
2001	433.3	73.0	14.6	26.55	4.81	0.48	27.32	4.06	21.10	5.06	55.80	18.24
2002	224.5	55.1	8.0	30.01	3.65	0.60	23.34	4.43	20.23	8.17	51.24	20.45
2003	113.1	20.2	0.7	32.97	3.78	0.22	27.19	3.88	21.36	3.58	55.69	18.71
2004	63.6	16.1	1.2	31.56	4.90	0.87	29.76	4.91	20.60	0.98	51.19	20.60
2005	35.2	4.9	0.1	38.64	2.38	0.43	38.15	1.93	13.78	0.67	54.03	17.98
2006	13.3	2.7	1.7	44.30	1.84	0.19	34.57	1.74	14.63	0.36	52.41	20.58
2007			32.5	41.75	3.310	0.51	32.86	1.83	17.13	0.33	51.55	21.44
2008			0.7	44.54	2.63	0.36	30.56	1.99	17.28	0.48	50.94	24.14
2009			1.3	38.87	2.29	0.41	37.42	1.76	16.74	0.44	54.19	22.53
2010			2.2	39.57	2.52	0.51	35.68	1.74	16.57	0.52	52.66	22.90
2011			0.1	38.31	2.04	0.23	39.21	1.39	15.66	0.61	55.06	21.70
2012			0.1	38.85	2.52	0.20	38.33	1.46	15.61	0.49	53.97	22.36
2013			1.7	47.10	2.35	0.36	35.07	1.32	16.57	0.52	54.08	22.26
2014			0.1	39.42	2.34	0.14	37.64	1.31	16.56	0.60	55.17	22.03

資料來源：行政院環境保護署，中華民國環境保護統計年報，2015。
備註：廢棄物組成皆為一般垃圾組成。



竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」及「化學分析含移除量」百分比數據，其中缺少 1990 年與 1991 年之數據，則引用行政院環境保護署 2009 年「國家通訊及溫室氣體排放清冊建置應用」報告該兩年期數據，以建立各年期排放估算之完整性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

符合方法一（Tier 1），為利用國家未妥善管理廢棄

物掩埋場活動數據為基礎，以 IPCC 建議排放係數，並參考 2000 GPG，計算溫室氣體排放量。

針對本範疇之計算方式、引用參數及計算結果，業已於 104 年 5 月、10 月召開專家會議，針對計算方式、引用參數與活動數據研析其合理性進行確認。

另，參考 2000 GPG 指南中「方法 1 一般清單水準品質控制程序」（如表 7.2.11），透過交叉檢查重新計算及

表 7.2.10 臺灣 1990 至 2014 年未妥善管理掩埋場甲烷排放量

年	一般掩埋 (千公噸)	加權 (MCF)	廢棄物組成 (%)		處置 DOC 量 (千公噸)	累積 DOC (千公噸)	分解 DOC 量 (千公噸)	反應 常數 (K)	有機物分 解比例 (DOCF)	甲烷 生成 比例 (F)	轉換 係數 16/12	甲烷回 收量 (R) (Gg)	氧化 係數 (OX)	甲烷排 放量 (Gg)
			組成分析 含移除量	可分解 有機碳 (DOC)										
1990	2,674.4	0.5	15.88	15.88	424.78	3,055.2	380.59	0.135	0.5	0.5	1.333	-	0.0	63.42
1991	2,881.3	0.5	13.51	13.51	389.37	3,058.4	386.18	0.135	0.5	0.5	1.333	-	0.0	64.35
1992	2,650.5	0.5	16.93	16.50	437.34	3,109.2	386.58	0.138	0.5	0.5	1.333	-	0.0	64.41
1993	2,877.5	0.5	18.38	17.04	490.33	3,199.0	400.45	0.147	0.5	0.5	1.333	-	0.0	66.72
1994	2,504.5	0.5	18.69	18.69	468.05	3,230.6	436.51	0.153	0.5	0.5	1.333	-	0.0	72.73
1995	3,037.6	0.5	19.55	18.60	564.99	3,338.3	457.27	0.157	0.5	0.5	1.333	-	0.0	76.19
1996	2,545.3	0.5	18.97	18.97	482.84	3,334.9	486.23	0.158	0.5	0.5	1.333	-	0.0	81.02
1997	2,045.3	0.5	18.87	18.87	385.92	3,233.2	487.62	0.160	0.5	0.5	1.333	-	0.0	81.25
1998	1,540.9	0.5	19.18	18.47	284.60	3,041.1	476.73	0.163	0.5	0.5	1.333	-	0.0	79.43
1999	1,158.6	0.5	20.96	18.87	218.63	2,801.7	458.02	0.163	0.5	0.5	1.333	-	0.0	76.32
2000	820.9	0.5	17.61	17.61	144.56	2,523.7	422.52	0.164	0.5	0.5	1.333	-	0.0	70.40
2001	520.9	0.5	17.62	17.62	91.78	2,233.3	382.21	0.167	0.5	0.5	1.333	-	0.0	63.69
2002	287.5	0.5	18.29	18.29	52.57	1,942.7	343.15	0.169	0.5	0.5	1.333	-	0.0	57.18
2003	134.0	0.5	19.84	18.71	25.08	1,666.4	301.40	0.169	0.5	0.5	1.333	-	0.0	50.22
2004	81.0	0.5	20.38	20.38	16.50	1,423.5	259.43	0.170	0.5	0.5	1.333	-	0.0	43.23
2005	40.3	0.5	22.58	17.98	7.24	1,208.6	222.16	0.170	0.5	0.5	1.333	-	0.0	37.02
2006	17.7	0.5	24.10	20.58	3.64	1,023.2	189.04	0.170	0.5	0.5	1.333	-	0.0	31.50
2007	32.5	0.5	23.18	21.44	6.97	869.8	160.32	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	26.71
2008	0.7	0.5	23.89	23.89	0.18	733.6	136.39	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	22.73
2009	1.3	0.5	22.47	22.47	0.30	618.7	115.20	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	19.20
2010	2.2	0.5	22.53	22.53	0.49	522.0	97.16	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	16.19
2011	0.1	0.5	22.29	21.70	0.02	440.1	81.99	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	13.66
2012	0.1	0.5	22.52	22.36	0.02	370.9	69.13	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	11.52
2013	0.1	0.5	23.08	22.26	0.02	313.0	58.28	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	9.71
2014	0.1	0.5	22.54	22.03	0.02	263.6	49.12	0.171	0.5	0.5	1.333	-	0.0	8.19




圖 7.2.2 臺灣 1990 至 2014 年未妥善管理廢棄物掩埋場甲烷排放量趨勢

目測過濾，來檢核數據與引用數據來源內容是否一致；同時在對大量輸入資料進行查核過程中，為了避免檢核過程之錯誤，人工和自動檢查相結合是最有效的方法，故利用程式設計輔助人工檢核及簡化判讀等程序。

5. 特定排放源的重新計算

本年度清冊採用之計算方法、活動數據時間序列一致性完整性已查證，相關參數及活動係數之引用已說明確認，符合 2000 GPG 優良作法。下一年度如前述各年期排放估算採用之計算方法、活動數據或引用相關排放係數值有變更，才會涉及排放量之重新計算。

6. 特定排放源的改善計畫

由於未妥善管理之廢棄物掩埋場掩埋處理量之統計年報活動數據與組成僅有全國之彙整數據，未來可進一步考量區分各處理掩埋單位之活動數據與組成，將能更完整反應實際數據與組成，進而計算各處理掩埋單位之溫室氣體排放。

針對掩埋處理甲烷排放的計算參數，沼氣中甲烷之比例 F 值，目前採 IPCC 建議的定值 0.5 計算，但沼氣中 F 值是否亦會隨掩埋年限變動或逐年下降的議題仍待研究。環保署擬蒐集檢討我國歷年（16 至 17 年）沼氣發電掩埋

場產氣組成變化，了解 F 值長期變動趨勢，作為採用本土計算參數 F 值之參考。

7.2.3 未分類之廢棄物處理廠址（5.A.3）

依據環保署統計年報針對垃圾處理方式之分類說明，摒除回收資源、事業廢棄物及遷移舊垃圾外，大致以焚化、衛生掩埋、一般處理、堆置、其他、巨大垃圾回收再利用、廚餘回收與資源回收等八類，依據 IPCC 廢棄物部門分類指南，除了資源回收與再利用外，均已包含在其規範內，也已依 IPCC 指南進行估算。無其他陸地廢棄物掩埋處理排放範疇。

7.3 固體廢棄物之生物處理（5.B）

1. 排放源及匯分類的描述

2006 IPCC 指南中將生物處理部分獨立考量，生物處理之優點為減少廢棄物體積、消除廢棄物中的病原體以及產生沼氣回收發電等，對已開發國家與開發中國家而言，可常見將有機廢棄物（如食品廢棄物、花園庭園之落葉等）回收用作堆肥和土地改良。堆肥處理過程中會發生厭氧反應而產生甲烷。

此外，堆肥處理尚會產生氧化亞氮；若有機廢棄物進行厭氧分解，則會有甲烷大量產生，此時通常會回收甲烷

表 7.2.11 未妥善管理掩埋場一般清單品質控制程序檢核表

品質控制活動	確認程序
檢查被記載的所選活動水準資料和排放因數的假設和標準	• 交叉檢查排放源類別資訊活動水準資料（垃圾一般掩埋、堆置、其他、垃圾組成）和排放因數（IPCC 建議值）的種類並確保其正確記錄並歸檔
檢查資料登錄和參考文獻的轉錄誤差	• 確認正確引用「中華民國環境保護統計年報」結果
檢查排放計算的準確性	• 條列各項參數與活動數據，簡化運算規則，複查計算結果準確性
檢查被正確記錄的參數和排放單位及被採用的適當的轉換因數	• 確認各欄位單位標記的準確性 • 確認整個計算過程中單位使用的準確性 • 確認轉換因數的準確性 • 無時間和空間校正因數應用
檢查資料庫檔的完整性	• 簡明條列明確欄位與計算欄位
檢查排放源類別間資料的一致性	• 確認引用適用多種排放源類別的活動水準資料常數與參數之一致性與複檢結果
檢查處理過程中清單資料轉移的正確性	• 避免有轉錄情事，並加強複查檢核 • 無計算轉錄計算情事
檢查排放不確定性和轉換的正確估算和計算	• 檢查提供不確定性估算的專家判斷的獨立資格 • 檢查所記錄的資格假定和專家判斷檢查不確定性計算的完整性與準確性 • 目前版本相關參數引用 IPCC 指南建議值
開展內部檔的審評	• 詳細登錄資料來源引用與版本差異 • 檢查歸檔並存儲的清單資料支援資料和清單記錄以有利於展開詳盡的審評
檢查導致重新計算的方法和資料變化	• 確認每個排放源類別輸入資料的時間序列一致性 • 確認用於整個時間序列計算的運算法則 / 方法的一致性 • 無時間序列一致性缺漏情事
開展完全檢查	• 確認提交的評估報告涵蓋了從指定基年到當前清單時段內所有年份排放源類別
比較現有估算和原始估算	• 對於每個排放源類別應將當前的清單估算和以前的估算進行比較如果與設想情況有重大的變化或差距應重新檢查估算並分析不同之處 • 本年度並無重新計算情事



進行燃燒，用以產生熱能或發電，則此類能源利用之溫室氣體排放通常會歸屬在能源部門。

依據中華民國環境保護統計年報廚餘回收包括「堆肥」、「養豬」與「其他廚餘再利用」三類，堆肥處理溫室氣體排放則是依據統計年報廚餘回收之「堆肥」數據進行計算。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

根據 2006 IPCC 指南提出之堆肥產生之甲烷與氧化亞氮排放推估計算方法如公式 7.3.1 與公式 7.3.2 所示。

公式 7.3.1：

$$\text{CH}_4 \text{ (kg/yr)} = \sum i (M_i \times \text{EF}_i) \times 10^{-3} - R$$

M_i ：生物處理之有機廢棄物量 (Gg/yr)

EF_i ：有機廢棄物厭氧反應產生甲烷之係數 (g CH₄/kg 廢棄物)

i ：堆肥處理或厭氧處理

R ：甲烷回收量 (kg/yr)

公式 7.3.2：

$$\text{N}_2\text{O} \text{ (kg/yr)} = \sum i (M_i \times \text{EF}_i) \times 10^{-3}$$

M_i ：生物處理之有機廢棄物量 (Gg/yr)

EF_i ：有機廢棄物厭氧反應產生 N₂O 之排放係數 (g N₂O/Gg 廢棄物)

i ：堆肥處理或厭氧處理

(2) 排放係數

依據公式 7.3.1 與公式 7.3.2 所示，其所引用之排放係數預設值如表 7.3.1 所示。採用 IPCC 排放係數之預設

值計算，其中甲烷排放係數為 4g-CH₄/kg，氧化亞氮為 0.3g-N₂O/kg。

參閱 IPCC 建議指南公式 7.3.1 與公式 7.3.2 計算生物處理產生（堆肥處理）之溫室氣體排放量，主要包括甲烷和氧化亞氮，相關參數詳列於表 7.3.2。

(3) 活動數據

依據中華民國環境保護統計年報，彙整 1990 年至 2014 年廚餘回收之「堆肥」數據，如表 7.3.3 堆肥數據欄位所示。

(4) 排放量

生物處理產生（堆肥處理）之溫室氣體排放量主要包括甲烷和氧化亞氮係數，結果如表 7.3.3、圖 7.3.1、圖 7.3.2 所示。

依據公式 7.3.1、公式 7.3.2，影響生物處理（堆肥處理）甲烷、氧化亞氮排放量，主要為堆肥處理量及排放係數。

參閱環保署統計年報堆肥處理量，1990 年數量似乎相較其近年數據增加許多，其原因可能為 1990 年起台灣省政府農林廳推動「有機農業先驅計畫」，設置簡易堆肥舍，試行有機栽培致使該年度堆肥數量較前後年較為增加。

表 7.3.1 廢棄物生物處理甲烷和氧化亞氮排放係數預設值

生物處理的類型	甲烷排放係數 (g CH ₄ /kg 處理的廢棄物)		氧化亞氮排放係數 (g N ₂ O/kg 處理的廢棄物)		備註
	乾重	濕重	乾重	濕重	
堆肥處理	10 (0.08 - 20)	4 (0.03 - 8)	0.6 (0.2 - 1.6)	0.3 (0.06 - 0.6)	關於處理的廢棄物的假設：25-50% 乾物質中的 DOC，2% 乾物質中的 N，含水量 60%。假設濕廢棄物的含水量為 60%，可根據濕廢棄物的排放係數來估算乾廢棄物的排放係數。
沼氣設施的厭氧分解	2 (0 - 20)	1 (0 - 8)	假設可忽略不計	假設可忽略不計	

資料來源：IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, P.4-6, table 4.1, 2006.

表 7.3.2 IPCC 估算生物處理溫室氣體排放計算一覽表

	IPCC 指南計算方法或預設值	臺灣計算方法及採用數據	國內數據來源
生物處理之有機廢棄物量 (Mi)	國內資料自行確定	依據國內堆肥量進行計算。	中華民國環境保護年報
排放係數 (EF)	公布堆肥處理與厭氧處理之預設值	採用 IPCC 排放係數之預設值計算，其中甲烷排放係數為 4g-CH ₄ /kg，氧化亞氮為 0.3g-N ₂ O/kg。	IPCC 預設值
甲烷回收量 (R)	預設值 0	採 IPCC 預設值計算	IPCC 預設值

備註：參閱 2006 IPCC 指南。

表 7.3.3 臺灣 1990 至 2014 年生物處理各類溫室氣體排放量

年	堆肥 (千公噸)	有機廢棄物占比 (%)	甲烷排放係數 (g- 甲烷 /kg)	氧化亞氮排放係數 (g-N ₂ O/kg)	甲烷排放量 (公噸)	氧化亞氮排放量 (公噸)
1990	113.15	100	4	0.3	452.6	33.95
1991	5.48	100	4	0.3	21.9	1.64
1992	7.86	100	4	0.3	31.4	2.36
1993	4.61	100	4	0.3	18.5	1.38
1994	1.37	100	4	0.3	5.5	0.41
1995	6.28	100	4	0.3	25.1	1.88
1996	2.52	100	4	0.3	10.1	0.76
1997	14.17	100	4	0.3	56.7	4.25
1998	0.53	100	4	0.3	2.1	0.16
1999	19.49	100	4	0.3	78.0	5.85
2000	2.78	100	4	0.3	11.1	0.83
2001	0.22	100	4	0.3	0.9	0.06
2002	3.71	100	4	0.3	14.8	1.11
2003	22.29	100	4	0.3	89.2	6.69
2004	66.84	100	4	0.3	267.4	20.05
2005	97.54	100	4	0.3	390.1	29.26
2006	112.67	100	4	0.3	450.7	33.80
2007	144.63	100	4	0.3	578.5	43.39
2008	164.59	100	4	0.3	658.3	49.38
2009	179.31	100	4	0.3	717.2	53.79
2010	208.88	100	4	0.3	835.5	62.66
2011	261.53	100	4	0.3	1,046.1	78.46
2012	243.84	100	4	0.3	975.4	73.15
2013	226.07	100	4	0.3	904.3	67.82
2014	204.47	100	4	0.3	817.9	61.34

說明：堆肥活動數據來自中華民國環境保護統計年報




圖 7.3.1 臺灣 1990 至 2014 年生物處理甲烷排放量趨勢




圖 7.3.2 臺灣 1990 至 2014 年生物處理氧化亞氮排放量趨勢



我國亦於 1990 年立法禁止焚燒稻草，鼓勵直接掩埋可改善土壤物理、化學及生物性之效果，可於水稻收割時直接用收稻機將稻稈切割成小段當作基肥。

而 2003 年起排放量因堆肥處理量增加而逐年遞增，研判與廢棄物處理政策之施行有關。如自 2000 至 2004 年起推動資源回收政策：2001 年推動「廚餘回收與建置」，頒布「資源回收再利用法」，推動源頭減量、資源回收再利用計畫、廢棄物「零廢棄」政策。2005 至 2012 年推動資源循環政策：2005 年起推動「垃圾強制分類回收」。

2014 年甲烷、氧化亞氮等溫室氣體排放量相較 1990 年排放量增加 81%，相較 2013 年排放量減少 10%。

(5) 完整性

中華民國環境保護統計年報完整記載 1990 年至 2014 年廚餘回收之「堆肥」數據。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關廢棄物部門整體排放量不確定性，及各來源排放量不確定性之評估方法及估算結果，請另詳 7.6 節廢棄物部門溫室氣體排放量不確定度分析。

(2) 時間序列的一致性

生物處理產生甲烷與氧化亞氮排放量之估算依據，是依據中華民國環境保護統計年報，完整彙整 1990 年至 2014 年廚餘回收之「堆肥」數據，且各年期估算方法一致。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

符合方法一 (Tier 1)，為利用國家妥善管理廢棄物堆肥活動數據為基礎，以 IPCC 建議排放係數，並參考 2000 GPG，計算溫室氣體排放量。

針對本範疇之計算方式、引用參數及計算結果，業已於 104 年 5 月、10 月召開專家會議，針對計算方式、引用參數與活動數據研析其合理性進行確認。

另，參考 2000 年 IPCC 優良作法指南中「方法 1 一般清單水準品質控制程序」(如表 7.3.4)，透過交叉檢查重新計算及目測過濾，來檢核數據與引用數據來源內容是否一致；同時在對大量輸入資料進行查核過程中，為了避免檢核過程之錯誤，人工和自動檢查相結合是最有效的方法，故利用程式設計輔助人工檢核及簡化判讀等程序。

表 7.3.4 堆肥一般清單品質控制程序檢核表

品質控制活動	確認程序
檢查被記載的所選活動水準資料和排放因數的假設和標準	• 交叉檢查排放源類別資訊活動水準資料 (廚餘回收之「堆肥」數據) 和排放因數 (IPCC 建議值) 的種類並確保其正確記錄並歸檔
檢查資料登錄和參考文獻的轉錄誤差	• 確認正確引用「中華民國環境保護統計年報」結果
檢查排放計算的準確性	• 條列各項參數與活動數據，簡化運算規則，複查計算結果準確性
檢查被正確記錄的參數和排放單位及被採用的適當的轉換因數	• 確認各欄位單位標記的準確性 • 確認整個計算過程中單位使用的準確性 • 確認轉換因數的準確性 • 無時間和空間校正因數應用
檢查資料庫檔的完整性	• 簡明條列明確欄位與計算欄位
檢查排放源類別間資料的一致性	• 無引用適用多種排放源類別的資料
檢查處理過程中清單資料轉移的正確性	• 避免有轉錄情事，並加強複查檢核 • 無計算轉錄計算情事
檢查排放不確定性和轉換的正確估算和計算	• 檢查提供不確定性估算的專家判斷的獨立資格 • 檢查所記錄的資格假定和專家判斷檢查不確定性計算的完整性與準確性 • 目前版本相關參數引用 IPCC 指南建議值
開展內部檔的審評	• 詳細登錄資料來源引用與版本差異 • 檢查歸檔並存儲的清單資料支援資料和清單記錄以有利於展開詳盡的審評
檢查導致重新計算的方法和資料變化	• 確認每個排放源類別輸入資料的時間序列一致性 • 確認用於整個時間序列計算的運算法則 / 方法的一致性 • 無時間序列一致性缺漏情事
開展完全檢查	• 確認提交的評估報告涵蓋了從指定基年到當前清單時段內所有年份排放源類別
比較現有估算和原始估算	• 對於每個排放源類別應將當前的清單估算和以前的估算進行比較如果與設想情況有重大的變化或差距應重新檢查估算並分析不同之處 • 本年度並無重新計算情事

5. 特定排放源的重新計算

本年度清冊採用之計算方法、活動數據時間序列一致性完整性已查證，相關參數及活動係數之引用已說明確認，符合 2000 GPG 優良作法。下一年度如前述各年期排放估算採用之計算方法、活動數據或引用相關排放係數值有變更，才會涉及排放量之重新計算。

6. 特定排放源的改善計畫

由於堆肥處理方式及操作環境會影響溫室氣體之產生，後續如有進一步國家相關堆肥處理之方式及本土排放係數研究，可納入參考，以精進排放之估算。現行仍以採用 IPCC 預設排放細數為主。

7.4 廢棄物之焚化與露天燃燒 (5.C)

IPCC 指南針對無能源回收的廢棄物焚燒產生的排放報告應列於廢棄物部門，具能源回收廢棄物焚化之排放報告則列於能源部門。

另外除了焚化爐燃燒外，並增加露天燃燒計算，兩者計算公式相同，其中對於廢棄物焚化爐，假設燃燒效率接近於 100%，而露天燃燒的燃燒效率低得多，如果使用的廢棄物焚化氧化係數低於 100%，就要對其詳細記錄及提供資料來源。

7.4.1 廢棄物焚化 (5.C.1)

1. 排放源及匯分類的描述

廢棄物焚燒可能產生二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，由於焚燒爐內燃燒高溫 and 長停留時間的關係，甲烷排放

量很少。有關廢棄物焚燒之溫室氣體，主要估算廢棄物焚化產生二氧化碳和氧化亞氮之排放。

依據 2006 IPCC 指南說明針對無能源回收的廢棄物焚燒產生的排放報告屬廢棄物部門，而有能源回收廢棄物焚化之排放報告則應歸屬能源部門；另僅需計算礦物碳產生之溫室氣體排放量。

據此，廢棄物焚化之活動數據除依據國家環境保護年報之家庭垃圾焚化處理量、一般事業廢棄物處理量則認為其亦以焚化處理，兩種加總計算總焚化量，再由我國從 1997 年大型焚化爐加入發電機制之焚化排放量予以扣除，以避免與能源部門重複計算。

如上述說明，廢棄物焚化之活動數據是參閱中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 92 年至 103 年，引用 (四) 廢棄物管理表 4-1 垃圾清理狀況，其中關於垃圾清運之「焚化」數據，與引用表 4-2 事業廢棄物申報統計之「委託或共同處理」及「自行處理」，兩者加總，及扣除表 4-9 大型垃圾焚化廠操作營運情形之「焚化(處理)量」。

如圖 7.4.1 所示，1997 年至 2000 年焚化爐加入發電機制之焚化量大幅增加，而 2001 年至 2014 年仍呈現逐年增加趨勢；其中發電焚化比例，2001 年至 2007 年焚化發電比例低於 80%，1997 年、1999 年、2008 年起均大於 88%。

另 IPCC 規範在焚化燃燒方面，僅需計算化石碳之溫室氣體排放量，因此需確認垃圾之成分組成，故參閱中華




圖 7.4.1 臺灣 1990 至 2014 年發電焚化量近年變化趨勢

民國環境保護統計年報 - 中華民國 89 年至 103 年，引用表 4-6 垃圾性質，其中關於可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」百分比數據；其中「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」僅有中華民國 91 年至 103 年。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

A. 廢棄物焚化處理產生二氧化碳排放量計算

依據 IPCC 計算方式，石化燃料及其產品（例如塑膠、某些織物、橡膠、液體溶劑、廢油）列入廢棄物焚化排放計算，而來自生物質（紙張、食品廢物和木料）的碳則不包括在內，另外廢棄物焚化回收能源利用之排放，則歸屬能源部門。計算公式主要根據公式 7.4.1.1 計算。

公式 7.4.1.1：

$$CO_2 \text{ 排放 (Gg/yr)} = \sum_i (SW_i \times dm_i \times CF_i \times FCF_i \times OF_i \times 44 / 12)$$

SW_i ：廢棄物總燃燒量（濕重）（Gg/yr）

dm_i ：廢棄物乾物質比例（濕重）（%）

CF_i ：廢棄物乾物質之總碳比例（總碳含量）（%）

FCF_i ：廢棄物乾物質之總碳比例之礦物碳比例（%）

OF_i ：氧化比例（燃燒效率）（%）

44/12：從 C 到 CO_2 的轉換係數

i = 焚化 / 露天燃燒廢棄物類型，如一般廢棄物、事業及醫療廢棄物

B. 廢棄物焚化處理產生氧化亞氮排放量計算

在 N_2O 排放方面，IPCC 指南計算方法如公式 7.4.1.2 所示。

公式 7.4.1.2：

$$N_2O \text{ (Gg / yr)} = \sum_i (IW_i \times EF_i) \times 10^6$$

IW_i ：廢棄物總燃燒量（Gg/yr）

EF_i ： N_2O 排放係數（kg N_2O /Gg 廢棄物）

(2) 排放係數

於 IPCC 指南提供各國焚化爐焚化的氧化亞氮排放係數如表 7.4.1 所示。

參閱 IPCC 建議指南公式 7.4.1.1 與公式 7.4.1.2 計算焚化處理產生之溫室氣體排放量，主要包括二氧化碳和氧化亞氮，相關參數詳列於表 7.4.2 與表 7.4.3。

二氧化碳係依據垃圾成分組成換算含移除量與礦物碳比例計算，氧化亞氮由於焚化爐多屬於連續式鍋爐，因此採用日本連續式爐體排放係數 47g N_2O /T 計算。

表 7.4.1 2006 IPCC 指南焚化處理氧化亞氮排放係數

國家	焚化 / 技術類型		MSW 排放係數 (g N_2O /t 焚化的 MSW)	計算基準
日本	連續焚化	階床式爐體	47	濕重
		流體化床	67	濕重
	半連續焚化	階床式爐體	41	濕重
		流體化床	68	濕重
	分批類焚化	階床式爐體	56	濕重
			221	濕重
德國			8	濕重
荷蘭			20	濕重
奧地利			12	濕重

資料來源：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 5, waste, P.5-21, table 5.4.

表 7.4.2 IPCC 焚化處理二氧化碳排放計算一覽表

	IPCC 指南計算方法或預設值	臺灣計算方法及採用數據	國內數據來源
廢棄物總燃燒量 (IW _i)	國內資料自行確定	依據國內生活垃圾燃燒量與一般事業垃圾處理量，作為全國燃燒廢棄物量。由於大型焚化爐會產生能源發電須扣除其垃圾量，其餘垃圾量燃燒計入廢棄物部門。	中華民國環境保護年報
廢棄物乾物質比例 (d _m _i)	國內資料自行確定	依據國內垃圾分析含水量計算乾物質含量。	中華民國環境保護年報
廢棄物乾物質之總碳比例 (C _F _i)	提供各種物質之總碳比例預設值	依據臺灣垃圾組成與 IPCC 公布含移除量計算。	中華民國環境保護年報
廢棄物乾物質之總碳比例之礦物碳比例 (FC _F _i)	提供各種物質之礦物碳比例預設值	依據國內研究資料與 IPCC 公布各種物質之化石碳比例計算。	國內研究資料
氧化比例 (O _F _i)	未公布	依據 IPCC 預設值 100% 計算	

資料來源：IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, table 5.4, 2006.

(3) 活動數據

廢棄物焚化之活動數據是參閱中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 92 年 ~103 年，引用 (四) 廢棄物管理表 4-1 垃圾清理狀況，其中關於垃圾清運之「焚化」數據，與引用表 4-2 事業廢棄物申報統計之「委託或共同處理」及「自行處理」，及表 4-9 大型垃圾焚化廠操作營運情形之「焚化(處理)量」，並參閱引用表 4-6 垃圾性質，其中關於可燃分之「紙類」、「纖維布類」、「皮革橡膠類」、「廚餘類」、「木竹稻草落葉類」、「塑膠」、「其他」、「水分」及「化學分析含移除量」百分比數據，估算「廢棄物乾物質比例」、「含移除量比例」及「礦物碳比例」(如表 7.4.4 所示)。

(4) 排放量

依據公式 7.4.1.1、公式 7.4.1.2 及焚化相關活動數據與參數，估算廢棄物焚化處理產生溫室氣體排放量，結果如表 7.4.4 及圖 7.4.2、圖 7.4.3 所示。

廢棄物焚化處理二氧化碳排放估算結果顯示，由於大型焚化爐加入發電機制，修正排放量百分比於 2009 年後均大於 88%，2013 年更達 99.7%，2014 年則為 94.3%，因而 2014 年二氧化碳排放量約為 1990 年 4.4 倍，相較 2012 年亦增加 49%；在氧化亞氮排放部分，2014 年扣除焚化發電排放量之後，氧化亞氮排放量約為 1990 年 5 倍，相較 2012 年增加 53%。

表 7.4.3 2006 IPCC 指南焚化處理氧化亞氮排放計算一覽表

	IPCC 指南計算方法或預設值	臺灣計算方法及採用數據	國內數據來源
廢棄物總燃燒量 (IWi)	國內資料自行確定	依據國內生活垃圾燃燒量與一般事業垃圾處理量，作為全國燃燒廢棄物量。 由於大型焚化爐會產生能源發電須扣除其垃圾量，其餘垃圾量燃燒計入廢棄物部門。	中華民國環境保護年報
N2O 排放係數 (EF)	公布相關焚化設施之氧化亞氮排放係數範圍值	依據國內現況多數屬於連續式鍋爐，因此引用 IPCC 提供設施中，日本連續式爐體排放係數 47g N ₂ O/T 計算。	IPCC 公布值

表 7.4.4 2006 IPCC 指南焚化處理之各類溫室氣體活動數據及與排放量

年	廢棄物焚化量 (千公噸)	一般事業廢棄物處理量 (千公噸)	大型焚化爐焚化量 (千公噸)	含水分 (%)	含移除量比率 (CCW) (%)	礦物碳比率 (FCF) (%)	焚化爐燃燒效率 (EF) (%)	氧化亞氮排放係數 (g-N ₂ O/t)	二氧化碳排放量 (Gg)	氧化亞氮排放量 (公噸)
1990	77.7	-	-	51.97	31.75	47.08	100	47	20.47	3.65
1991	28.8	-	-	51.97	31.75	51.35	100	47	8.28	1.36
1992	255.4	-	-	51.97	31.75	45.51	100	47	64.99	12.00
1993	249.0	-	-	51.06	33.37	42.30	100	47	63.09	11.71
1994	412.5	-	-	53.21	35.86	43.39	100	47	110.11	19.39
1995	1,301.0	-	-	48.14	38.64	41.62	100	47	397.88	61.15
1996	1,364.6	-	-	50.60	37.53	41.68	100	47	386.61	64.14
1997	1,691.6	-	1,419.3	46.03	44.41	43.84	100	47	104.90	12.80
1998	1,741.1	-	1,335.4	51.06	36.17	44.29	100	47	116.65	19.07
1999	2,020.6	-	1,789.1	50.76	37.17	41.80	100	47	64.95	10.88
2000	3,229.7	-	2,659.7	45.02	46.91	48.05	100	47	259.04	26.79
2001	3,736.9	2,330.1	3,922.4	55.80	32.69	47.52	100	47	539.90	100.80
2002	4,316.0	2,873.9	5,311.0	51.24	39.91	45.66	100	47	612.13	88.31
2003	4,304.6	2,869.8	5,470.7	55.69	33.60	44.88	100	47	417.30	80.07
2004	4,307.7	2,952.1	5,611.5	51.19	40.24	43.17	100	47	512.42	77.47
2005	4,300.4	3,270.7	5,614.9	54.03	33.28	31.70	100	47	347.78	91.94
2006	4,164.0	3,693.6	5,683.0	52.41	39.27	31.52	100	47	469.62	102.21
2007	4,335.8	3,734.7	5,948.8	51.55	41.59	35.85	100	47	562.05	99.72
2008	4,137.3	3,444.2	6,110.8	50.94	47.39	35.35	100	47	443.22	69.12
2009	4,036.4	2,671.0	6,092.9	54.19	41.58	35.96	100	47	154.29	28.88
2010	3,888.6	3,119.7	6,235.4	52.66	43.49	35.68	100	47	208.19	36.33
2011	3,468.6	3,397.5	6,355.4	55.06	39.41	34.67	100	47	114.98	24.00
2012	3,277.3	3,381.0	6,405.0	53.97	41.43	34.43	100	47	60.97	11.90
2013	3,208.7	3,281.4	6,471.8	54.08	41.16	35.16	100	47	4.47	0.86
2014	3,189.5	3,618.5	6,420.4	55.17	39.93	35.71	100	47	90.82	18.21

資料來源：行政院環境保護署，中華民國環境保護統計年報，2015。
備註：廢棄物組成皆為一般垃圾組成。

(5) 完整性

估算焚化溫室氣體排放活動數據，主要依據中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 92 年至 103 年，引用垃圾清理狀況關於垃圾清運之「焚化」數據，與事業廢棄物申報統計之「委託或共同處理」及「自行處理」活動量，及大型垃圾焚化廠操作營運情形之「焚化（處理）量」，均已完整登載 1990 年至 2014 年活動量。另參閱引用表 4-6 垃圾性質百分比數據估算「含移除量比例」及「礦物碳比例」，僅有 1992 年至 2012 年，缺少 1990 年及 1991 年活動數據，處理方式詳時間序列的一致性。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關廢棄物部門整體排放量不確定性，及各來源排放量不確定性之評估方法及估算結果，請另詳 7.6 節廢棄物部門溫室氣體排放量不確定度分析。

(2) 時間序列的一致性

估算廢棄物焚化處理產生二氧化碳與氧化亞氮排放量計算參數與活動數據來源，引用中華民國環境保護統計年報登載 1990 年至 2014 年垃圾清運之「焚化」數據、事業廢棄物申報統計之「委託或共同處理」及「自行處理」數據、大型垃圾焚化廠操作營運情形之「焚化（處理）量」，然登載數據缺少 1990 年與 1991 年垃圾性質百分比數據，故假設這兩年數據與 1992 年垃圾性質百分比數據相同，以進一步估算該兩年「含移除量比例」及「礦物碳比例」，完整建立各年期排放估算所需之相關活動數據及排放參數之一致性與完整性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

符合方法一（Tier 1），為利用國家垃圾清運之「焚化」數據、事業廢棄物申報統計之「委託或共同處理」及「自行處理」數據、大型垃圾焚化廠操作營運情形之




圖 7.4.2 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物焚化二氧化碳排放量趨勢




圖 7.4.3 臺灣 1990 至 2014 年廢棄物焚化氧化亞氮排放趨勢

「焚化（處理）量」與垃圾性質百分比等活動數據為基礎，以 IPCC 建議排放係數，參考 2000 GPG，計算溫室氣體排放量。

針對本範疇之計算方式、引用參數及計算結果，業已於 2015 年 5 月、10 月召開專家會議，針對計算方式、引用參數與活動數據研析其合理性進行確認。

另參考 2000 GPG 指南中「方法 1 一般清單水準品質控制程序」（如表 7.4.5），透過交叉檢查重新計算及目測過濾，來檢核數據與引用數據來源內容是否一致；同時在對大量輸入資料進行查核過程中，為了避免檢核過程之錯誤，人工和自動檢查相結合是最有效的方法，故利用程式設計輔助人工檢核及簡化判讀等程序。

5. 特定排放源的重新計算

本年度清冊採用之計算方法、活動數據時間序列一致性完整性已查證，相關參數及活動係數之引用已說明確認，符合 2000 GPG 優良作法。下一年度如前述各年期排放估算採用之計算方法、活動數據或引用相關排放係數值有變更，才會涉及排放量之重新計算。

6. 特定排放源的改善計畫

國內大型焚化爐皆有回收能源發電，其焚化排放歸屬能源部門，不列入廢棄物部門，廢棄物部門僅納入不具能源回收之焚化排放，而現行不具能源回收之焚化處理量係由環境保護年報間接計算，近年（2011 至 2013）有劇降情形，致溫室氣體排放量變動過大，環境署擬評估直接以焚化處理量較為穩定之中小型爐事業廢棄物焚化量，以調整近年排放量驟降情形。

7.4.2 廢棄物露天燃燒（5.C.2）

依據國內廢棄物露天燃燒垃圾現況，僅有農業廢棄物有此情形，歸屬農業部門，廢棄物部門並無其他廢棄物以露天燃燒處理情形。

7.5 廢水處理與放流（5.D）

污廢水若經無氧處理會產生甲烷和氧化亞氮排放；廢水處置產生的二氧化碳排放放在《IPCC 指南》認為是生物成因，不須計算納入國家排放總量（如植物光合作用減少二氧化碳亦未納入）。

表 7.4.5 廢棄物焚化一般清單品質控制程序檢核表

品質控制活動	確認程序
檢查被記載的所選活動水準資料和排放因數的假設和標準	• 交叉檢查排放源類別資訊活動水準資料（垃圾清運之「焚化」數據、事業廢棄物申報統計之「委託或共同處理」及「自行處理」數據、大型垃圾焚化廠操作營運情形之「焚化（處理）量」、垃圾組成）和排放因數（IPCC 建議值）的種類並確保其正確記錄並歸檔
檢查資料登錄和參考文獻的轉錄誤差	• 確認正確引用「中華民國環境保護統計年報」結果
檢查排放計算的準確性	• 條列各項參數與活動數據，簡化運算規則，複查計算結果準確性
檢查被正確記錄的參數和排放單位及被採用的適當的轉換因數	• 確認各欄位單位標記的準確性 • 確認整個計算過程中單位使用的準確性 • 確認轉換因數的準確性 • 檢核 1990 年及 1991 年垃圾性質百分比數據，確認假設數據與 1992 年垃圾性質百分比數據相同
檢查資料庫檔的完整性	• 簡明條列明確欄位與計算欄位
檢查排放源類別間資料的一致性	• 確認引用適用多種排放源類別的活動水準資料常數與參數之一致性與複檢結果
檢查處理過程中清單資料轉移的正確性	• 複查檢核「含移除量比例」及「礦物碳比例」，確認轉錄結果無誤
檢查排放不確定性和轉換的正確估算和計算	• 檢查提供不確定性估算的專家判斷的獨立資格 • 檢查所記錄的資格假定和專家判斷檢查不確定性計算的完整性與準確性 • 目前版本相關參數引用 IPCC 指南建議值
開展內部檔的審評	• 詳細登錄資料來源引用與版本差異 • 檢查歸檔並存儲的清單資料支援資料和清單記錄以有利於展開詳盡的審評
檢查導致重新計算的方法和資料變化	• 確認每個排放源類別輸入資料的時間序列一致性 • 確認用於整個時間序列計算的運算法則 / 方法的一致性 • 無時間序列一致性缺漏情事
開展完全檢查	• 確認提交的評估報告涵蓋了從指定基年到當前清單時段內所有年份排放源類別
比較現有估算和原始估算	• 對於每個排放源類別應將當前的清單估算和以前的估算進行比較如果與設想情況有重大的變化或差距應重新檢查估算並分析不同之處 • 本年度並無重新計算情事



IPCC 指南針對廢水處理可能產生之造成甲烷和氧化亞氮排放潛勢如表 7.5.1 所示，相較於 1996 IPCC 指南，主要增加了估算未收集廢水的甲烷排放、高級廢水處理廠（三級處理）的氧化亞氮排放，並簡化事業廢水排放量計算，僅需要包括最重要的事業來源。針對各項排放來源計算說明如下。

廢水處理產生溫室氣體排放量可分為「生活及住商污水（5.D.1）」與「事業廢水（5.D.2）」。生活污水和事業廢水處理系統中甲烷排放估算是分開的，因為不同來源廢水活動資料和排放係數並不相同，故分別計算其甲烷產生量。

主要影響甲烷生成量的因子為污水中可分解有機碳的含量，在生活與住商污水中，以生物分解的碳含量（Biochemical oxygen demand, BOD）為指標，在事業廢水中則以所有可氧化分解碳含量（Chemical Oxygen Demand, COD）為指標。

甲烷生成量主要取決於廢水中的可降解有機材料量、溫度以及處理系統的類型。當溫度增加時，甲烷產生的速率增大，這在無控制系統和溫暖氣候中尤其重要。低於 15°C，甲烷生成量可能不大，因為甲烷微生物活性不大，而化糞池主要用作沉積池，如果溫度上升到 15°C 以上，則可能繼續產生甲烷。

氧化亞氮與廢水中的氮成分降解有關，如尿素、硝酸鹽和蛋白質。生活污水集中廢水處理系統清除氮化合

物可能包括各種過程，從化糞池處理技術到高級（三級）處理技術。現有氮的硝化作用和脫硝作用均可能產生氧化亞氮直接排放。

硝化作用是一個將氨和其他氮化合物轉化成硝酸鹽（NO₃⁻）的耗氧過程，而脫硝作用發生在缺氧條件下，即硝酸鹽轉化成氮氣（N₂）的生物學轉化。氧化亞氮可能成為這兩個過程的中間產物，通常與脫硝作用的關聯較大。

7.5.1 生活污水處理與放流（5.D.1）

1. 排放源及匯分類的描述

生活與商業污水主要產生的溫室氣體為甲烷與氧化亞氮，其中一般生活與住商之污水經化糞池厭氧反應處理後，產生甲烷排放；而生活污水中之蛋白質等有機物質，在水體環境中發生硝化脫硝反應而產生氧化亞氮。

2. 方法論議題

（1）計算方法

A. 生活污水處理產生甲烷排放量計算

由於生活住商污水之處理方式可分為經化糞池處理和污水下水道送至污水處理廠處理等兩大類。估算生活污水之甲烷排放量引用內政部營建署公布之「全國污水下水道用戶接管普及率及整體污水處理率統計表」之公共污水下水道系統普及率（%）、專用污水下水道系統普及率（%）、建築物污水下水道系統普及率（%）及整體合計之污水處理率（%），可分別計算未收集污水經化糞

表 7.5.1 廢水處理系統甲烷及氧化亞氮排放潛勢

處理及排放類型		甲烷及氧化亞氮排放潛勢			
收集	未處理	河流排放		不流動且溶氧不足的河流和湖泊，水中有機污染物可能厭氧分解，產生甲烷。河流、湖泊和港灣，可能成為氧化亞氮排放源。	
		下水道（封閉的和地下的）		不是甲烷 / 氧化亞氮排放來源。	
		下水道（露天）		滯流、超負荷的露天收集下水道或溝渠 / 水道，可能成為甲烷排放的重要來源。	
	已處理	好氧處理	集中好氧廢水處理廠		可能由好氧槽之厭氧區域，產生些微甲烷。設計或操作管理不良之好氧處理系統，會產生甲烷。具去除營養鹽之高級污水處理廠（硝化、脫硝反應），雖規模小，但也是氧化亞氮排放來源之一。
			集中好氧廢水處理廠的污泥厭氧處理		污泥厭氧處理排放之甲烷，若未採取回收或燃燒處理，可能成為甲烷重要排放來源。
		厭氧處理	好氧淺池塘		一般而言，不太可能成為甲烷 / 氧化亞氮主要排放來源。設計或管理不良之好氧處理系統，會產生甲烷。
			厭氧化糞池		可能是甲烷的排放來源。不是氧化亞氮的排放源。如果排放的甲烷未被回收或燃燒處理，可能成為甲烷重要排放來源。
未收集	化糞槽		經常清除沉澱污泥，可降低甲烷產生量。		
	露天坑 / 廁所		當溫度和停留時間適當，則可能產生甲烷。		

資料來源：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 5, waste, P.6-8, table 6.1.

池處理與收集污水經污水廠處理之比例，再與內政部統計處之內政統計年報中國內人口數及每人每日產生 BOD 值計算甲烷排放量。

IPCC 指南針對生活與住商污水甲烷排放計算如公式 7.5.1.1 所示。主要以不同收入級距人口比例，採用污水處理系統類型，加總各類處理系統甲烷排放量。

公式 7.5.1.1：

$$\text{甲烷排放量 (kg CH}_4\text{/yr)} = \sum (U_i \times T_{ij} \times Bo \times \text{MCF}_j) \times (P \times \text{BOD} \times I - S) - R$$

U_i ：不同年收入級距之比例

T_{ij} ：不同年收入級距之污水處理程度比例

Bo ：最大甲烷產生量 (maximum CH_4 producing capacity), $\text{kg CH}_4/\text{kg BOD}$

MCF_j ：甲烷修正係數 (methane correction factor)

P ：全國人口數

I ：與事業廢水共排之修正係數，若有合併收集預設值為 1.25，未含事業廢水之預設值則為 1.0

BOD ：每人每年產生之可分解有機物量 ($\text{kg BOD}/\text{persons/yr}$)

S ：污泥移除量, $\text{kg BOD}/\text{yr}$

R ：甲烷回收量, $\text{kg CH}_4/\text{yr}$

B. 生活污水排放產生氧化亞氮排放量計算

估算氧化亞氮之排放量，係依據 IPCC 清冊指南計算方法如公式 7.5.1.2 所示。參照農業委員會糧食平衡表之每人每日蛋白質供給量，並配合歷年國內人口數進行計算。另需考量廢水中非消耗之蛋白質，以及是否與事業廢水共排等參數。

公式 7.5.1.2：

$$\text{N}_2\text{O (kg/yr)} = (P \times \text{Protein} \times \text{Frac}_{\text{NPR}} \times \text{F}_{\text{NON-CON}} \times \text{F}_{\text{IND-COM}} - \text{N}_{\text{SLUDGE}}) \times \text{EF}_{\text{EFFLUENT}} \times 44/28$$

$$\text{N}_{\text{EFFLUENT}} = (P \times \text{Protein} \times \text{Frac}_{\text{NPR}} \times \text{F}_{\text{NON-CON}} \times \text{F}_{\text{IND-COM}} - \text{N}_{\text{SLUDGE}})$$

$\text{N}_{\text{EFFLUENT}}$ ：廢水含氮之總量

P ：國內人口

Protein ：每人每年蛋白質攝取量 (kg/person/yr)

Frac_{NPR} ：蛋白質中氮的比例 (預設值為 $0.16 \text{ kg N/kg protein}$)

$\text{F}_{\text{NON-CON}}$ ：添加於廢水之非消耗蛋白質係數，已開發國家預設值為 1.4，發展中國家為 1.1

$\text{F}_{\text{IND-COM}}$ ：下水道系統含有事業廢水共排之修正係數，有共排者預設值為 1.25

N_{SLUDGE} ：污泥移除 N 量 (預設值 = 0) (kg N/yr)

$\text{EF}_{\text{EFFLUENT}}$ ：排放係數 (預設值 0.005) ($\text{kg N}_2\text{O-N/kg-N}$)

44/28： $\text{kg N}_2\text{O-N}$ 換算成 $\text{kg N}_2\text{O}$ 轉換係數

(2) 排放係數

A. 生活污水處理甲烷排放

依公式 7.5.1.1 各項參數，依生活污水處理人口比例及採用不同類型污水處理系統，有不同之最大甲烷產生量排放比例 (MCF 值)，IPCC 公布各種污水處理系統之 MCF 值如表 7.5.2 所示。

另外生活污水如果和事業廢水共同處理，則須納入考量，增加下水道含額外事業廢水 BOD 排放之修正係數 (I)，以及考量處理設施如有甲烷回收者 (R)，可以扣除排放量等。其中，最大甲烷產生量 Bo (Maximum methane producing capacity)，依 IPCC 建議以 $0.60 \text{ CH}_4/\text{kg BOD}$ 計算。甲烷修正係數 (MCF)：國內污水處理廠皆採好氧處系統，使用 IPCC 公布之好氧處理管理良好之污水處理廠，MCF 以 0 計算，即無厭氧處理產生甲烷排放。化糞池處理系統，採用 IPCC 公布之化糞池系統 MCF 以 0.5 計算。

表 7.5.2 生活污水處理系統預設之 MCF 值

處理系統	註釋	甲烷修正係數 (MCF)	範圍
未經處理的系統			
海洋、河、湖排放	河水若高有機可能會發生輕微厭氧反應。	0.1	0-0.2
不流動的下水道	空況且溫暖。	0.5	0.4-0.8
流動順暢的下水道	乾淨且快速流動 (甲烷總量微小且來自泵站)。	0.0	0.0
經處理的系統			
好氧處理 (集中的處理區)	必須被管理好，一些甲烷會從沉澱池或其他單元中排出。	0.0	0-0.1
好氧處理 (集中的處理區)	不是妥善的管理 (超載)。	0.3	0.2-0.4
污泥厭氧消化處理	不考慮回收甲烷。	0.8	0.8-1.0
厭氧反應	不考慮回收甲烷。	0.8	0.8-1.0
淺厭氧塘	深度小於兩公尺，使用專家的判斷。	0.2	0-0.3
深厭氧塘	深度大於兩公尺。	0.8	0.8-1.0
化糞池系統	1/2 的 BOD 為厭氧反應。	0.5	0.5
公共廁所	乾燥的氣候，地表水面低於公廁，小家庭 (3 至 5 人)。	0.1	0.05-0.15
公共廁所	乾燥的氣候，地表水面低於公廁，鄉鎮 (許多人)。	0.5	0.4-0.6
公共廁所	潮濕的氣候，地表水面高於公廁。	0.7	0.7-1.0
公共廁所	堆肥定期移除	0.1	0.1

資料來源：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 5, waste, P.6-13, table 6.3.

依據 IPCC 建議指南公式 7.5.1.1 計算生活污水產生甲烷排放量，相關參數選用詳列於表 7.5.3。

B. 生活污水放流氧化亞氮排放

生活與住商污水氧化亞氮排放依據公式 7.5.1.2 計算，相關參數選用詳列於表 7.5.4。排放係數以 IPCC 參數 0.005 (kg N₂O-N/kg-N) 計算；由於我國為開發中國家，關於廢水之非消耗蛋白質係數 (F_{NON-CON}) 使用 IPCC 預設值 1.1 計算；我國生活污水處理系統未與事業廢水有共排之情形，因此採用未共排之排放係數 1。

(3) 活動數據

A. 生活污水處理甲烷排放

根據 IPCC 指南針對生活污水甲烷排放計算，依鄉村人口、城市高收入人口和城市低收入人口等不同類型人口分類，再依類別採用處理設施類型而有不同之 MCF 值。

檢視國內現況生活污水之處理方式，可分為未收集經化糞池處理，和納管收集經污水下水道送至污水處理

廠（含公共污水下水道、專用污水下水道、建物污水處理設施）處理等兩大類。依內政部營建署下水道系統污水處理率作為生活污水經污水處理廠處理之比例，其餘未納管收集之生活污水則以化糞池處理計算。

內政部營建署下水道系統污水處理率的計算方式，原依據 2002 年 11 月 12 日營建署邀行政院主計處、經建會、環保署、縣市政府、學者專家召開「污水下水道普及率相關參數及計算公式座談會」研商共識，各縣市接管戶數除以總戶數（各縣市戶政資料總人口除以假設每戶 4 人）；2014 年開始改接管人數計算普及率，即各縣市接管戶數乘以各縣市戶量（人/戶）除以各縣市總人口數而得。

為求下水道系統普及率數據一致性，2013 年前之下水道系統普及率計算方式比照 2014 年，收集歷年全國戶數與人口數，依據內政部營建署規定之計算方式回推，計算結果如表 7.5.5 所示之「實際處理率」。

表 7.5.3 IPCC 生活污水處理甲烷排放計算一覽表

	IPCC 計算方法或預設值	臺灣計算方法及採用數據	國內數據來源
人口數 (P)	國內資料自行確定	內政部統計資料。	人口數取內政部統計資料
污水處理程度	依據鄉村、城市高低收入分類計算	內政部營建署用戶接管普及率及污水處理率，並利用戶籍數換算處理效率	內政部營建署統計資料 內政部統計處之戶籍數
每人每年產生之可分解有機物量 (BOD)	14.6 (kg/人/yr)	採用 IPCC 預設值 14.6 (kg/人/yr)。	IPCC 預設值
最大甲烷生成量 (Bo)	0.60kg CH ₄ /kg BOD	採用 IPCC 預設值 0.60 kg CH ₄ /kg BOD。	IPCC 預設值
甲烷修正係數 (MCF)	提供各種處理系統預設值	1. 污水處理廠：使用 IPCC 公布之好氧處理管理良好，以定義值 0 計算。其處理產生之污泥，因厭氧處理之廢氣皆進行燃燒處理，因此皆以 0 計算。 2. 化糞池：使用 IPCC 公布之化糞池系統 0.5 計算。	IPCC 預設值
下水道含額外事業廢水 BOD 之修正係數 (I)	有合併事業廢水者預設值為 1.25，其餘為 1。	因污水處理廠現行依 IPCC 方式，以 0 計算；生活污水主要計算為化糞池產生之甲烷量，不會有事業廢水共同排放，採取 IPCC 公布值 1 計算	IPCC 預設值
污泥移除量 (S)	預設值 0	採 IPCC 預設值 0 計算。	IPCC 預設值
甲烷回收量 (R)	預設值 0	因國內化糞池並無回收甲烷氣，採 IPCC 預設值 0 計算。	IPCC 預設值

表 7.5.4 IPCC 生活污水放流氧化亞氮排放計算一覽表

處理系統	註釋	甲烷修正係數 (MCF)	範圍
人口數 (P)	國內資料自行確定	內政部統計資料。	人口數取內政部統計資料
每人每年蛋白質攝取量 (Protein)	國內資料自行確定	取自糧食平衡表內所提供之每人蛋白質供應量	行政院農業委員會之糧食平衡表
蛋白質含氮比例 (FracNPR)	0.16 kg N/protein	採用 IPCC 預設值 0.16 kg N/kg protein	IPCC 預設值
排放係數	0.005kg N ₂ O-N/ kg N (須再計算 N ₂ O/N 比例)	採用 IPCC 預設值 0.005 kg N ₂ O-N/ kg N	IPCC 預設值
添加於廢水之非消耗蛋白質係數 (F _{NON-CON})	已開發國家預設值 1.4 開發中國家預設值 1.1	採用 IPCC 開發中國家預設值 1.1 計算。	IPCC 預設值
事業廢水共排之排放係數 (F _{IND-CIN})	共排者預設值 1.25，其餘為 1	採用 IPCC 未共排之係數 1 計算。	IPCC 預設值
因污泥而產生之氮移除量 (N _{SLUDGE})	預設值 0	採用 IPCC 預設 0 計算。	IPCC 預設值

每年生活污水 BOD 產生量，則依據內政部統計處內政統計年報 - 國內人口數與與 IPCC 預設每人每年產生 BOD 值 14.6 (kg/人/yr) 計算。

B. 生活污水放流氧化亞氮排放

估算氧化亞氮之排放量，參照歷年農業委員會糧食平衡表之每人每日蛋白質供給量，並配合國內歷年人口數進行計算，如表 7.5.1.5 所示。

(4) 排放量

A. 生活污水處理甲烷排放

生活與住商污水處理產生之甲烷排放量依據公式 7.5.1.1 計算，結果如表 7.5.5 及圖 7.5.1 所示。分析歷年排放趨勢，由於 1999 年起接管普及率增加，厭氧處理排放逐年降低，至 2014 年排放量相較 1990 年排放量減少 40%，相較 2013 年排放量減少 3%。

表 7.5.5 臺灣 1990 至 2014 年生活污水甲烷排放之活動數據與排放量

年	接管戶數	全國戶數	污水處理率 (%)	實際處理率 (%)	BOD	最大甲烷生成量 (Bo)	甲烷修正係數 (MCF)	下水道含額外事業廢水之修正係數 (I)	污泥移除量 (S)	甲烷回收量 (R)	廢水甲烷排放量 (Gg)
1990	153,010	5,926,126	3	2.6	14.6	0.6	0.5	1	0	0	87.05
1991	154,544	5,985,536	3	2.6	14.6	0.6	0.5	1	0	0	87.92
1992	158,620	6,042,699	3.05	2.6	14.6	0.6	0.5	1	0	0	88.72
1993	162,714	6,098,701	3.1	2.7	14.6	0.6	0.5	1	0	0	89.51
1994	166,776	6,151,701	3.15	2.7	14.6	0.6	0.5	1	0	0	90.24
1995	170,859	6,203,858	3.2	2.8	14.6	0.6	0.5	1	0	0	90.97
1996	182,966	6,252,659	3.4	2.9	14.6	0.6	0.5	1	0	0	91.52
1997	206,557	6,315,804	3.8	3.3	14.6	0.6	0.5	1	0	0	92.12
1998	307,000	6,369,768	5.6	4.8	14.6	0.6	0.5	1	0	0	91.42
1999	660,010	6,532,466	11.95	10.1	14.6	0.6	0.5	1	0	0	86.99
2000	981,287	6,681,685	17.62	14.7	14.6	0.6	0.5	1	0	0	83.24
2001	1,105,155	6,802,281	19.73	16.2	14.6	0.6	0.5	1	0	0	82.19
2002	1,251,592	6,925,019	22.23	18.1	14.6	0.6	0.5	1	0	0	80.81
2003	1,351,187	7,047,168	23.91	19.2	14.6	0.6	0.5	1	0	0	80.02
2004	1,576,894	7,179,943	27.8	22.0	14.6	0.6	0.5	1	0	0	77.55
2005	1,795,445	7,292,879	31.54	24.6	14.6	0.6	0.5	1	0	0	75.18
2006	2,019,425	7,394,758	35.31	27.3	14.6	0.6	0.5	1	0	0	72.84
2007	2,280,913	7,512,449	39.74	30.4	14.6	0.6	0.5	1	0	0	70.03
2008	2,515,068	7,655,772	43.67	32.9	14.6	0.6	0.5	1	0	0	67.75
2009	2,812,520	7,805,834	48.66	36.0	14.6	0.6	0.5	1	0	0	64.78
2010	3,070,139	7,937,024	53.02	38.7	14.6	0.6	0.5	1	0	0	62.21
2011	3,367,032	8,057,761	57.99	41.8	14.6	0.6	0.5	1	0	0	59.22
2012	3,671,659	8,186,432	62.99	44.9	14.6	0.6	0.5	1	0	0	56.32
2013	3,892,859	8,286,260	66.62	47.0	14.6	0.6	0.5	1	0	0	54.26
2014	4,093,494	8,382,699	69.87	48.9	14.6	0.6	0.5	1	0	0	52.44




圖 7.5.1 臺灣 1990 至 2014 年生活污水處理甲烷排放趨勢

**B. 生活污水放流氧化亞氮排放**

生活污水放流氧化亞氮排放量，結果如表 7.5.6 及圖 7.5.2 所示。影響氧化亞氮排放主要為人口遞增、蛋白質攝取量變化；2014 年亞氮排放量相較 1990 年增加 11%，而與 2013 年排放量增加 3%。

(5) 完整性**A. 生活污水處理甲烷排放**

內政部統計年報之公共污水下水道系統普及率(%)、專用污水下水道系統普及率(%)、建築物污水處理設施統普及率(%)及三者合計之污水處理率(%)，

表 7.5.6 臺灣 1990 至 2014 年生活污水放流氧化亞氮之活動數據與排放量

年	每人每日蛋白質供給量(公克)	每人每年蛋白質供給量(Pretein)(公斤)	蛋白質含氮比(F _{NPR})	國內人口數(P)(千人)	排放係數(EF)	對非蛋白質飽和廢水之添加係數(F _{NON-CON})	事業廢水共排之排放係數(F _{IND-CIN})	因污泥而產生之氮移除量(N _{SLUDGE})	全國人口氧化亞氮排放量(公噸)
1990	92.72	33.84	0.16	20,401	0.005	1.1	1	0	954.7
1991	91.56	33.42	0.16	20,606	0.005	1.1	1	0	952.3
1992	93.90	34.27	0.16	20,803	0.005	1.1	1	0	985.8
1993	97.34	35.53	0.16	20,995	0.005	1.1	1	0	1,031.6
1994	96.51	35.23	0.16	21,178	0.005	1.1	1	0	1,031.7
1995	98.22	35.85	0.16	21,357	0.005	1.1	1	0	1,058.8
1996	98.25	35.86	0.16	21,525	0.005	1.1	1	0	1,067.4
1997	101.41	37.02	0.16	21,743	0.005	1.1	1	0	1,113.1
1998	95.55	34.88	0.16	21,929	0.005	1.1	1	0	1,057.7
1999	97.55	35.61	0.16	22,092	0.005	1.1	1	0	1,087.9
2000	96.23	35.12	0.16	22,277	0.005	1.1	1	0	1,081.9
2001	92.00	33.58	0.16	22,406	0.005	1.1	1	0	1,040.4
2002	94.85	34.62	0.16	22,521	0.005	1.1	1	0	1,078.2
2003	96.13	35.09	0.16	22,605	0.005	1.1	1	0	1,096.9
2004	91.94	33.56	0.16	22,689	0.005	1.1	1	0	1,053.0
2005	91.57	33.42	0.16	22,770	0.005	1.1	1	0	1,052.3
2006	90.08	32.88	0.16	22,877	0.005	1.1	1	0	1,040.2
2007	92.02	33.59	0.16	22,958	0.005	1.1	1	0	1,066.4
2008	84.51	30.85	0.16	23,037	0.005	1.1	1	0	982.8
2009	86.84	31.70	0.16	23,120	0.005	1.1	1	0	1,013.5
2010	88.25	32.21	0.16	23,162	0.005	1.1	1	0	1,031.7
2011	89.67	32.73	0.16	23,225	0.005	1.1	1	0	1,051.2
2012	89.48	32.66	0.16	23,316	0.005	1.1	1	0	1,053.0
2013	86.97	31.74	0.16	23,374	0.005	1.1	1	0	1,025.9
2014	89.35	32.61	0.16	23,434	0.005	1.1	1	0	1,056.7




圖 7.5.2 臺灣 1990 至 2014 年生活污水放流氧化亞氮排放趨勢

目前僅登載 2000 年至 2013 年，1990 年至 1999 年之數據則參閱內政部相關會議之資料。內政部統計年報之國內人口數均已詳實登載 1990 年至 2014 年臺灣人口數。

B. 生活污水放流氧化亞氮排放

估算氧化亞氮之排放量，已完整參照農業委員會糧食平衡表 1990 年至 2014 年每人每日蛋白質供給量，及內政部統計年報之國內人口數均已詳實登載 1990 年至 2014 年台灣人口數。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關廢棄物部門整體排放量不確定性，及各來源排放量不確定性之評估方法及估算結果，請另詳 7.6 節廢棄物部門溫室氣體排放量不確定度分析。

(2) 時間序列的一致性

生活污水甲烷排放資料來源是依據內政部登載資料，均已包含 1990 年至 2014 年公共污水下水道系統普及率(%)、專用污水下水道系統普及率(%)、建築物污水處理設施普及率(%)、污水處理率(%)及國內人口數。

生活污水氧化亞氮排放量之活動數據引用內政部登載 1990 年至 2014 年國內人口數，及 1990 年至 2014 年

農業委員會糧食平衡表之每人每日蛋白質供給量，活動數據已符合時間序列之一致性及完整性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

生活污水甲烷排放符合方法一(Tier 1)，為利用國家公共污水下水道系統普及率(%)、專用污水下水道系統普及率(%)、建築物污水處理設施普及率(%)、污水處理率(%)與國內人口數等活動數據為基礎，以 IPCC 建議排放係數，參考 2000 GPG，計算溫室氣體排放量。

生活污水氧化亞氮排放符合方法一(Tier 1)，為利用全國人口數及糧食平衡表之每人每日蛋白質供給量活動數據為基礎，以 IPCC 建議排放係數，參考 2000 GPG，計算溫室氣體排放量。

針對本範疇之計算方式、引用參數及計算結果，業已於 2015 年 5 月、10 月召開專家會議，針對計算方式、引用參數與活動數據研析其合理性進行確認。

另參考 2000 年 IPCC 優良作法指南中「方法 1 一般清單水準品質控制程序」(如表 7.5.7)，透過交叉檢查重新計算及目測過濾，來檢核數據與引用數據來源內容是否一致；同時在對大量輸入資料進行查核過程中，為了避免檢核過程之錯誤，人工和自動檢查相結合是最有效的方法，故利用程式設計輔助人工檢核及簡化判讀等程序。

表 7.5.7 生活污水一般清單品質控制程序檢核表

品質控制活動	確認程序
檢查被記載的所選活動水準資料和排放因數的假設和標準	• 交叉檢查排放源類別資訊活動水準資料(內政部登載公共污水下水道系統普及率、專用污水下水道系統普及率、建築物污水下水道系統普及率及污水好氧處理率及國內人口數、農業委員會糧食平衡表之每人每日蛋白質供給量)和排放因數(IPCC 建議值)的種類並確保其正確記錄並歸檔
檢查資料登錄和參考文獻的轉錄誤差	• 確認正確引用「內政部登載資料」及「農業委員會糧食平衡表」結果
檢查排放計算的準確性	• 條列各項參數與活動數據，簡化運算規則，複查計算結果準確性
檢查被正確記錄的參數和排放單位及被採用的適當的轉換因數	• 確認各欄位單位標記的準確性 • 確認整個計算過程中單位使用的準確性 • 確認轉換因數的準確性 • 無時間和空間校正因數應用
檢查資料庫檔的完整性	• 簡明條列明確欄位與計算欄位
檢查排放源類別間資料的一致性	• 無引用適用多種排放源類別的資料
檢查處理過程中清單資料轉移的正確性	• 避免有轉錄情事，並加強複查檢核 • 無計算轉錄計算情事
檢查排放不確定性和轉換的正確估算和計算	• 檢查提供不確定性估算的專家判斷的獨立資格 • 檢查所記錄的資格假定和專家判斷檢查不確定性計算的完整性與準確性 • 目前版本相關參數引用 IPCC 指南建議值
開展內部檔的審評	• 詳細登錄資料來源引用與版本差異 • 檢查歸檔並存儲的清單資料支援資料和清單記錄以有利於展開詳盡的審評
檢查導致重新計算的方法和資料變化	• 確認每個排放源類別輸入資料的時間序列一致性 • 確認用於整個時間序列計算的運算法則/方法的一致性 • 無時間序列一致性缺漏情事
開展完全檢查	• 確認提交的評估報告涵蓋了從指定基年到當前清單時段內所有年份排放源類別
比較現有估算和原始估算	• 對於每個排放源類別應將當前的清單估算和以前的估算進行比較如果與設想情況有重大的變化或差距應重新檢查估算並分析不同之處 • 本年度並無重新計算情事



5. 特定排放源的重新計算

本年度清冊採用之計算方法、活動數據時間序列一致性完整性已查證、相關參數及活動係數之引用已查證確認，符合 2000 GPG。行政院農業委員會 2015 年公布歷年每人每日蛋白質攝取量，並修正 2012 至 2013 年蛋白質攝取量數據，2012 年由每人每日 89.57 公克修正為 89.48 公克，2013 年由每人每日 90.57 公克修正為 86.97 公克，並配合重新計算修正此 2 年氧化亞氮排放量。

6. 特定排放源的改善計畫

無。

7.5.2 事業廢水處理與放流 (5.D.2)

1. 排放源及匯分類的描述

事業廢水包括工業區廢水與列管事業廢水二部分，依 IPCC 計量規定，事業廢水僅需考量計算廠內厭氧處理設施單元之排放，並針對富含有機廢水之業別估算：

- (1) 紙漿和紙張製造
- (2) 肉類和家禽加工
- (3) 醇，啤酒，澱粉生產
- (4) 有機化工原料的生產
- (5) 其他食品和飲料加工（乳製品，植物油，水果和蔬菜，罐頭，果汁製作等）

IPCC 針對事業廢水主要以甲烷進行計算，事業廢水產生之氧化亞氮，相對於生活污水排放微不足道，因此不列入計算。

有關事業廢水之活動數據，其中關於列管家數，是參閱中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 92 年至 103

年，引用（三）水質監測及污染防治表 3-5 事業廢水污染管制情形，其中關於「列管家數」之數據；而事業廢水中遭去除之有機物，引用環保署水保處「水污染源管制資料管理系統」資料庫中定檢資料，取得產業廢水處理設施之水量與水質進行估算。

2. 方法論議題

(1) 計算方法

IPCC 指南針對事業廢水處理產生甲烷排放計算方法如公式 7.5.2.1 所示。

(2) 排放係數

IPCC 指南新增公布各種處理設施之甲烷修正係數 (MCF_j) 如表 7.5.8 所示。最大 CH₄ 產生量 Bo 依 IPCC 公布預設值以 0.25 CH₄/kg COD 計算。甲烷修正係數 (MCF) 依 IPCC 公布預設值，選用厭氧處理系統甲烷排放比例 0.8 計算。

依 IPCC 指南公式 7.5.2.1 計算事業廢水厭氧處理產生之甲烷排放量，相關參數選用詳列於表 7.5.9。

公式 7.5.2.1：

$$\text{甲烷排放量 (kg CH}_4\text{/yr)} = (\text{TOW}_i - S) \times (\text{Bo} \times \text{MCF}_j) - \text{R}_i$$

TOW_i：每年事業廢水之 COD 總量 (kg COD/yr)；P_i × W_i × COD_i

i：各類事業
P_i：各類事業之總產品量 (t/yr)
W_i：各類事業之單位產品廢水產生量 (m³/tproduct)
COD_i：化學需氧量 (kg COD/m³)
S：污泥移除量 (kg COD/yr)
EF_j：排放係數 (kg CH₄/kg COD) = Bo × MCF_j
Bo：最大 CH₄ 產生量 (kg CH₄/kg COD)，預設值為 0.25
MCF_j：甲烷修正係數
R：甲烷回收量 (kg CH₄/yr)，預設值為 0。

表 7.5.8 事業廢水甲烷排放 MCF 預設值

處理和排放途徑或系統類型	備註	MCF	範圍
未處理			
海洋、河流和湖泊排放	有機物含量高的河流可能變成厭氧的，但不在此處考慮。	0.1	0 - 0.2
已處理			
好氧處理廠	必須管理完善。一些甲烷會從沉澱池和細菌囊胞排放出來。	0.0	0 - 0.1
好氧處理廠	管理不完善或負載者。	0.3	0.2 - 0.4
污泥的厭氧消化槽	此處不考慮甲烷回收。	0.8	0.8 - 1.0
厭氧反應器（如 UASB，固定膜反應器）	此處不考慮甲烷回收。	0.8	0.8 - 1.0
淺的厭氧塘	深度不足 2 米，採用專家判斷。	0.2	0 - 0.3
深厭氧塘	深度超過 2 米	0.8	0.8 - 1.0

資料來源：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, volume 5, waste, P.6-21, table 6.8.

(3) 活動數據

依據 IPCC 計算式，由各業別之產品量以及每單位產品之廢水量，換算總廢水量後，再依據水質 COD 濃度計算各業別 COD 量。本計畫事業廢水活動數據，直接引用環保署水保處「水污染源管制資料管理系統」資料庫中定檢資料，取得產業廢水處理設施之水量與水質進行估算。以實際事業廢水檢測申報數據計算，較 IPCC 指南以行業單位產品排放量計算，準確性更高。計算方式如下：

A. 篩選廢水處理流程中之厭氧設施

B. 篩選擁有厭氧設施之業別

C. 篩選該些業別之事業申報水量、進（放）流 COD 值

由於「水污染源管制資料管理系統」資料庫之定檢資料，主要是規範放流水濃度須符合放流水標準，因此部分事業並未申報進流水 COD 值，乃以行業別去除效率估算進流水 COD 值。

D. 依據水量、進（放）流 COD 值計算處理 COD 量

由於該資料庫係由 2000 年開始建置，針對 2000 年前之 COD 去除量則以每年全國列管家數比例推估。依此取得各年期（1990 年至 2014 年）事業廢水中遭去除之有機物。

其中關於列管家數，是參閱中華民國環境保護統計年報 - 中華民國 92 年至 103 年，引用（三）水質監測及污染防治表 3-5 事業廢水污染管制情形，其中關於「列管家數」之數據。歷年活動數據如表 7.5.10。

(4) 排放量

事業廢水溫室氣體排放量計算結果如表 7.5.10 及圖 7.5.3 所示。由於排放量活動數據來自廢水申報處理量，

故估算結果必隨 COD 處理量而變化。2014 年排放量相較 1990 年排放量增加 47%，相較 2013 年則減少 1%。

(5) 完整性

事業列管家數係參閱民國 92 年至 103 年中華民國環境保護統計年報，因僅登載 1998 年至 2014 年事業廢水列管家數，缺少 1990 年至 1997 年之事業廢水列管家數；而環保署水保處「水污染源管制資料管理系統」中篩選出資料庫中定檢資料，目前僅列管 2000 年之後資料，缺少 1990 年至 1999 年資料，處理方式詳時間序列的一致性。

3. 不確定性與時間序列的一致性

(1) 不確定性

有關廢棄物部門整體排放量不確定性，及各來源排放量不確定性之評估方法及估算結果，請另詳 7.6 節廢棄物部門溫室氣體排放量不確定度分析。

(2) 時間序列的一致性

依據中華民國環境保護統計年報登載事業廢水污染管制資料，其中關於「列管家數」數據僅 1998 年至 2014 年有活動數據，故依據工廠登記家數回推至 1990 年這段區間之各年度列管家數。

而環保署水保處「水污染源管制資料管理系統」中篩選出資料庫中定檢資料，於 2007 年之後較為齊全，故針對不齊備年期之列管單位申報資料，以其 2007 年之後完整申報資料之年平均值進行概估，進而以列管家數外推方式，計算各年期事業廢水中遭去除之有機物，以符合各年期時間序列之完整性及一致性。

4. 特定排放源的 QA/QC 及查證

符合方法一（Tier 1），為利用國家水污染源管制資料管理系統事業廢水定檢申報活動數據為基礎，以 IPCC 建議排放係數，參考 2000 GPG，計算溫室氣體排放量。

表 7.5.9 事業廢水處理甲烷排放參數採用一覽表

	IPCC 計算方法或預設值	臺灣計算方法及採用數據	國內數據來源
污水量 (Pi×Wi)	國內資料自行確定	由於列管事業廢水資料庫中已具有各列管單位廢水處理之進排放量與進排放口之 COD 值，因此可直接計算各列管事業廢水廠商廢水處理所移除之可分解有機物 COD (公斤)。	管事業廢水資料，其取自於「列管事業廢水資料庫」中篩選具有厭氧處理設施之業別。
COD (事業部門可分解有機物)	國內資料自行確定		
污泥移除量 (S)	預設值 0	考量目前沒有轉變為污泥之 BOD 資料，故暫設為 0。	IPCC 預設值
最大甲烷生成量 (Bo)	0.25kg CH ₄ /kg COD	採用 IPCC 預設值 0.25kg CH ₄ /kg COD。	IPCC 預設值
甲烷修正係數 (MCF)	提供各種處理系統預設值	由於使用厭氧消化，採用 IPCC 厭氧系統 MCF 值 0.8 計算。	IPCC 預設值
甲烷移除量 (R)	預設值 0	採用 IPCC 預設值 0	IPCC 預設值

針對本範疇之計算方式、引用參數及計算結果，業已於 104 年 5 月、10 月召開專家會議，針對計算方式、引用參數與活動數據研析其合理性進行確認。

另參考 2000 GPG 指南中「方法 1 一般清單水準品質控制程序」（如表 7.5.11），透過交叉檢查重新計算及目測過濾，來檢核數據與引用數據來源內容是否一致；

同時在對大量輸入資料進行查核過程中，為了避免檢核過程之錯誤，人工和自動檢查相結合是最有效的方法，故利用程式設計輔助人工檢核及簡化判讀等程序。

5. 特定排放源的重新計算

本年度清冊採用之計算方法、活動數據時間序列一致性完整性已查證，相關參數及活動係數之引用已說明

表 7.5.10 臺灣 1990 至 2014 年事業廢水處理甲烷活動數據及排放量

年	列管家數	TOW _i : 事業廢水中遭去除之有機物 (T-COD) (公噸) (P _i × W _i × COD _i)	S _i : 移除轉變為污泥之可分解有機物 (Ton)	Bo: 最大甲烷產生量 (kg CH ₄ /kg COD)	MCF _i : 甲烷轉換係數	R: 甲烷移除量 (公噸 甲烷 / 年)	甲烷排放量計算 (公噸)
1990	10,394	146,137	0	0.25	0.8	0	29.23
1991	14,188	172,731	0	0.25	0.8	0	34.55
1992	15,339	179,288	0	0.25	0.8	0	35.86
1993	14,154	172,410	0	0.25	0.8	0	34.48
1994	14,699	175,703	0	0.25	0.8	0	35.14
1995	15,650	181,016	0	0.25	0.8	0	36.20
1996	17,853	192,184	0	0.25	0.8	0	38.44
1997	16,901	187,536	0	0.25	0.8	0	37.51
1998	15,421	179,724	0	0.25	0.8	0	35.94
1999	14,330	173,525	0	0.25	0.8	0	34.70
2000	14,908	166,989	0	0.25	0.8	0	33.40
2001	13,217	167,292	0	0.25	0.8	0	33.46
2002	14,279	168,818	0	0.25	0.8	0	33.76
2003	14,860	185,792	0	0.25	0.8	0	37.16
2004	15,754	175,933	0	0.25	0.8	0	35.19
2005	16,130	187,012	0	0.25	0.8	0	37.40
2006	16,624	187,236	0	0.25	0.8	0	37.45
2007	17,739	209,534	0	0.25	0.8	0	41.91
2008	18,694	202,160	0	0.25	0.8	0	40.43
2009	18,837	204,440	0	0.25	0.8	0	40.89
2010	19,315	195,863	0	0.25	0.8	0	39.17
2011	20,259	200,871	0	0.25	0.8	0	40.17
2012	20,570	215,663	0	0.25	0.8	0	43.13
2013	20,693	216,952	0	0.25	0.8	0	43.39
2014	20,521	215,149	0	0.25	0.8	0	43.03

備註：尚未取得 2013 至 2014 年 COD 量，暫以列管家數回推。




圖 7.5.3 臺灣 1990 至 2014 年事業廢水處理甲烷排放量趨勢

確認，符合 2000 GPG 優良作法。下一年度如前述各年期排放估算採用之計算方法、活動數據或引用相關排放係數值有變更，才會涉及排放量之重新計算。

6. 特定排放源的改善計畫

查核由環保署水保處「水污染源管制資料管理系統」資料庫中篩選出之定檢資料，於 2007 年之後較為齊全。故建議申報管理系統資料主管單位，考量查核補充 2000 年至 2007 年列管單位之申報資料，如此更能精進估算結果，減少外推數據之不確定性差異，符合各年期時間序列之完整性及一致性。

環保署擬篩選國內 3 處有機及含氮污染物排放量較大之事業廢水處理廠，進行實際量測溫室氣體排放量，建立本土排放係數，精進估算國內事業廢水溫室氣體排放量。

7.6 廢棄物部門溫室氣體排放量不確定性分析

一、不確定性定義、評估方法

根據 2000 GPG 指南，定量與定性之不確定分析是溫室氣體清冊數據品質管理的要項之一，其目的為持續地改進清冊的正確度，同時提供闡釋清冊結果及比較清冊間差異時的補充資訊，以免判斷錯誤。

不確定性係指一組數據與實際值的差異程度，而差異程度則取決於樣本的代表性、量測的可靠性等統計因素。用於描述不確定的理想資訊應包含此組數據的平均值、標準差、概率分布以及協方差，而不確定性的判斷應建立於 95% 信賴區間之上。

依據 2006 IPCC 指南之建議，排放量不確定性分析方法有 2 部分。包括方法 1 誤差傳播法（Propagation of error，又稱高斯法），方法 2 蒙地卡羅法（Monte Carlo simulation）。

不確定性分析，依參數數據引用來源、來源數據量測值，建立數據機率密度函數分布，計算不確定度（%）。參數（活動數據、排放係數）、排放量之不確定度，為其機率密度分布函數 95% 信賴區間之上下限與採用數值（估算值或平均值）之偏差，以百分比表示（常態分佈約為 2 個標準偏差）。高斯法（亦稱誤差傳播法，其機率密度函數分布為常態分佈，如圖 7.6.1 所示）；蒙地卡羅法（Monte Carlo）之機率密度函數分布通常為非對稱性（Asymmetric Distributions，如圖 7.6.2 所示），如對數分布、三角分布等。

蒙地卡羅法係根據各參數的概率密度分布 95% 信賴區間內，選擇排放係數與活動強度的隨機值，並計算相應之排放量；應用電子計算機多次重複上述步驟，並以

表 7.5.11 事業廢水一般清單品質控制程序檢核表

品質控制活動	確認程序
檢查被記載的所選活動水準資料和排放因數的假設和標準	• 交叉檢查排放源類別資訊活動水準資料（事業廢水污染管制資料）和排放因數（IPCC 建議值）的種類並確保其正確記錄並歸檔
檢查資料登錄和參考文獻的轉錄誤差	• 確認正確引用「中華民國環境保護統計年報」及「行政院環境保護署水保處『水污染源管制資料管理系統』中篩選出資料庫中定檢資料」結果
檢查排放計算的準確性	• 條列各項參數與活動數據，簡化運算規則，複查計算結果準確性
檢查被正確記錄的參數和排放單位及被採用的適當的轉換因數	• 確認各欄位單位標記的準確性 • 確認整個計算過程中單位使用的準確性 • 確認轉換因數的準確性 • 確認時間校正因數應用
檢查資料庫檔的完整性	• 簡明條列明確欄位與計算欄位
檢查排放源類別間資料的一致性	• 無引用適用多種排放源類別的資料
檢查處理過程中清單資料轉移的正確性	• 避免有轉錄情事，並加強複查檢核 • 無計算轉錄計算情事
檢查排放不確定性和轉換的正確估算和計算	• 檢查提供不確定性估算的專家判斷的獨立資格 • 檢查所記錄的資格假定和專家判斷檢查不確定性計算的完整性與準確性 • 目前版本相關參數引用 IPCC 指南建議值
開展內部檔的審評	• 詳細登錄資料來源引用與版本差異 • 檢查歸檔並存儲的清單資料支援資料和清單記錄以有利於展開詳盡的審評
檢查導致重新計算的方法和資料變化	• 確認每個排放源類別輸入資料的時間序列一致性 • 確認用於整個時間序列計算的運算法則 / 方法的一致性
開展完全檢查	• 無時間序列一致性缺漏情事
比較現有估算和原始估算	• 確認提交的評估報告涵蓋了從指定基年到當前清單時段內所有年份排放源類別
半衰期（t1/2）	• 對於每個排放源類別應將當前的清單估算和以前的估算進行比較如果與設想情況有重大的變化或差距應重新檢查估算並分析不同之處 • 本年度並無重新計算情事



$$\text{Uncertainty of EF or A} = \frac{95\% \text{ confidence interval} / 2 (n)}{|\text{Adopted value of EF or A} (m)|}$$




圖 7.6.1 機率密度函數 (PDF) 與信賴區間




圖 7.6.2 其他型態機率密度函數 (PDF)

每次計算所得之結果建構排放量之概率密度函數，以求得排放量整體的不確定性。

蒙地卡羅分析適用於評估各種程度的不確定性，2000 GPG 指南亦建議採用此法以取得較佳的不確定性分析結果，但強調唯有分析者對於所選用的參數概率密度函數之正確性有充分把握時，所得結果才有其參考價值。

二、不同排放源不確定性整合方法

廢棄物部門進行排放清冊統計與現實狀況之差異，依據 2000 GPG，評估整體排放量之不確定性可採用誤差傳播法及蒙地卡羅分析兩種方法。

(1) 依不確定量相乘規則計算公式

溫室氣體來源排放量不確定性，為該來源排放係數之不確定性平方與活動數據不確定性平方之總和開根號。

$$U = \sqrt{U_{EF}^2 + U_A^2}$$

U：Uncertainty of the emissions of the source [%]

U_{EF} ：Uncertainty of the emissions factor [%]

U_A ：Uncertainty of the activity data [%]

(2) 依不確定量相加規則計算公式

為各來源溫室氣體排放量之不確定性與排放量相乘後平方之總和再開根號，除以各來源溫室氣體排放量之總和。

$$U_{Total} = \frac{\sqrt{(U_1 + E_1)^2 + (U_2 + E_2)^2 + \dots + (U_n + E_n)^2}}{E_1 + E_2 + \dots + E_n}$$

U_{Total} ：Uncertainty of National Total Emissions [%]

U_i ：Uncertainty of the Emissions from Source "i" [%]

E_i ：the Emissions from Source "i" [Gg]

由上述不確定性整合計算公式，估算各來源排放量不確定性數值，及部門總排放量合併不確定性數值。

並依前述計算參數（活動數據、排放係數）、排放量之機率密度函數分布，取其 95% 信賴區，依 95% 信賴區間上下限計算不確定數值。

三、不確定性估算結果

A. 誤差傳播法不確定性估算結果

誤差傳播法（高斯法），依據計算參數（活動數據、排放係數）數據引用來源，取得計算參數不確定性數值，依上述排放源不確定性整合方法，計算各來源排放量、及合併部門總排放量之不確定性。

各參數不確定數值，可參考 IPCC 指南（引用 IPCC 預設參數值）各參數不確定值範圍（%），或依參數值引用來源之數據品質，藉由專家判斷，給予合理不確定值（%）。

參考 2013 至 2014 年個排放源計算參數資料、依據實地訪查各類處理廠場（掩埋場、堆肥場、焚化廠、污水處理廠）處理量等活動數據量測記錄操作、管理執行過程與紀錄，及 2015 年 11 月 30 日廢棄物部門溫室氣體排放不確定性專家會議各委員意見與會議結論，率定各來源排放量參數不確定值範圍，計算結果如下：

(1) 掩埋場甲烷排放量推估之不確定性

IPCC 指南提供掩埋場甲烷估算各參數引用之不確定性範圍，如表 7.6.1。

表 7.6.2 為依據表 7.6.1 所提供之不確定參數計算掩埋場甲烷排放量計算公式中之各項活動資料與排放係數不確定性率定結果，依前述不確定量相乘、相加規則計算公式，可得妥善及未妥善掩埋甲烷排放活動強度、排放係數及排放量之不確定性。妥善處理分別為 26.46、22.91 及 32.64；非妥善處理分別為 26.46、28.72 及 39.05。

(2) 生物處理排放量推估之不確定度

由於 IPCC 並未針對生物處理有預設之不確定值，係統一參考掩埋場之不確定值計算。

有關生物處理排放量排放之各項參數詳細資料列於表 7.6.3，各項活動資料與排放係數不確定性率定結果，依活動強度、排放係數排放量分別計算不確定性，生物處理排放量排放之不確定性結果分別為 10、20 和 22.36。

(3) 焚化處理排放量推估之不確定度

由於 IPCC 並未針對焚化處理有預設之不確定值，係統一參考掩埋場之不確定值計算。

有關廢棄物焚化處理所產生之二氧化碳排放之各項參數詳細資料列於表 7.6.4，各項活動資料與排放係數不確定性率定結果，依活動強度、排放係數排放量分別計算不確定性，分別為 10、89.02 和 89.58。

有關廢棄物焚化處理所產生之氧化亞氮 排放之各項參數詳細資料列於表 7.6.5，各項活動資料與排放係數不確定性率定結果，依活動強度、排放係數排放量分別計算不確定性，分別為 10、20 和 22.36。



表 7.6.1 2006 IPCC 指南掩埋場甲烷排放估算之不確定性

參數	不確定性範圍
固體廢棄物總量 (MSWT)	特定國家的： 30%：定期收集廢棄物資料 ±10%：具有高品質資料（如在所有掩埋場和其他處理設施處進行稱重） 200%：低品質資料
總廢棄物送至掩埋場比例 (MSWF)	±10%：具有高品質資料（如在所有掩埋場和其他處理設施處進行稱重） ±30%：收集有關掩埋場處置資料 200%：低品質資料
廢棄物組成的不確定性	±10%：是具有高品質資料（如對代表性掩埋場進行定期取樣） ±30%：是具有基於研究（包括週期性取樣） 200%：低品質資料
可降解有機碳 (DOC)	±20%：使用 IPCC 預設值 特定國家值： ±10%：基於代表性的取樣和分析
經過分解的可降解有機碳的比例 (DOCF)	±20%：使用 IPCC 預設值 特定國家值 基於長期以來試驗性資料的：±10%
甲烷修正係數 (MCF)	使用 IPCC 預設值
=1	-10%,+0%
=0.8	±20%
=0.5	±20%
=0.4	±30%
=0.6	-50%,+60%
產生的垃圾填埋氣體中的甲烷比例 (F) =0.5	±5%：使用 IPCC 預設值
甲烷回收量 (R)	不確定性範圍取決於計量回收、燃燒或利用的甲烷量。 ±10%：如果現地量測。 ±50%：如果未現地進量測。
氧化係數 (OX)	當 OX 使用非零值時，則 OX 須納入不確定性分析，應當說明非零值之各不確定性。
半衰期 (t _{1/2})	IPCC 提供各種廢棄物的半衰期範圍值，使用者應納入不確定說明。

資料來源：IPCC 2006，2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,2006.

表 7.6.2 臺灣 2014 年廢棄物部門掩埋甲烷排放之不確定性率定及率定說明

活動資料和排放係數	不確定性率定		率定說明
	妥善掩埋	未妥善掩埋	
城市固體廢棄物總量 (MSWT)	10	10	具有高品質資料，引用 IPCC 設定值 10%。
廢棄物組成	10	10	根據 IPCC 具有基於研究不確定設定值 30%。國內數據掌握十分清楚，不確定以 10% 計。
可降解有機碳 (DOC)	20	20	以 IPCC 預設值計算可降解有機碳，不確定性 IPCC 預設值 20%。
甲烷修正係數 (MCF)	0	20	採 IPCC 預設係數（衛生 1.0，一般 0.5），及不確定值律定建議（衛生 0%，一般 20%）。
經過分解的可降解有機碳的比例 (DOCF)	20	20	DOCF 使用 IPCC 預設值 0.5，不確定引用 IPCC 預設值 20%。
產生的垃圾填埋氣體中的 CH ₄ 比例	5	5	甲烷比例使用 IPCC 預設值 0.5，不確定引用 IPCC 預設值 5%。
甲烷回收量 (R)	20	N/A	以實際發電量換算甲烷回收量，IPCC 建議現地量測律定值 10%，本計畫訂 20%。一般掩埋為零。
氧化係數 (OX)	10	N/A	本清冊定衛生掩埋場以 10% 計算；一般掩埋場以 0% 計算。
半衰期 (t _{1/2})	10	10	依 IPCC 係數及本土組成加權計算，本計畫定 10%。
活動強度不確定性計算結果	26.46	26.46	
排放係數不確定性計算結果	22.91	28.72	
排放量不確定性計算結果	32.64	39.05	

表 7.6.3 臺灣 2014 年廢棄物部門廢棄物生物處理之排放不確定性

活動資料和排放係數	不確定性率定	率定說明
城市固體廢棄物總量 (MSWT)	10	年報來源具有高品質資料，參考掩埋場不確性數據，以「廢棄物總量 - 以具有高品質資料」之不確定性 10% 計算。
排放係數	20	參考掩埋場律定原則，以「可降解有機碳 (DOC)」採 IPCC 預設係數，律定不確定值 20%。
R：回收的甲烷總量 (Gg CH ₄)	N/A	未納入計算，不確定值 0% 計。
活動強度不確定性計算結果	10	
排放係數不確定性計算結果	20	
排放量不確定性計算結果	22.36	

料來源：IPCC, IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, chap5, table 5.5, 2000.

(4) 廢水處理排放量推估之不確定性

廢水處理溫室氣體排放之不確定性評估包括事業廢水及生活住商污水。以下說明依 IPCC 指南排放公式計算及採用相關參數預設值可能之不確定性範圍。

a. 生活污水

IPCC 清冊指南列出引用生活污水排放係數和活動資料不確定性預設值如表 7.6.6 所示，有關甲烷之各項參數

詳細資料列於表 7.6.7，依各項活動資料與排放係數不確定性率定結果，分別計算活動強度、排放係數、排放量之不確定性，依次為 7.07、42.72 和 43.30。

有關氧化亞氮之各項參數詳細資料列於表 7.6.8，依各項活動資料與排放係數不確定性率定結果，分別計算活動強度、排放係數、排放量之不確定性，依次為 11.18、28.72 和 30.82。

表 7.6.4 臺灣 2014 年廢棄物部門廢棄物焚化處理之二氧化碳排放不確定性

活動資料和排放係數	不確定性率定	率定說明
SW：焚化固體廢棄物類型的總量 (Gg/yr)	10	依據未具能源回收之中小型焚化爐焚化量，其申報量具高品質計量來源，故不確定值以 10% 計算。
含水分 (%)	50	係使用一般垃圾之含水率，以「掩埋場廢棄物組成 - 是具有基於研究之不確定」之不確定值 30% 計算，由於皆非實際中小型焚化爐實際數據，以 50% 計算。
總碳比例 (CF)	50	採 IPCC 預設值，建議之不確定值 30%。因非屬無能源回收焚化爐實際數據，以 50% 計算。
礦物碳比例 (FCF)	53.85	1. 各種垃圾成分之總碳係使用一般垃圾之垃圾組成，以「掩埋場廢棄物組成 - 是具有基於研究之不確定」之不確定值 30% 計算，由於皆非實際中小型焚化爐實際數據，50% 計算。 2. 礦物碳比例則引用 IPCC 預設值，故係參考掩埋場不確性數據，以「可降解有機碳 (DOC) - 使用 IPCC 預設值」之不確定 20% 計算。 3. 兩者不確定加總為 53.85%。
焚化爐燃燒效率 (EF)	5	燃燒效率 100% 與接近國內實際情形，參考掩埋場不確性數據，以「垃圾填埋氣體中的 CH ₄ 比例 (F)」之不確定性 5% 計算。
活動強度不確定性計算結果	10	
排放係數不確定性計算結果	89.02	
排放量不確定性計算結果	89.58	

表 7.6.5 臺灣 2014 年廢棄物部門廢棄物焚化處理之氧化亞氮排放不確定性

參數	不確定性率定	不確定性範圍
SW：焚化固體廢棄物類型的總量 (Gg/yr)	10	依據未具能源回收之中小型焚化爐焚化量，其申報量具高品質計量來源，故不確定值以 10% 計算。
氧化亞氮排放係數	20	排放係數引用 IPCC 建議日本焚化爐預設值，參考掩埋場引用 IPCC DOC 預設值，不確定值以 20% 計算。
活動強度不確定性計算結果	10	
排放係數不確定性計算結果	20	
排放量不確定性計算結果	22.36	

表 7.6.6 生活污水相關參數預設值之不確定範圍

活動資料和排放係數	率定說明
排放係數	
最大甲烷生成量 (Bo)	±30%
甲烷修正係數 (MCF)	±50%：未處理系統和廁所 ±30%：化糞池、管理不完善的處理廠 ±10%：集中管理完善的處理廠
活動資料	
人口數 (P)	±5%
BOD/人	±30%
人口收入族群比例 (U)	±15%：城市高收入和城市低收入之間的區別可能必須基於專家判斷
各個收入群體 (T _{ij}) 的處理 / 排放途徑或系統的利用程度	±3%：記錄優良且僅有一個或兩個系統 ±50%：個別方法驗證 100%：驗證總 T _{ij}
下水道含額外事業廢水 BOD 之修正係數 (I)	0%：未收集 ±20%：共同收集

資料來源：國家溫室氣體清單優良作法指南和不確定性管理，GPG 2000 IPCC，2000。

b. 事業廢水

IPCC 指南列出事業廢水排放係數和活動資料的預設值不確定性範圍，如表 7.6.9。不同類型事業廢水的甲烷排放潛勢差異很大，因此應盡可能收集資料，以確定最大甲烷產生量（Bo）和厭氧處理的廢水比例。

表 7.6.10 為事業廢水甲烷排放量計算公式中，各項活動資料與排放係數不確定性結果，分別計算活動強度、排放係數及排放量不確定性，結果為 14.14、36.06 和 38.73。

表 7.6.7 臺灣 2014 年廢棄物部門生活污水甲烷排放之不確定性

活動資料和排放係數	不確定性率定	率定說明
P：人口數	5	採國家人口統計資料，依 IPCC 建議不確定值 5%。
BOD：住商部門污水處理中可分解有機物量（kg BOD/ persons/yr）	5	BOD 採 IPCC 預設值 40g/p.d，預設不確定值 30%。經專家會議，確認 IPCC BOD 建議值，接近國內及日本實際數據，不確定值，可以 5% 計。
Bo：最大 CH ₄ 產生量	30	Bo 採用 IPCC 預設值 0.6 計算，不確定性以 IPCC 預設值 30% 計算。
MCFj：甲烷修正係數	30	MCF 值以 IPCC 化糞池 0.5 計算，不確定性以 IPCC 預設值 30% 計算。
污水處理率（%）	5	依主管機關統計污水接管戶數及處理人數，屬高品質數據，不確性律定值以 5% 計。
R：污泥去除量	0	未考慮以 0% 計算。
活動強度不確定性計算結果	7.07	
排放係數不確定性計算結果	42.72	
排放量不確定性計算結果	43.30	

表 7.6.8 臺灣 2014 年廢棄物部門生活污水氧化亞氮排放之不確定性

活動資料和排放係數	不確定性率定	率定說明
P：國內人口	5	採國家人口統計資料，依 IPCC 建議不確定值 5%。
Protein：每人每年蛋白質攝取量（kg/person/yr）	10	依據農委會糧食平衡表每人每日蛋白質供給量，具有高品質數據，不確定律定值，以 10% 計。
Frac _{NPR} ：蛋白質中氮的比例（kg N/kg protein）	20	參考掩埋場可降解有機碳之不確定值。
F _{NON-CON} ：污水中之非消耗蛋白質係數	5	採 IPCC 預設係數（發展中國家 1.1）。參考掩埋場引用沼氣中 CH ₄ 比例（F）預設值，不確定值 5% 計。
EF ₆ ：排放係數（kg N ₂ O-N/kg sewage-N produced）	20	採 IPCC 預設係數（0.005），參考掩埋場引用 IPCC DOC 預設值，不確定值以 20% 計算。
活動強度不確定性計算結果	11.18	
排放係數不確定性計算結果	28.72	
排放量不確定性計算結果	30.82	

表 7.6.9 IPCC 指南事業廢水相關參數預設值之不確定範圍

活動資料和排放係數	率定說明
排放係數	
最大甲烷生成量（Bo）	±30%
甲烷修正係數（MCF）	不確定性範圍應當由專家判斷來確定
活動資料	
工業產量（P）	±25%，利用專家來評判資料來源品質，以獲得更精確的不確定性範圍。
廢水產生量（W）	•這些資料有較高不確定。因為不同國家、不同工廠的同一個部門可能採用不同的廢水處理步驟。 •產品參數（W×COD）不確定性較小。
COD	•-50%、100% 等數值被假設，由於不確定性值可以直接歸於 kg COD/ 噸產品。

資料來源：IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, chap5, table 5.5, 2000.

(5) 廢棄物部門不確定度評估

綜合評估固廢處理、生物處理、焚化處理及污廢水處理之各來源溫室氣體排放不確定性，可得廢棄物部門整體之溫室氣體排放量不確定性，如表 7.6.11 所示，整個部門之排放量不確定值為 19.04。

B. 蒙地卡羅法不確定性不確定性估算結果

2014 年廢棄物部門先篩選不確定性佔部門排放量較大之污廢水處理排放，以蒙地卡羅法模擬計算生活污水（甲烷及氧化亞氮）及事業廢水（甲烷）溫室氣體排放量不確定性，並比較與誤差傳播法之差異。

此方法係根據計算模式內各計算參數的不確定性機率密度函數，於 95% 信賴區間內選擇排放係數與活動強度的隨機值（各 1,000 個以上隨機值），計算相應之排放量。應用內建於試算表之巨集演算程式（Crystal Ball 計算軟體），經電子計算機多次重複上述步驟，並以每次計算所得之結果建構排放量之機率密度函數，以求得排放量整體的不確定性。

(1) 排放量計算參數機率密度函數設定

除了誤差傳播法透過數據統計經驗、文獻資料、專家判斷，直接給予計算參數不確定值外，蒙地卡羅法將再參考歷年各溫室氣體排放源活動數據、排放係數值變動範圍，透過 Crystal Ball 軟體，分析設定各參數值最適合之機率密度分布函數圖形，並選取 95% 信賴區間內上下限數值，以亂數隨機選取 1,000 次，計算其對應之排放量分布。

(2) 生活污水甲烷排放參數機率密度函數設定與不確定性模擬

生活污水甲烷排放計算如公式 7.6.3，歷年活動數據及排放係數等參數值如表 7.6.12。

公式 7.6.3：生活污水處理甲烷排放公式及計算參數

$$\text{甲烷排放量 (Kg CH}_4\text{/yr)} = \sum (\text{U}_i \times \text{T}_{ij} \times \text{Bo} \times \text{MCF}_j) \times (\text{P} \times \text{BOD} \times 10^{-3} \times 365 \times \text{I} - \text{S}) - \text{R}$$

• U_i ：不同年收入級距*i*人口之比例
 • T_{ij} ：不同年收入級距*i*人口污水處理系統之比例；(化糞池、污水廠...)
 • Bo ：最大 CH_4 產生量， $\text{kg CH}_4 / \text{kg BOD}$
 • MCF_j ：甲烷修正係數 (比例)
 • P ：全國人口數
 • BOD ：每天每人BOD產生量 ($\text{g BOD} / \text{人} / \text{天}$)
 • I ：下水道含額外事業廢水BOD排放修正係數，有1.25，無1.0
 • S ：生物污泥中可分解有機物量， $\text{kg BOD} / \text{yr}$
 • R ：甲烷回收量 ($\text{kg CH}_4 / \text{yr}$)

經 Crystal Ball 軟體計算生活污水甲烷排放量之 5 個計算參數（2 個活動數據、3 個排放係數）之機率密度函數分佈，包括各參數採用值 (adopted value)，95% 信賴區間上下限數值等，各參數 95% 信賴區間之不確定值雖與誤差傳播法（高斯法）數據相同（如表 7.6.13），但蒙地卡羅法之部分參數非屬常態分佈。經 Crystal Ball 模擬計算，各取 95% 信賴區間，其活動數據不確定度為 -6.9% ~ +7.6%，排放係數不確定度為 -39 ~ +46%，排放量機率密度函數分佈的型態為貝塔分佈。依排放量機率密度函數分佈結果，取 95% 信賴區間下限及上限不確定數值，分別為 -39% ~ +47%，與誤差傳播法排放量

表 7.6.10 臺灣 2014 年廢棄物部門事業廢水甲烷排放之不確定性

活動資料和排放係數	不確定性率定	率定說明
W_i ：廢水處理量 (m^3)	10	引用處理廠連續計量設施之申報處理量，具高品質數據來源，不確定值 10%。
COD_i ：化學需氧量 ($\text{kg COD}/\text{m}^3$)	10	為進出流廢水定期檢測數據，計算 COD 去除量，具高品質數據來源，不確定值以 10% 計。
S ：廢水處理後產生有機污泥之 COD 總量 ($\text{kg COD}/\text{yr}$)	N/A	未納入計算。
Bo ：最大 CH_4 產生量 ($\text{kg CH}_4/\text{kg COD}$)	30	Bo 採 IPCC 預設係數值 (0.25)，不確定引用 IPCC 預設值 30% 計算。
MCF_j ：甲烷修正係數	20	參考 IPCC 建議集中管理完善的處理廠不確性 10%，管理不完善者 30%。本清冊保守以不確定值 20% 計算。
R ：甲烷移除量 ($\text{kg CH}_4/\text{yr}$)	N/A	未納入計算。
活動強度不確定性計算結果	14.14	
排放係數不確定性計算結果	36.06	
排放量不確定性計算結果	38.73	

表 7.6.11 臺灣 2014 年廢棄物部門溫室氣體排放量不確定性

IPCC 分類	溫室氣體	排放量 ($\text{CO}_2\text{-e}$)	不確定性 (%)	不確定性佔排放量 (%)	總不確定性 (%)	
A. 固廢處理	A.1 妥善掩埋	甲烷	1,223.1	32.64	9.36	28.0
	A.2 未妥善掩埋	甲烷	204.6	39.05	1.87	
B. 生物處理	B.1 堆肥	甲烷	20.4	22.36	0.11	
		氧化亞氮	18.3	22.36	0.10	
C. 焚化	C.1 焚化處理	二氧化碳	90.8	89.58	1.91	
		氧化亞氮	5.4	22.36	0.03	
D. 廢水處理	D.1 生活污水	甲烷	1,311.0	43.30	13.31	
		氧化亞氮	314.9	30.82	2.28	
	D.2 事業廢水	甲烷	1,075.7	38.73	9.77	
廢棄物部門排放量			4,264.3			

不確定度 ±43.30% 比較，負向偏差減少 4.3 個百分點，正向偏差增加 3.7 個百分點。

(3) 生活污水 N₂O 排放參數機率密度函數設定與不確定性模擬

生活污水 N₂O 排放計算如公式 7.6.4，歷年活動數據及排放係數等參數值如表 7.6.14。

公式 7.6.4：生活污水處理氧化亞氮排放公式及計算參數

$$N_2O \text{ (Kg } N_2O/yr) = (P \times Protein \times Frac_{NPR} \times F_{NON-COM} \times F_{IND-COM} - N_{SLUDGE}) \times EF_{EFFLUENT} \times 44/28$$

- P：國內人口數
- Protein：每人每年蛋白質攝取量 (kg/person/yr)
- Frac_{NPR}：蛋白質中氮的比例 (預設值為 0.16kg N/kg protein)
- F_{NON-COM}：廢水之非消耗蛋白質係數，已開發國家預設值 1.4，發展中國家為 1.1
- F_{IND-COM}：下水道系統含有工業與商業廢水之排放係數 (無共排預設值為 1.0)
- N_{SLUDGE}：因污泥而產生之 N 移除 (預設值 = 0 kg N/yr)
- EF_{EFFLUENT}：排放係數 (IPCC 預設值 0.005 kg N₂O-N/kg-N)
- 44/28：N₂O/N 分子量比例

經 Crystal Ball 軟體計算生活污水氧化亞氮排放量之 5 個計算參數 (2 個活動數據、3 個排放係數) 之機率密度函數分佈，包括各參數採用值 (adopted value)，95% 信賴區間上下限數值等，各參數數常態分佈 95% 信賴區間之不確定值約與誤差傳播法 (高斯法) 數據相

同，但蒙地卡羅法之部分參數非屬常態分佈，其不確定值仍有差異 (如表 7.6.15)。經 Crystal Ball 模擬計算之排放量機率密度函數分佈結果，各取 95% 信賴區間，其活動數據不確定度為 -11.4% ~ +10.8%，排放係數不確定度為 -26.5 ~ +31.8%，排放量不確定度為 -28.8% ~ +32.6%，排放量機率密度函數分佈的型態為貝塔分佈。與誤差傳播法排放量不確定度 ±30.82% 比較，負向偏差減少 1.98 個百分點，正向偏差增加 1.78 個百分點。

(4) 事業廢水 CH₄ 排放參數機率密度函數設定與不確定性模擬

事業廢水 CH₄ 排放計算如公式 7.6.5，歷年活動數據及排放係數等參數值如表 7.6.16。

公式 7.6.5：事業廢水處理甲烷排放公式及計算參數

$$\text{甲烷排放量 (Gg } CH_4/yr) = (Pi \times Wi \times COD_i - S \times Bo \times MCF_i) - R_i$$

- TOWI：每年事業廢水之 COD 總量 (kg COD/yr)；Pi x Wi x COD_i
- i：各類事業
- Pi：各事業部門生產量 (t/yr)
- Wi：廢水產生量 (m³/t_{Product})
- COD_i：化學需氧量 (kg COD/m³)
- S：廢水處理後產生有機污泥之 COD 總量 (kg COD/yr) (未納入計算，預設值為 0)
- EFi：工業之排放係數 (kg COD/yr) = Bo x MCF_i
- Bo：最大 CH₄ 產生量 (kg CH₄/kg COD)，(IPCC 預設值 0.25，厭氧處理 CH₄ 排放係數)
- MCF_i：甲烷修正係數 (採 IPCC 預設值 0.8)
- R：甲烷移除量 (kg CH₄/yr)，(未納入計算，預設值為 0)

表 7.6.12 生活污水甲烷排放歷年計算參數與排放量

年	全國人口 (千人)	污水處理率 (%)	污水 BOD 負荷 (kg/p.y)	最大甲烷生成量 (Bo)	甲烷修正係數 (MCF)	污泥移除量 (S)	甲烷回收量 (R)	全國污水甲烷排放量 (Gg CO ₂ e)
1990	20,401	2.6	14.6	0.6	0.5	0	0	2,176.26
1995	21,357	2.8	14.6	0.6	0.5	0	0	2,274.23
2000	22,277	14.7	14.6	0.6	0.5	0	0	2,081.06
2005	22,770	24.6	14.6	0.6	0.5	0	0	1,879.51
2010	23,162	38.7	14.6	0.6	0.5	0	0	1,555.20
2011	23,225	41.8	14.6	0.6	0.5	0	0	1,480.45
2012	23,316	44.9	14.6	0.6	0.5	0	0	1,408.01
2013	23,374	47.0	14.6	0.6	0.5	0	0	1,356.48
2014	23,434	48.9	14.6	0.6	0.5	0	0	1,310.97

表 7.6.13 生活污水甲烷計算參數機率密度函數及不確定值

活動資料和排放係數	誤差傳播法		蒙地卡羅法
	不確定性範圍值 (%)	不確定性範圍值 (%)	機率密度分布型態
P：人口數	±5	±5	常態分佈
污水 BOD 負荷 (kg BOD/ persons/d)	±5	-5 ~ +5	韋伯分佈
Bo：最大甲烷產生	±30	-30 ~ +30	貝塔分佈
MCF _i ：甲烷修正係	±30	±30	常態分佈
污水處理率 (%)	±5	±5	常態分佈
R：污泥去除量		0	未考慮 (R=0)，不確定以 0% 計算。
活動強度不確定性計算結果	7.07	-6.9% ~ +7.6	
排放係數不確定性計算結果	42.72	-39% ~ +46	
排放量不確定性計算結果	43.30	-39% ~ +47	貝塔分佈

經 Crystal Ball 軟體計算事業廢水甲烷排放量 3 個計算參數（1 個活動數據、2 個排放係數）之機率密度函數分佈，包括各參數採用值（adopted value），95% 信賴區間上下限數值等，各參數數常態分佈 95% 信賴區間之不確定值約與誤差傳播法（高斯法）數據相同，但蒙地卡羅法之部分參數非屬常態分佈，其不確定值仍有差異（如表 7.6.17）。經 Crystal Ball 模擬計算之活動數據、排放

係數及排放量之機率密度函數分佈結果，各取 95% 信賴區間，其活動數據不確定度為 -14% 至 +14%，排放係數不確定度為 -35% 至 +40%，排放量不確定度為 -36.7% 至 +41.9%，排放量機率密度函數分佈的型態為貝塔分佈。與誤差傳播法排放量不確定度 $\pm 38.73\%$ 比較，負向偏差減少 2.03 個百分點，正向偏差增加 3.17 個百分點。

表 7.6.14 生活污水氧化亞氮排放歷年計算參數與排放量

年	全國人口 (千人)	每人每年蛋白質攝 取量 (Protein) (公斤)	蛋白質含 N 量 (kg N/kg protein)	排放係數 (EF) (kg N ₂ O-N/kg N- produced)	污水中非消耗蛋白 質係數 (F _{NON-CON})	氧化亞氮排放量 (Gg CO ₂ e)
1990	20,401	33.84	0.16	0.005	1.1	284.50
1995	21,357	35.85	0.16	0.005	1.1	315.52
2000	22,277	35.12	0.16	0.005	1.1	322.40
2005	22,770	33.42	0.16	0.005	1.1	313.60
2010	23,162	32.21	0.16	0.005	1.1	307.44
2011	23,225	32.73	0.16	0.005	1.1	313.25
2012	23,316	32.66	0.16	0.005	1.1	313.81
2013	23,374	31.74	0.16	0.005	1.1	305.72
2014	23,434	32.61	0.16	0.005	1.1	314.91

表 7.6.15 生活污水氧化亞氮計算參數機率密度函數及不確定值

活動資料和 排放係數	誤差傳播法	蒙地卡羅法	
	不確定性 範圍值 (%)	不確定性 範圍值 (%)	機率密度分布型態
P：人口數	± 5	-5 ~ +5	常態分佈
Protein： 每人每年蛋白質攝取量 (kg/person/yr)	± 10	-10 ~ +10	貝塔分佈
Frac _{NPR} ： 蛋白質中氮的比例 (kg N/kg protein)	± 20	-19 ~ +19	常態分佈
F _{NON-CON} ： 污水中之非消耗蛋白質係數	± 5	-9 ~ +9	三角形分布
EF ₆ ： 排放係數 (kg N ₂ O-N/kg sewage-N produced)	± 20	-20 ~ +20	常態分佈
活動強度不確定性計算結果	± 11.18	-11.4 ~ +10.8	
排放係數不確定性計算結果	± 28.72	-26.5 ~ +31.8	
排放量不確定性計算結果	± 30.82	-28.8 ~ +32.6	貝塔分佈

表 7.6.16 事業廢水甲烷排放歷年計算參數與排放量


年	TOW _i ：事業廢水 COD 去 除量 (公噸) (P _i × W _i × COD _i)	S _i ：污泥中 COD 量 (t)	Bo：最大 CH ₄ 產生量 (kg CH ₄ /kg COD)	MCF _j ：甲烷 修正係數	R：甲烷回收量 (t CH ₄ /yr)	甲烷排放量 (Gg CO ₂ e)
1990	146,137	0	0.25	0.8	0	730.69
1995	181,016	0	0.25	0.8	0	905.08
2000	166,989	0	0.25	0.8	0	834.94
2005	187,012	0	0.25	0.8	0	935.06
2010	195,863	0	0.25	0.8	0	979.31
2011	200,871	0	0.25	0.8	0	1004.35
2012	215,663	0	0.25	0.8	0	1078.31
2013	216,952	0	0.25	0.8	0	1084.76
2014	215,149	0	0.25	0.8	0	1075.75

表 7.6.17 事業廢水甲烷計算參數機率密度函數及不確定值

活動資料和 排放係數	誤差傳播法	蒙地卡羅法	
	不確定性 範圍值 (%)	不確定性 範圍值 (%)	機率密度分布型態
廢水中 COD 去除量 (t/yr)	±14	-14 ~ +14	Lognormal 分佈
S：廢水處理後產生有機污泥之 COD 總量 (kg COD/yr)	N/A	0	未考慮 (S=0)，不確定以 0% 計算。
Bo：最大 CH ₄ 產生量 (kg CH ₄ /kg COD)	±30	-28 ~ +32	Beta 分佈
MCF _j ：甲烷修正係	±20	-20 ~ +20	Normal 分佈
R：甲烷回收量 (kg CH ₄ /yr)	N/A	0	未考慮 (R=0)，不確定以 0% 計算。
活動強度不確定性計算結果	±14.14	-14 ~ +14	
排放係數不確定性計算結果	±36.06	-35 ~ +40	
排放量不確定性計算結果	±38.73	-36.7% ~ +41.9	Beta 分佈

參考文獻

1. IPCC, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000.
2. IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006.
3. 行政院內政部 2014, 「內政部統計查詢網-污水下水道系統執行概況—按區域別分」, 線上文件: <<http://statis.moi.gov.tw/micst/stmain.jsp?sys=100>> 瀏覽日期 (2015 年 05 月)。
4. 行政院內政部 2014, 「內政部統計查詢網-土地面積、戶數與人口數—按區域別分」, 線上文件: <<http://statis.moi.gov.tw/micst/stmain.jsp?sys=100>> 瀏覽日期 (2015 年 05 月)。
5. 行政院農業委員會 2014, 「糧食平衡表-每人每日蛋白質供給量」, 線上文件: <<http://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/common/CommonStatistics.aspx>> 瀏覽日期 (2015 年 05 月)。
6. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 91 年」, 2002 年 08 月。
7. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 92 年」, 2003 年 08 月。
8. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 93 年」, 2004 年 08 月。
9. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 94 年」, 2005 年 08 月。
10. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 95 年」, 2006 年 08 月。
11. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 96 年」, 2007 年 08 月。
12. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 97 年」, 2008 年 08 月。
13. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 98 年」, 2009 年 08 月。
14. 行政院環境保護署, 「國家通訊及溫室氣體排放清冊建置應用」, EPA-98-FA11-03-A060, 2010 年 02 月。
15. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 99 年」, 2010 年 08 月。
16. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 100 年」, 2011 年 08 月。
17. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 101 年」, 2012 年 08 月。
18. 行政院環境保護署, 「水污染源管制資料管理系統-事業廢水檢測申報許可管理資料」, 2014 年 01 月。
19. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 102 年」, 2013 年 08 月。
20. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 103 年」, 2014 年 08 月。
21. 行政院環境保護署, 「中華民國環境保護統計年報中華民國 104 年」, 2015 年 08 月。



第八章 改善規劃



第八章 改善規劃

後京都德班協議後，規範附件一國家需提交「國家清冊報告」（National Inventory Report）、「二年期報告」（Biennial Report）、「國家通訊」（National Communication），非附件一國家需提交「二年期更新報告」（Biennial Update Report）及「國家通訊」，這些國家報告中，均涉及國家溫室氣體排放清冊之內容。臺灣已積極建置符合國情、部門分工、資料庫分層管理、確實可行之溫室氣體排放統計，並隨著聯合國氣候變化政府間專家委員會出版的國家溫室氣體排放清冊指南及各部門統計資料的更新，每年皆重新統計國家歷年溫室氣體排放資料，其目的為建立溫室氣體統計資料，提送政府相關部門參考，以進一步瞭解溫室氣體排放與吸收的現況，作為臺灣減量措施討論、評估減量措施的效果，及排放趨勢預估的基本資料。目前已按照溫室氣體排放清冊部門分項工作計畫，由各部會完成 1990 至 2014 年能源、工業製程及產品使用部門、農業部門、土地利用、土地利用變化及林業、廢棄物等各部門排放清冊統計。

臺灣依循聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）對國家溫室氣體排放清冊的要求，依據政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）指南及各部門官方統計資料，建立我國溫室氣體排放統計，以建立符合公約要求的「國家溫室氣體統計」。臺灣除擬定國家溫室氣體排放清冊審議規範外，已成立審議委員會，並審議溫室氣體排放清冊，健全管理體系以符合可量測、可報告與可查證機制（Measurement, Reporting, Verification, MRV）程序。2014 年更首度由各部會依據修訂版國家溫室氣體排放清冊指南（Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories，以下簡稱 1996 IPCC 指南）共同編撰 2014 年國家溫室氣體排放清冊報告。2015 年，亦配合聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）2015 年起使用 2006 IPCC 國家溫室氣體排放清冊指南（2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories，以下簡稱 2006 IPCC 指南）統計國家溫室氣體排放清冊。於 2013 年即

以 2006 IPCC 指南為基礎，建置國家溫室氣體排放清冊電子化之登錄平台，同時由相關部會登錄該平台，線上提交國家溫室氣體排放統計資料，後續，將陸續配合 UNFCCC 規範及相關指南，滾動式修正及擴充該平台之功能。表 8.1.1 為各部門之改善計畫。

表 8.1.1 各部門排放源之改善計畫

部門	次部門	改善計畫
能源部門	1.A 燃料燃燒	<ul style="list-style-type: none"> 持續檢視不確定性分析計算結果，釐清活動數據、排放係數與能源熱值、計算方法與過程之合理性，並邀請專家學者共同檢視，以確保計算結果之數據品質。 有關能源部門逸散排放計算將使用行政院環境保護署（簡稱環保署）國家溫室氣體登錄平台之盤查數據進行統計。
工業製程及產品使用部門	2.F 1 冷凍及空調	<ul style="list-style-type: none"> 汽車與冷凍空調排放將以 IPCC Tier 1 進行排放計算。回收率與使用期限，將以環保署回收基金會之官方數據為優先取得。 目前防止冷媒外洩的技術已大幅升，洩漏數據將採平均值，以符合保守性原則。建議除了參考文獻及專家建議值外，亦可參考澳洲的做法，澳洲與臺灣同為已開發國家且無生產 HCFC，澳洲以一年詳細調查的數據來推估後來的量，或從問卷調查統計民眾或維修廠的填充數據。 冷媒儲存量可依進口量扣除當年度使用量出口量，合理的儲存量。並進而得出當年度使用量。
農業部門	3.A 畜禽腸胃發酵	<p>養豬為臺灣主要畜牧經濟活動之一，目前正建立本土豬隻腸胃發酵甲烷排放係數。</p>
	3.B 畜禽糞尿處理	<p>由於目前畜禽糞尿處理僅計算各處理階段所排放之溫室氣體量，尚未將第 1 段所產出畜糞渣另行堆肥化之溫室氣體排放量計入，未來將建立此畜禽糞尿處理甲烷及氧化亞氮排放本土係數及資料。</p>
	3.C. 水稻種植	<ul style="list-style-type: none"> 行政院農業委員會農業試驗所（簡稱農試所）已進行利用開放式甲烷分析儀調查水稻種植中產生之甲烷，期望獲得更具代表性之排放係數，以進行排放係數更新；並與國外學者合作探討以模式進行模擬作為驗證之可能性。 農試所已正進行相關研究，並彙整前人相關研究評估本土排放係數，並評估區分水旱作、土壤性質或作物種類之氧化亞氮排放係數之可行性，以提高農地氧化亞氮排放估算之準確性與精確性。 農試所已進行地下水硝酸態氮之調查、農業長期生態系、不同土壤之氮淋洗與逕流等研究，未來可用於評估農田施用氮素後經淋洗等產生之間接氧化亞氮排放係數之本土資料。
土地利用、土地利用變化及林業部門	4.A 森林土地	<p>有關各林型或土地利用型圖，為土地使用變遷的依據，亦為森林碳吸存量的估算基礎，後續將繼續研析各國有關森林面積活動數據之調查產製方式，配合行政院農業委員會林務局（簡稱林務局）森林資源調查成果土地覆蓋型圖更新維護作法，搭配衛星影像監測或國土利用調查成果更新維護資料，研議適當之林業溫室氣體清冊年度森林面積活動數據產製方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 有關土地轉變為林地部分，林務局已規劃森林資源調查成果土地覆蓋型圖更新維護作法，後續可透過航照圖圈繪變異區域，作為土地轉變為林地面積基礎。 查證過程為品質保證（QA）和品質控制（QC）程序的一部分，以促進發展國家溫室氣體排放清冊的透明度、一致性、可比較性、完整性和準確性。目前已完成蒐集 IPCC 相關查證方法學，後續將依前開規範及步驟進行相關查證。
廢棄物部門	5.A.1 妥善管理之廢棄物掩埋場	<p>行政院環境保護署（簡稱環保署）擬蒐集檢討我國歷年（16 至 17 年）沼氣發電掩埋場產氣組成變化，了解 F 值長期變動趨勢，作為採用本土計算參數 F 值之參考。</p>
	5.A.2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	
	4.C 廢棄物焚化	<p>環保署擬評估直接以焚化處理量較為穩定之中小型爐事業廢棄物焚化量之活動數據，取代採用環境保護年報之現行不具能源回收之焚化處理量，以調整近年排放量驟降情形。</p>
	4.D.2 事業廢水	<p>環保署擬篩選國內三處有機及含氮污染物排放量較大之事業廢水處理廠，進行實際量測溫室氣體排放量，建立本土排放係數，精進估算國內事業廢水溫室氣體排放量。</p>

名詞、縮寫與單位索引

英文縮寫	英文名詞	中文名詞
AD	Activity data	活動數據
BAU	Business as usual	一往如常（基線排放量）
CO ₂	Carbon dioxide	二氧化碳
CO ₂ eq	Carbon dioxide equivalent	二氧化碳當量
CH ₄	Methane	甲烷
CRF	Common reporting format	共同報告格式
EF	Emission factor	排放係數
Gg	Gigagram; (1 gigagram = 10 ⁹ g = 1 kilotonne (kt))	十億克；千公噸
GHG	Greenhouse gas	溫室氣體
GWP	Global Warming Potential	溫暖化潛勢
HFC	Hydrofluorocarbon	氫氟碳化物
IE	included elsewhere	列於其他處
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	政府間氣候變化專門委員會
KP	Kyoto Protocol	京都議定書
LUCF	Land use change and forestry	土地利用變化及林業
LULUCF	Land use, land-use change and forestry	土地利用、土地利用變化及林業
Mt	Megatonne; 10 ⁶ tonne	百萬公噸
NA	Not applicable	不適用
NCV	Net calorific value	淨熱值
NE	Not estimated	未估計
NIR	National Inventory Report	國家清冊報告
NO	Not occurring	未發生
N ₂ O	Nitrous oxide	氧化亞氮
PFC	Perfluorocarbon	全氟碳化物
QA	Quality assurance	品質保證
QC	Quality control	品質控制
RA	Reference approach	參考方法
SA	Sectoral approach	部門方法
SF ₆	Sulfur hexafluoride	六氟化硫
t	Tonne	公噸
TJ	Terajoule; 10 ¹² joule	兆焦耳；萬億焦耳
TOE	Tonne of oil equivalent	公噸油當量
	Uncertainty	不確定性
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change	聯合國氣候變化綱要公約

附件一、

IPCC 第四次評估報告溫暖化潛勢值

	GHGs 種類	生命週期 (年)	GWP (20 年平均)	GWP (百年平均)	GWP (五百年平均)
	CO ₂	>500 (Bern model, 與大氣中 CO ₂ 濃度相關)	1	1	1
	CH ₄	12	72	25	7.6
	N ₂ O	114	289	298	153
	SF ₆	3200	16300	22800	32600
	HFCs				
HFC-23	CHF ₃	270	12000	14800	12200
HFC-32	CH ₂ F ₂	4.9	2330	675	205
HFC-125	CHF ₂ CF ₃	29	6350	3500	1100
HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	14	3830	1430	435
HFC-143a	CH ₃ CF ₃	52	5890	4470	1590
HFC-152a	CH ₃ CHF ₂	1.4	437	124	38
HFC-227ea	CF ₃ CHFCF ₃	34.2	5310	3220	1040
HFC-236fa	CF ₃ CHFCF ₃	240	8100	9810	1040
HFC-245fa	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	7.6	3380	1030	314
HFC-365mfc	CH ₃ CF ₂ CH ₂ CF ₃	8.6	2520	794	241
HFC-43-10mee	CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	15.9	4140	1640	500
	PFCs				
Nitrogen trifluoride	NF ₃	740	12300	17200	20700
PFC-14	CF ₄	50000	5210	7390	11200
PFC-116	C ₂ F ₆	10000	8630	12200	18200
PFC-218	C ₃ F ₈	2600	6310	8830	12500
PFC-318	c-C ₄ F ₈	3200	7310	10300	14700
PFC-3-1-10	C ₄ F ₁₀	2600	6330	8860	12500
PFC-4-1-12	C ₅ F ₁₂	4100	6510	9160	13300
PFC-5-1-14	C ₆ F ₁₄	3200	6600	9300	13300
PFC-5-1-18	C ₁₀ F ₁₈	>1000	>5500	>7500	>9500
trifluoromethyl sulphur pentafluoride	SF ₅ CF ₃	800	13200	17700	21200

- 說明：
1. 現行 UNFCCC 規範，使用 IPCC AR4 中 GWP 百年平均值，作為計算溫室氣體當量之基礎。
 2. 詳細資料請參考 IPCC AR4，如下網址：https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
 3. UNFCCC 規範，請參閱第 Decision 24/CP.19 決議文：「Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in Annex I to the Convention」。
- 網址：<http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2>，第 24 頁。

附件二、

2014 年能源平衡表－
OECD 能源統計格式（熱值單位）

能源平衡表－OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	1 煤及煤產品	2 煙煤-煉焦煤	3 煙煤-燃料煤	4 無煙煤	5 亞煙煤	6 褐煤	7 泥煤	8 焦炭	9 煤球
	Coal and Coal Products Total C2-C12	Bituminous Coal- Coking Coal	Bituminous Coal- Steam Coal	Anthracite	Sub-bituminous Coal	Lignite	Peat	Coke Oven Coke	Patent Fuel
1 自產	38,743,237	4,816,077	27,105,179	179,045	6,521,574			121,362	
2 + 進口	49,530							49,530	
3 - 出口									
4 - 國際海運									
5 - 國際航空									
6 - 存貨變動	-339,279	152,681	-458,309	-20,132	26,060			-39,579	
7 = 初級能源總供給	39,032,979	4,663,396	27,563,488	199,175	6,495,511			111,409	
8 - 產品間轉換(轉出)									
9 - 統計差異	1,102,607	-148,398	1,808,439	503	-55,876			-502,061	
10 - 轉變投入	36,800,156	4,811,792	20,277,935		6,551,388			4,072,443	
11 煉焦工場/煤製品業	5,593,407	4,811,792	781,615						
12 高爐工場	5,017,056		944,613					4,072,443	
13 煉油廠									
14 石化工廠									
15 公用發電廠	18,695,126		12,332,525		6,362,601				
16 自用發電廠	732,551		732,551						
17 公用汽電共生廠	6,762,017		5,486,631		188,788				
18 自用汽電共生廠	7,637,856							4,393,817	
19 + 轉變產出合計	7,637,856							4,393,817	
20 轉變產出	7,637,856							4,393,817	
21 產品間轉換(轉入)									
22 - 能源部門自用	1,156,996								
23 煤礦業									
24 煉焦工場/煤製品業	565,215								
25 高爐工場	591,781								
26 油氣礦業									
27 煉油廠									
28 發電廠									
29 抽水用電									
30 汽電共生廠									
31 氣體燃料供應業									
32 - 損耗	116,579							82,310	
33 = 最終消費	7,494,498		5,477,114	198,674				852,535	
34 A 能源消費	7,357,241		5,477,114	172,771				741,181	

能源平衡表－OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	10 焦爐氣 Coke Oven Gas	11 高爐氣 Blast Furnace Gas	12 轉爐氣 Oxygen Steel Furnace Gas	13 原油及石油 產品合計 Crude Oil and Petroleum Products Total C14-C36	14 原油 Crude Oil	15 煉油廠進料 Refinery Feedstocks	16 添加劑/ 含氧化合物 Additives/ Oxygenates	17 煉油氣 Refinery Gas	18 液化石油氣 LPG
1 自產				8,148	8,148				
2 + 進口				64,386,634	45,074,907		317,233		2,047,698
3 - 出口				16,875,446					52,705
4 - 國際海運				1,173,439					
5 - 國際航空				2,399,933					
6 - 存貨變動				835,536	821,286				86,806
7 = 初級能源總供給				43,110,426	44,261,768		317,233		1,908,187
8 - 產品間轉換(轉出)				5,886,546					296,928
9 - 統計差異				-548,487	-110,300				-9,007
10 - 轉變投入	327,302	615,906	143,390	46,845,680	44,372,071		317,233	6,717	
11 煉焦工場/煤製品業									
12 高爐工場									
13 煉油廠				44,689,304	44,372,071		317,233		
14 石化工廠									
15 公用發電廠									
16 自用發電廠				1,577,198					
17 公用汽電共生廠									
18 自用汽電共生廠				2,897				6,717	
19 + 轉變產出合計	327,302	615,906	143,390	576,282					
20 轉變產出	1,280,445	1,691,499	272,095	49,076,174				1,372,394	1,446,606
21 產品間轉換(轉入)	1,280,445	1,691,499	272,095	44,349,639				1,372,394	1,175,259
22 - 能源部門自用	202,304	876,826	77,866	4,726,532				1,365,676	65,958
23 煤礦業				1,586,329					
24 煉焦工場/煤製品業				2,295					
25 高爐工場	163,652	323,697	77,866	21,323					
26 油氣礦業	38,652	553,129							
27 煉油廠				50					
28 發電廠				1,559,636				1,365,676	64,622
29 抽水用電				1,536					
30 汽電共生廠									
31 氣體燃料供應業				1,500					1,339
32 - 損耗	11,310	18,905	4,054						
33 = 最終消費	739,529	179,860	46,786	38,416,536					3,000,908
34 A 能源消費	739,529	179,860	46,786	16,418,472					1,539,806

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	19 (丙烷混合氣) (Propane Air)	20 天然汽油 Natural Gasoline	21 石油腦 Naphthas	22 車用汽油 Motor Gasoline	23 (無鉛汽油) (Unleaded Gasoline)	24 航空汽油 Aviation Gasoline	25 航空燃油- 汽油型 Jet Fuel- Gasoline Type	26 航空燃油- 煤油型 Jet Fuel- Kerosene Type	27 煤油 Kerosene
1 自產									
2 + 進口			13,232,428						
3 - 出口				4,215,408 (4,215,408)			1,011,875	
4 - 國際海運									
5 - 國際航空			339,473	-149,013 (-149,013)			2,399,933	
6 - 存貨變動			12,892,954	-4,066,393 (-4,066,393)			54,512	1,741
7 = 初級能源總供給			3,279,160	93,102 (93,102)			-3,466,322	-1,741
8 - 產品間轉換(轉出)				-26,459 (-26,459)			10,257	
9 - 統計差異								21,728	
10 - 轉變投入									
11 煉焦工場/煤製品業									
12 高爐工場									
13 煉油廠									
14 石化工廠									
15 公用發電廠									
16 自用發電廠									
17 公用汽電共生廠									
18 自用汽電共生廠									
19 + 轉變產出合計			8,052,822	11,842,411 (11,842,411)			3,741,871	
20 轉變產出			8,052,822	7,855,812 (7,855,812)			3,741,871	
21 產品間轉換(轉入)				3,986,600 (3,986,600)				
22 - 能源部門自用				3,198 (3,198)				2
23 煤礦業									
24 煉焦工場/煤製品業									
25 高爐工場									
26 油氣礦業									
27 煉油廠				1,653 (1,653)				
28 發電廠				1,536 (1,536)				
29 抽水用電									
30 汽電共生廠									
31 氣體燃料供應業				12 (12)				
32 - 損耗									
33 = 最終消費			17,666,617	7,706,178 (7,706,178)			243,565	4,227
34 A 能源消費				7,706,178 (7,706,178)			243,565	4,227

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit: 10⁷kilocalorie)

項	目	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		天然氣合計	(自產) 天然氣 (Indigenous) Natural Gas	(進口) 液化天然氣 (Imported) LNG	生質能及 廢棄物合計 Biomass and Waste Total	生質能合計 Biomass Total	固態生質能 Solid Biomass	液態生質能 Liquid Biomass	氣態生質能 Biogas	廢棄物 Waste and Other Non-Specified
		C38-C39			C41+C45	C42-C44				
1	自產	303,486	303,486		1,646,654	329,040	248,039	75,661	5,340	1,317,614
2	+ 進口	15,920,217		15,920,217	90	90		90		
3	- 出口									
4	- 國際海運									
5	- 國際航空									
6	- 存貨變動	1,056,216	58,380	997,836	1,625	1,625		1,625		
7	= 初級能源總供給	15,167,489	245,105	14,922,384	1,645,118	327,504	248,039	74,125	5,340	1,317,614
8	- 產品間轉換(轉出)				39,542	39,542		39,542		
9	- 統計差異				-5,112	-5,112		-5,112		
10	- 轉變投入	28,739,643	3,558	28,736,085	1,444,310	145,688	140,348		5,340	1,298,622
11	煉焦工場/煤製品業									
12	高爐工場									
13	煉油廠			15,978,273						
14	石化工廠									
15	公用發電廠			12,693,532						
16	自用發電廠									
17	公用汽電共生廠				19,059					19,059
18	自用汽電共生廠		3,558	64,281	1,425,250	145,688	140,348		5,340	1,279,562
19	+ 轉變產出合計	16,914,438	1,051,372	15,863,066						
20	轉變產出	16,914,438	1,051,372	15,863,066						
21	產品間轉換(轉入)									
22	- 能源部門自用	334,981	11,332	323,649	3,496	3,496		3,496		
23	煤礦業									
24	煉焦工場/煤製品業									
25	高爐工場									
26	油氣礦業									
27	煉油廠	325,311	1,662	323,649	3,496	3,496		3,496		
28	發電廠	9,665	9,665							
29	抽水用電									
30	汽電共生廠									
31	氣體燃料供應業									
32	- 損耗									
33	= 最終消費	3,007,303	1,281,587	1,725,716	162,877	143,888	107,692	36,196		18,989
34	A. 能源消費	3,007,303	1,281,587	1,725,716	162,877	143,888	107,692	36,196		18,989

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit: 10⁷kilocalorie)

項	目	37 天然氣合計	38 (自產) 天然氣 (Indigenous) Natural Gas	39 (進口) 液化天然氣 (Imported) LNG	40 生質能及 廢棄物合計 Biomass and Waste Total	41 生質能合計 Biomass Total	42 固態生質能 Solid Biomass	43 液態生質能 Liquid Biomass	44 氣態生質能 Biogas	45 廢棄物 Waste and Other Non-Specified
		C38-C39		C41+C45		C42-C44				
35	工業部門	1,657,455	334,816	1,322,639	162,877	143,888	107,692	36,196		18,989
36	礦業及土石採取業(不含煤、油及氣)	31	31							
37	食品飲料及菸草業	8,054	7,703	351	13,603	13,603				
38	紡織成衣及服飾業	30,268	1,037	29,231						
39	皮革及毛皮業									
40	木竹及家具業									
41	紙漿、紙及紙製品業	15,790	1,473	14,317	110,003	91,014	91,014			18,989
42	印刷業									
43	化學材料製造業	331,589	23,794	307,795	3,076	3,076	3,076			
44	基本化學材料製造業	232,625	5,937	226,688	3,076	3,076	3,076			
45	(基本化學工業)	30,958	3,739	27,219						
46	(石油化工原料製造業)	201,664	2,195	199,469	3,076	3,076	3,076			
47	(肥料製造業)									
48	人造纖維製造業	18,561	17,186	1,375						
49	樹脂塑膠及橡膠製造	80,404	675	79,729						
50	其他化學材料製造業									
51	化學製品製造業	25,692	1,642	24,050						
52	橡膠製品製造業	6,132		6,132						
53	塑膠製品製造業	15,445	400	15,045						
54	非金屬礦物製品製造業	202,928	153,773	49,155						
55	水泥及水泥製品業									
56	其他	202,928	153,773	49,155						
57	(陶瓷製品製造業)	76,115	69,268	6,847						
58	(玻璃及玻璃製品製造業)	53,768	30,078	23,690						
59	金屬基本工業	329,387	12,537	316,850						
60	鋼鐵基本工業	282,685	7,929	274,756						
61	非鐵金屬基本工業	46,703	4,608	42,095						
62	(鋁業)	32,467	923	31,544						
63	金屬製品製造業	61,795	58,127	3,668						
64	機械設備製造業	2,450	2,380	70						
65	電腦通信及視聽電子產品製造業	84,815	58,118	26,697						
66	(電子零組件製造業)									
67	運輸工具製造業	539,275	10,056	529,219						
68	精密光學醫療器材及鐘錶製造業									
69	其他工業製品製造業	3,810	3,744	66						
70	供水供應業									
71	營造業									
72	其他				36,196	36,196		36,196		

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	46	47	48	49	50	51	52
電 力 合 計	電力-發電廠 小計	水力發電	核能發電	火力發電	地熱發電、太陽 光電及風力發電	電力-汽電 共生廠	電力-汽電 共生廠
Electricity Total	Electricity-Electricity Plants Subtotal	Hydro Power	Nuclear Power	Thermal Power	Geothermal Electricity, Solar Photovoltaic and Wind Energy	Electricity- Cogeneration Plants	Electricity- Cogeneration Plants
C47+C52	C48-C51						
1 自產	547,827	547,827	371,337				
2 + 進口	11,046,567	11,046,567		11,046,567		176,490	
3 - 出口							
4 - 國際海運							
5 - 國際航空							
6 - 存貨變動							
7 = 初級能源總供給	11,594,394	11,594,394	371,337	11,046,567		176,490	
8 - 產品間轉換(轉出)							
9 - 統計差異	7,397,116	7,397,114					
10 - 轉變投入			636,680	10,632,757	13,718,996	171,849	812,356
11 煉焦工場/煤製品業							
12 高爐工場							
13 煉油廠							
14 石化工廠							
15 公用發電廠			636,680	10,632,757	13,718,996	171,849	812,356
16 自用發電廠							
17 公用汽電共生廠							
18 自用汽電共生廠							
19 + 轉變產出合計	18,164,579	15,387,480	268,422	14,306,702			3,589,455
20 轉變產出	18,164,579	15,387,480	268,422	14,306,702			3,589,455
21 產品間轉換(轉入)							
22 - 能源部門自用	1,639,328	1,355,515	3,077	413,811	587,707	600	283,813
23 煤礦業	79	79					
24 煉焦工場/煤製品業							
25 高爐工場							
26 油氣礦業	1,725	1,725					
27 煉油廠	283,163	205,022					78,141
28 發電廠	791,922	791,922					
29 抽水用電	315,599	315,599	3,077	413,811	587,707	600	205,675
30 汽電共生廠	205,675						
31 氣體燃料供應業	41,166	41,166					
32 - 損耗	770,542	770,542					
33 = 最終消費	19,951,987	17,458,703				4,042	2,493,284
34 A 能源消費	19,951,987	17,458,703				4,042	2,493,284

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

	項 目	46 電力合計	47 電力-發電廠 小計	48 水力發電	49 核能發電	50 火力發電	51 地熱發電、太陽 光電及風力發電	52 電力-汽電 共生廠
		Electricity Total	Electricity-Electricity Plants Subtotal	Hydro Power	Nuclear Power	Thermal Power	Geothermal Electricity, Solar Photovoltaic and Wind Energy	Electricity- Cogeneration Plants
		C47+C52	C48-C51					
35	工業部門	11,615,907	9,184,413			602		2,431,494
36	礦業及土石採取業(不含煤、油及氣)	40,798	40,798					
37	食品飲料及菸草業	333,991	328,070					5,921
38	紡織成衣及服飾業	472,690	466,703					5,987
39	皮革及毛皮業	18,790	18,790					
40	木竹及家具業	35,271	35,271					
41	紙漿、紙及紙製品業	302,359	161,936			227		140,423
42	印刷業	48,217	48,217					
43	化學材料製造業	2,347,946	598,240					
44	基本化學材料製造業	1,676,190	138,850					
45	(基本化學工業)	24,080						
46	(石油化工原料製造業)	1,513,262						
47	(肥料製造業)							
48	人造纖維製造業	479,889	267,523					212,366
49	樹脂塑膠及橡膠製造	116,407	116,407					
50	其他化學材料製造業	75,461	75,461					
51	化學製品製造業	264,785	264,785					
52	橡膠製品製造業	105,063	105,063					
53	塑膠製品製造業	510,280	440,016					70,264
54	非金屬礦物製品製造業	493,870	477,705					16,165
55	水泥及水泥製品業	173,999	157,834					
56	其他	319,873	319,873					16,165
57	(陶瓷製品製造業)	30,840	30,840					
58	(玻璃及玻璃製品製造業)	212,232	212,232					
59	金屬基本工業	1,472,379	1,051,227					421,152
60	鋼鐵基本工業	1,368,156	947,004					421,152
61	非鐵金屬基本工業	104,223	104,223					
62	(鋁業)	55,997	55,997					
63	金屬製品製造業	607,681	607,681					
64	機械設備製造業	191,051	191,051					
65	電腦通信及視聽電子產品製造業	3,779,010	3,757,132					21,878
66	(電子零組件製造業)	2,593,553	2,593,553					
67	運輸工具製造業	214,946	214,946					
68	精密光學醫療器材及鐘錶製造業	123,264	123,264					
69	其他工業製品製造業	86,640	86,640					
70	供水供應業	113,065	113,065					
71	營造業	53,815	53,815					
72	其他							

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	46	47	48	49	50	51	52
電 力 合 計	電力-發電廠 小計	水力發電	核能發電	火力發電	地熱發電、太陽 光電及風力發電	電力-汽電 共生廠	
Electricity Total	Electricity-Electricity Plants Subtotal	Hydro Power	Nuclear Power	Thermal Power	Geothermal Electricity, Solar Photovoltaic and Wind Energy	Electricity- Cogeneration Plants	
C47+C52	C48-C51						
73 運輸部門	113,634	113,634					
74 國內航空							
75 公路							
76 鐵路							
77 管線運輸	113,634	113,634					
78 國內水運							
79 其他							
80 農業部門	243,634	243,634					
81 農牧及林業	163,933	163,933					
82 漁業	79,699	79,699					
83 服務業部門	4,093,860	4,032,067			2,063	61,793	
84 批發及零售業	450,590	450,590					
85 住宿及餐飲業	252,845	252,845					
86 運輸服務業	118,834	118,834					
87 倉儲業	68,025	68,025					
88 通信業	122,124	122,124					
89 金融保險及不動產業	88,416	88,416					
90 工商服務業	116,732	116,732					
91 社會服務及個人服務業	747,794	747,794					
92 公共行政業	524,314	462,521			2,063	61,793	
93 其他	1,604,181	1,604,181					
94 住宅部門	3,884,955	3,884,955					
95 B 非能源消費							
96 工業、轉變及能源部門							
97 (石化原料用)							
98 運輸部門							
99 其他							
100 發電量 (千度)							
101 發電廠							
102 汽電共生廠							
103 熱能 (公噸)							
104 汽電共生廠							

能源平衡表－OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	53 (生質能發電) Biomass Power	54 (廢棄物能發電) Waste to Generation	55 太陽熱能 Solar Thermal	56 熱能 Heat	57 總計	Item
					Grand Total C1+C13+C37+C40+C46+C55+C56	
1 自產			100,936		2,607,051	1 Indigenous Production
2 + 進口					130,096,745	2 + Import
3 - 出口					16,924,976	3 - Exports
4 - 國際海運					1,173,439	4 - International Marine Bunkers
5 - 國際航空					2,399,933	5 - International Civil Aviation
6 - 存貨變動					1,554,098	6 - Stock Changes
7 = 初級能源總供給			100,936		110,651,342	7 = Total Primary Energy Supply
8 - 產品間轉換(轉出)					5,926,088	8 - Transfers(Intput)
9 - 統計差異					7,946,124	9 - Statistical Differences
10 - 轉變投入	(5,093) (1,161,534)		113,829,789	10 - Transformation Input
11 煉焦工場/煤製品業					5,593,407	11 Coke Ovens
12 高爐工場					5,017,056	12 Blast Furnaces
13 煉油廠					60,667,577	13 Petroleum Refineries
14 石化工廠						14 Petrochemical Industry
15 公用發電廠	(5,093) (1,161,534)		32,965,856	15 Public Electricity Plants
16 自用發電廠						16 Autoproducer Electricity Plants
17 公用汽電共生廠						17 Public Cogeneration Plants
18 自用汽電共生廠					754,507	18 Autoproducer Cogeneration Plants
19 + 轉變產出合計	(124,646) (1,532,268)	257,198	92,050,245	19 + Transformation Output Total
20 轉變產出	(124,646) (1,532,268)	257,198	87,323,710	20 Transformation Output
21 產品間轉換(轉入)					4,726,532	21 Transfers(Output)
22 - 能源部門自用	(32,110)			4,721,130	22 - Energy Sector Own Use
23 煤礦業					2,374	23 Coal Mines
24 煉焦工場/煤製品業					586,538	24 Coke Ovens
25 高爐工場					591,781	25 Blast Furnaces
26 油氣礦業					1,775	26 Oil and Gas Extraction
27 煉油廠	(32,110)			2,171,606	27 Petroleum Refineries
28 發電廠					803,123	28 Electricity Plants
29 抽水用電					315,599	29 Electricity to Pump Up
30 汽電共生廠					205,675	30 Cogeneration Plants
31 氣體燃料供應業					42,666	31 Gas Companies
32 - 損耗					887,121	32 - Losses
33 = 最終消費	(87,445) (370,735)	257,198	69,391,335	33 = Total Final Consumption
34 A 能源消費	(87,445) (370,735)	257,198	47,256,014	34 A Energy Consumption

能源平衡表—OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	53 (生質能發電)		54 (廢棄物能發電)		55 太陽熱能		56 熱能		57 總計	
	Biomass Power	Waste to Generation	Solar Thermal	Heat	Grand Total	C1+C13+C37+C40+C46+C55+C56				
工業部門	(87,198)	(34,777)		257,198	23,272,070					
礦業及土石採取業(不含煤、油及氣)					74,591					
食品飲料及菸草業	(3,782)			16,886	586,313					
紡織成衣及服飾業				41,173	872,109					
皮革及毛皮業					40,780					
木竹及家具業					41,322					
紙漿、紙及紙製品業	(72,809)	(34,777)		15,531	891,925					
印刷業					51,592					
化學材料製造業	(10,606)			135,483	7,366,248					
基本化學材料製造業	(10,606)			135,483	4,309,276					
(基本化學工業)					307,259					
(石油化工原料製造業)	(10,606)			122,647	3,862,794					
(肥料製造業)					374					
人造纖維製造業					1,334,664					
樹脂塑膠及橡膠製造					1,294,338					
其他化學材料製造業					427,967					
化學製品製造業					388,189					
橡膠製品製造業					153,515					
塑膠製品製造業					589,759					
非金屬礦物製品製造業					2,227,297					
水泥及水泥製品業					1,290,128					
其他					937,174					
(陶瓷製品製造業)					112,181					
(玻璃及玻璃製品製造業)					268,870					
金屬基本工業					7,130					
鋼鐵基本工業					4,278					
非鐵金屬基本工業					2,852					
(鋁業)					2,852					
金屬製品製造業					726,101					
機械設備製造業					201,880					
電腦通信及視聽電子產品製造業					40,994					
(電子零組件製造業)					40,994					
運輸工具製造業					786,573					
精密光學醫療器材及鐘錶製造業					123,264					
其他工業製品製造工業					177,430					
供水供應業					113,547					
營造業					119,276					
其他					36,196					

能源平衡表－OECD能源統計格式（熱值單位）

民國103年(2014)

(單位：10⁷千卡) (Unit:10⁷kilocalorie)

項 目	53 (生質能發電) Biomass Power	54 (廢棄物能發電) Waste to Generation	55 太陽熱能 Solar Thermal	56 熱能 Heat	57 總計 Grand Total	Item
	(247) (335,960)	3,028		C1+C13+C37+ C40+C46+C55+C56	
73 運輸部門					11,910,750	Transport Sector
74 國內航空					89,002	Domestic Air
75 公路					11,537,722	Road
76 鐵路					138,579	Rail
77 管線運輸					145,447	Pipeline Transport
78 國內水運						Internal Navigation
79 其他						Non-Specified
80 農業部門					590,681	Agriculture Sector
81 農牧及林業					167,538	Agriculture, Animal Husbandry and Forestry
82 漁業					423,140	Fishing and Aquaculture
83 服務業部門	(247) (335,960)	3,028		5,670,550	Service Sector
84 批發及零售業					450,590	Wholesale and Retail
85 住宿及餐飲業					1,293,665	Hotels and Restaurants
86 運輸服務業					125,017	Transport Services
87 倉儲業					79,805	Storage and Warehousing
88 通信業					131,637	Communication
89 金融保險及不動產業					93,102	Finance, Insurance and Real Estate
90 工商服務業					116,732	Business Services
91 社會服務及個人服務業					747,794	Social and Personal Services
92 公共行政業	(247) (335,960)	3,028		895,547	Public Administration
93 其他					1,736,664	Activities Not Adequately Defined
94 住宅部門			97,909		5,811,967	Residential Sector
95 B 非能源消費					22,135,324	B Non-Energy Use
96 工業、轉變及能源部門					22,135,324	in Industry/Transf./Energy
97 (石化原料用)					19,127,722	(Feedstocks)
98 運輸部門						in Transport
99 其他						in Other Sectors
100 發電量 (千度)						Electricity Generated (MWh)
101 發電廠						Electricity Plants
102 汽電共生廠						Cogeneration Plants
103 熱能 (公噸)						Heat Generated (MT)
104 汽電共生廠						Cogeneration Plants

附件三、

能源部門燃料燃燒二氧化碳排放指標

項目	CO ₂ 排放量		人均排放		CO ₂ 排放密集度	
	年	(萬公噸)	成長率 (%)	(公噸 CO ₂ / 人)	成長率 (%)	(公斤 CO ₂ / 元)
1990	10,949	-	5.4	-	0.0228	-
1991	11,841	8.15	5.8	6.96	0.0228	-0.19
1992	12,606	6.45	6.1	5.44	0.0224	-1.70
1993	13,521	7.26	6.5	6.27	0.0225	0.43
1994	14,298	5.75	6.8	4.81	0.0221	-1.63
1995	15,044	5.21	7.1	4.32	0.0219	-1.21
1996	15,810	5.10	7.4	4.25	0.0217	-1.02
1997	17,060	7.90	7.9	6.96	0.0220	1.69
1998	18,129	6.27	8.3	5.29	0.0225	1.98
1999	19,026	4.95	8.7	4.11	0.0221	-1.66
2000	20,936	10.04	9.5	9.18	0.0228	3.40
2001	21,304	1.75	9.6	1.06	0.0235	3.05
2002	22,109	3.78	9.9	3.23	0.0231	-1.70
2003	23,068	4.34	10.3	3.88	0.0232	0.21
2004	23,852	3.40	10.6	3.03	0.0225	-2.92
2005	24,520	2.80	10.8	2.45	0.0219	-2.48
2006	25,207	2.80	11.1	2.41	0.0214	-2.67
2007	25,587	1.51	11.2	1.11	0.0204	-4.70
2008	24,463	-4.39	10.7	-4.71	0.0193	-5.06
2009	23,220	-5.08	10.1	-5.39	0.0186	-3.57
2010	24,828	6.92	10.8	6.66	0.0180	-3.35
2011	25,345	2.08	11.0	1.87	0.0177	-1.66
2012	24,864	-1.90	10.7	-2.19	0.0170	-3.88
2013	24,911	0.19	10.7	-0.09	0.0167	-1.97
2014	25,104	0.77	10.8	0.55	0.0162	-3.03
2015	25,050	-0.21	10.7	-0.44	0.0160	-0.86
年均成長率						
1990-2015	3.37		2.78		-1.40	
2000-2015	1.20		0.85		-2.33	

註：本表排放指標係依據能源部燃料燃燒二氧化碳排放量計算，未包括其他溫室氣體。
資料來源：經濟部能源局，2016年6月。

附件四、

能源部門燃料燃燒 CO₂ 排放量（電力消費排放）

(單位：萬公噸 CO₂)

項目	能源		工業		運輸		農業		服務業		住宅		合計	
	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%	數量	%
1990	1,339	12.23	5,075	46.35	1,974	18.03	370	3.38	1,027	9.38	1,165	10.64	10,949	100.00
1991	1,353	11.43	5,536	46.75	2,099	17.72	357	3.01	1,172	9.90	1,324	11.18	11,841	100.00
1992	1,338	10.61	5,881	46.65	2,415	19.16	351	2.78	1,210	9.60	1,410	11.19	12,606	100.00
1993	1,491	11.03	6,144	45.44	2,623	19.40	365	2.70	1,333	9.85	1,567	11.59	13,521	100.00
1994	1,657	11.59	6,373	44.57	2,766	19.34	370	2.59	1,491	10.43	1,641	11.48	14,298	100.00
1995	1,752	11.65	6,657	44.25	2,894	19.24	385	2.56	1,565	10.40	1,791	11.90	15,044	100.00
1996	1,813	11.47	6,928	43.82	2,993	18.93	398	2.52	1,746	11.04	1,932	12.22	15,810	100.00
1997	2,084	12.22	7,615	44.64	3,072	18.01	374	2.19	1,880	11.02	2,035	11.93	17,060	100.00
1998	2,192	12.09	7,945	43.83	3,206	17.68	321	1.77	2,096	11.56	2,369	13.07	18,129	100.00
1999	2,196	11.54	8,521	44.78	3,301	17.35	330	1.73	2,234	11.74	2,444	12.85	19,026	100.00
2000	2,418	11.55	9,626	45.98	3,349	15.99	375	1.79	2,519	12.03	2,650	12.66	20,936	100.00
2001	2,505	11.76	9,652	45.31	3,353	15.74	385	1.81	2,665	12.51	2,744	12.88	21,304	100.00
2002	2,452	11.09	10,235	46.29	3,483	15.76	389	1.76	2,748	12.43	2,802	12.67	22,109	100.00
2003	2,595	11.25	10,602	45.96	3,480	15.09	435	1.89	2,987	12.95	2,969	12.87	23,068	100.00
2004	2,662	11.16	11,030	46.24	3,619	15.17	456	1.91	3,103	13.01	2,983	12.51	23,852	100.00
2005	2,775	11.32	11,147	45.46	3,718	15.16	420	1.71	3,276	13.36	3,184	12.99	24,520	100.00
2006	2,841	11.27	11,688	46.37	3,712	14.73	332	1.32	3,419	13.56	3,215	12.75	25,207	100.00
2007	2,816	11.00	12,235	47.82	3,595	14.05	277	1.08	3,414	13.34	3,251	12.71	25,587	100.00
2008	2,569	10.50	11,638	47.57	3,409	13.93	301	1.23	3,367	13.77	3,180	13.00	24,463	100.00
2009	2,403	10.35	10,751	46.30	3,440	14.81	260	1.12	3,222	13.88	3,145	13.55	23,220	100.00
2010	2,572	10.36	11,997	48.32	3,553	14.31	255	1.03	3,308	13.32	3,143	12.66	24,828	100.00
2011	2,628	10.37	12,355	48.75	3,603	14.22	262	1.03	3,282	12.95	3,216	12.69	25,345	100.00
2012	2,568	10.33	12,141	48.83	3,525	14.18	269	1.08	3,251	13.07	3,111	12.51	24,864	100.00
2013	2,651	10.64	12,248	49.17	3,523	14.14	263	1.06	3,190	12.81	3,036	12.19	24,911	100.00
2014	2,668	10.63	12,126	48.31	3,572	14.23	277	1.10	3,292	13.12	3,167	12.62	25,104	100.00
2015	2,620	10.46	11,984	47.84	3,657	14.60	285	1.14	3,346	13.36	3,158	12.61	25,050	100.00

資料來源：經濟部能源局，2016年6月。

附件五、

廢棄物部門排放清冊活動數據彙整表

(一) 妥善管理廢棄物掩埋場活動數據統計表

年度	衛生掩埋 (千公噸)	廢棄物組成 (%)								累積 DOC 量 (千公噸)	分解 DOC 量 (千公噸)	K 值
		紙類	纖維 布類	皮革橡 膠類	廚餘類	木竹稻草 落葉類	塑膠	其他	化學分析 含碳量			
1990	3,979.6	29.44	2.72	1.31	9.67	4.66	-	-	-	4,546.2	566.3	0.135
1991	4,323.5	22.80	1.82	0.37	11.79	5.09	-	-	-	4,555.8	574.64	0.135
1992	5,087.5	24.86	3.97	1.73	25.73	5.06	19.14	2.45	16.50	4,819.4	575.86	0.138
1993	5,090.8	27.84	5.13	1.55	23.47	5.79	18.01	1.15	17.04	5,066.1	620.80	0.149
1994	5,574.4	29.98	4.81	0.80	23.50	4.69	18.90	4.31	19.08	5,408.7	699.17	0.155
1995	4,362.8	32.17	6.21	0.88	17.94	5.82	18.27	3.34	18.60	5,444.7	775.46	0.161
1996	4,824.0	30.95	5.05	1.08	18.97	5.89	17.83	4.72	18.99	5,552.3	807.49	0.161
1997	5,129.7	29.13	5.80	1.13	24.90	4.86	19.57	2.11	20.44	5,695.9	824.35	0.162
1998	5,598.0	32.77	5.27	0.83	18.29	4.81	20.14	4.54	18.47	5,878.2	851.67	0.167
1999	5,366.9	35.83	5.20	0.60	21.83	4.89	19.85	1.97	18.87	5,988.5	902.42	0.167
2000	3,822.1	26.37	6.06	1.35	27.76	3.36	22.00	0.44	21.12	5,742.8	918.82	0.168
2001	2,996.8	26.55	4.81	0.48	27.32	4.06	21.10	5.06	18.24	5,384.6	886.21	0.172
2002	2,116.4	30.01	3.65	0.60	23.34	4.43	20.23	8.17	20.45	4,919.3	852.23	0.176
2003	1,700.4	32.97	3.78	0.22	27.19	3.88	21.36	3.58	18.71	4,444.4	793.04	0.177
2004	1,474.2	31.56	4.90	0.87	29.76	4.91	20.60	0.98	20.60	4,023.7	721.12	0.179
2005	1,184.6	38.64	2.38	0.43	38.15	1.93	13.78	0.67	17.98	3,578.6	658.09	0.180
2006	851.0	44.30	1.84	0.19	34.57	1.74	14.63	0.36	20.58	3,162.8	590.91	0.183
2007	504.9	41.75	3.20	0.51	32.86	1.83	17.13	0.33	21.44	2,742.3	528.76	0.184
2008	236.1	44.54	2.63	0.36	30.56	1.99	17.28	0.48	24.14	2,337.3	461.42	0.185
2009	185.8	38.87	2.29	0.41	37.42	1.76	16.74	0.44	22.53	1,984.2	394.83	0.185
2010	181.8	39.57	2.52	0.51	35.68	1.74	16.57	0.52	22.90	1,689.6	335.59	0.186
2011	142.2	38.31	2.04	0.23	39.21	1.39	15.66	0.61	21.70	1,433.6	286.85	0.187
2012	102.1	38.85	2.52	0.20	38.33	1.46	15.61	0.49	22.36	1,212.1	244.27	0.188
2013	91.4	41.71	2.35	0.36	35.07	1.32	16.57	0.52	22.26	1,025.0	207.43	0.188
2014	83.1	39.42	2.34	0.14	37.64	1.31	16.56	0.6	22.03	867.3	176.00	0.189

資料來源：中華民國環境保護統計年報。

(二) 未妥善管理廢棄物掩埋場活動數據統計表

年度	一般掩埋、堆置、其他 (千公噸)	廢棄物組成 (%)								累積 DOC 量 (千公噸)	分解 DOC 量 (千公噸)	K 值
		紙類	纖維布類	皮革橡膠類	廚餘類	木竹稻草落葉類	塑膠	其他	化學分析含碳量			
1990	2,674.4	29.44	2.72	1.31	9.67	4.66	19.14	2.45	-	3,055.2	380.59	0.135
1991	2,881.3	22.80	1.82	0.37	11.79	5.09	19.14	2.45	-	3,058.4	386.18	0.135
1992	2,650.5	24.86	3.97	1.73	25.73	5.06	19.14	2.45	16.50	3,109.2	386.58	0.138
1993	2,877.5	27.84	5.13	1.55	23.47	5.79	18.01	1.15	17.04	3,199.0	400.45	0.147
1994	2,504.5	29.98	4.81	0.80	23.50	4.69	18.90	4.31	19.08	3,230.6	436.51	0.153
1995	3,037.6	32.17	6.21	0.88	17.94	5.82	18.27	3.34	18.60	3,338.3	457.27	0.157
1996	2,545.3	30.95	5.05	1.08	18.97	5.89	17.83	4.72	18.99	3,334.9	486.23	0.158
1997	2,045.3	29.13	5.80	1.13	24.90	4.86	19.57	2.11	20.44	3,233.2	487.62	0.160
1998	1,540.9	32.77	5.27	0.83	18.29	4.81	20.14	4.54	18.47	3,041.1	476.73	0.163
1999	1,158.6	35.83	5.20	0.60	21.83	4.89	19.85	1.97	18.87	2,801.7	458.02	0.163
2000	820.9	26.37	6.06	1.35	27.76	3.36	22.00	0.44	21.12	2,523.7	422.52	0.164
2001	520.9	26.55	4.81	0.48	27.32	4.06	21.10	5.06	18.24	2,233.3	382.21	0.167
2002	287.5	30.01	3.65	0.60	23.34	4.43	20.23	8.17	20.45	1,942.7	343.15	0.169
2003	134.0	32.97	3.78	0.22	27.19	3.88	21.36	3.58	18.71	1,666.4	301.40	0.169
2004	81.0	31.56	4.90	0.87	29.76	4.91	20.60	0.98	20.60	1,423.5	259.43	0.170
2005	40.3	38.64	2.38	0.43	38.15	1.93	13.78	0.67	17.98	1,208.6	222.16	0.170
2006	17.7	44.30	1.84	0.19	34.57	1.74	14.63	0.36	20.58	1,023.2	189.04	0.170
2007	32.5	41.75	3.20	0.51	32.86	1.83	17.13	0.33	21.44	869.8	160.32	0.171
2008	0.7	44.54	2.63	0.36	30.56	1.99	17.28	0.48	24.14	733.6	136.39	0.171
2009	1.3	38.87	2.29	0.41	37.42	1.76	16.74	0.44	22.53	618.7	115.20	0.171
2010	2.2	39.57	2.52	0.51	35.68	1.74	16.57	0.52	22.90	522.0	97.16	0.171
2011	0.1	38.31	2.04	0.23	39.21	1.39	15.66	0.61	21.70	440.1	81.99	0.171
2012	0.1	38.85	2.52	0.20	38.33	1.46	15.61	0.49	22.36	370.9	69.13	0.171
2013	1.7	41.71	2.35	0.36	35.07	1.32	16.57	0.52	22.26	313.0	58.28	0.171
2014	0.1	39.42	2.34	0.14	37.64	1.31	16.56	0.6	22.03	263.6	49.12	0.171

資料來源：中華民國環境保護統計年報。

(三) 工業廢水處理活動數據統計表

年度	工廠家數	TOWi：工業廢水中遭去除之有機物 (kg-COD) ($P_i \times W_i \times COD_i$)	Si：移除轉變為污泥 之可分解有機物 (Ton)
1990	10,394	146,137	0
1991	14,188	172,731	0
1992	15,339	179,288	0
1993	14,154	172,410	0
1994	14,699	175,703	0
1995	15,650	181,016	0
1996	17,853	192,184	0
1997	16,901	187,536	0
1998	15,421	179,724	0
1999	14,330	173,525	0
2000	14,908	166,989	0
2001	13,217	167,292	0
2002	14,279	168,818	0
2003	14,860	185,792	0
2004	15,754	175,933	0
2005	16,130	187,012	0
2006	16,624	187,236	0
2007	17,739	209,534	0
2008	18,694	202,160	0
2009	18,837	204,440	0
2010	19,315	195,863	0
2011	20,259	200,871	0
2012	20,570	215,663	0
2013	20,693	216,952	0
2014	20,521	215,149	0

資料來源：環保署水保處提供國內工業廢水「水污染源管制資料管理系統」中篩選出資料庫中定檢資料。

(四) 生活及商業廢水處理甲烷排放之活動量彙整表

年	接管戶數	全國戶數	下水道普及率(%)	實際接管率(%)	國家人口數(P)(千人)
1990	153,010	5,926,126	3	2.6	20,401
1991	154,544	5,985,536	3	2.6	20,606
1992	158,620	6,042,699	3.05	2.6	20,803
1993	162,714	6,098,701	3.1	2.7	20,995
1994	166,776	6,151,701	3.15	2.7	21,178
1995	170,859	6,203,858	3.2	2.8	21,357
1996	182,966	6,252,659	3.4	2.9	21,525
1997	206,557	6,315,804	3.8	3.3	21,743
1998	307,000	6,369,768	5.6	4.8	21,929
1999	660,010	6,532,466	11.95	10.1	22,092
2000	981,287	6,681,685	17.62	14.7	22,277
2001	1,105,155	6,802,281	19.73	16.2	22,406
2002	1,251,592	6,925,019	22.23	18.1	22,521
2003	1,351,187	7,047,168	23.91	19.2	22,605
2004	1,576,894	7,179,943	27.8	22.0	22,689
2005	1,795,445	7,292,879	31.54	24.6	22,770
2006	2,019,425	7,394,758	35.31	27.3	22,877
2007	2,280,913	7,512,449	39.74	30.4	22,958
2008	2,515,068	7,655,772	43.67	32.9	23,037
2009	2,812,520	7,805,834	48.66	36.0	23,120
2010	3,070,139	7,937,024	53.02	38.7	23,162
2011	3,367,032	8,057,761	57.99	41.8	23,225
2012	3,671,659	8,186,432	62.99	44.9	23,316
2013	3,892,859	8,286,260	66.62	47.0	23,374
2014	4,093,494	8,382,699	69.87	48.9	23,434

資料來源：內政部統計年報。

(五) 生活及商業廢水處理氧化亞氮排放之活動量彙整表

年度	每人每日蛋白質供給量 (公克)	國內人口數 (P) (千人)
1990	92.72	20,401
1991	91.56	20,606
1992	93.90	20,803
1993	97.34	20,995
1994	96.51	21,178
1995	98.22	21,357
1996	98.25	21,525
1997	101.41	21,743
1998	95.55	21,929
1999	97.55	22,092
2000	96.23	22,277
2001	92.00	22,406
2002	94.85	22,521
2003	96.13	22,605
2004	91.94	22,689
2005	91.57	22,770
2006	90.08	22,877
2007	92.02	22,958
2008	84.51	23,037
2009	86.84	23,120
2010	88.25	23,162
2011	89.67	23,225
2012	89.48	23,316
2013	86.97	23,374
2014	89.38	23,434

資料來源：內政部統計年報。

(六) 廢棄物焚化處理產生溫室氣體排放量活動量彙整表

年	廢棄物焚化量 (千公噸)	一般事業廢棄物 處理量(千公噸)	大型焚化爐焚化量 (千公噸)	含水分(%)	含碳量比例 (CCW)(%)	礦物碳比例(FCF) (%)
1990	77.7	-	-	51.97	31.75	47.08
1991	28.8	-	-	51.97	31.75	51.35
1992	255.4	-	-	51.97	31.75	45.51
1993	249.0	-	-	51.06	33.37	42.30
1994	412.5	-	-	53.21	35.86	43.39
1995	1,301.0	-	-	48.14	38.64	41.62
1996	1,364.6	-	-	50.60	37.53	41.68
1997	1,691.6	-	1,419.3	46.03	44.41	43.84
1998	1,741.1	-	1,335.4	51.06	36.17	44.29
1999	2,020.6	-	1,789.1	50.76	37.17	41.80
2000	3,229.7	-	2,659.7	45.02	46.91	48.05
2001	3,736.9	2,330.1	3,922.4	55.80	32.69	47.52
2002	4,316.0	2,873.9	5,311.0	51.24	39.91	45.66
2003	4,304.6	2,869.8	5,470.7	55.69	33.60	44.88
2004	4,307.7	2,952.1	5,611.5	51.19	40.24	43.17
2005	4,300.4	3,270.7	5,614.9	54.03	33.28	31.70
2006	4,164.0	3,693.6	5,683.0	52.41	39.27	31.52
2007	4,335.8	3,734.7	5,948.8	51.55	41.59	35.85
2008	4,137.3	3,444.2	6,110.8	50.94	47.39	35.35
2009	4,036.4	2,671.0	6,092.9	54.19	41.58	35.96
2010	3,888.6	3,119.7	6,235.4	52.66	43.49	35.68
2011	3,468.6	3,397.5	6,355.4	55.06	39.41	34.67
2012	3,277.3	3,381.0	6,405.0	53.97	41.43	34.43
2013	3,208.7	3,281.4	6,471.8	54.08	41.16	35.16
2014	3,189.5	3,618.5	6,420.4	55.17	39.93	35.71

資料來源：中華民國環境保護統計年報。

(七) 生物處理(堆肥)產生溫室氣體排放量活動量彙整表

年	堆肥(千公噸)	年	堆肥(千公噸)
1990	113.15	2003	22.29
1991	5.48	2004	66.84
1992	7.86	2005	97.54
1993	4.61	2006	112.67
1994	1.37	2007	144.63
1995	6.28	2008	164.59
1996	2.52	2009	179.31
1997	14.17	2010	208.88
1998	0.53	2011	261.53
1999	19.49	2012	243.84
2000	2.78	2013	226.07
2001	0.22	2014	204.47
2002	3.71		

資料來源：中華民國環境保護統計年報。

附件六、

廢棄物部門溫室氣體排放清冊統計彙整表

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年(單位：千公噸二氧化碳當量)			CO ₂ 排放量	CH ₄ 排放量	N ₂ O 排放量	總溫室氣體排放量
1990	5A	固體廢棄物處理	NA	5831.814	NA	5831.814
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	4246.411	NA	4246.411
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1585.403	NA	1585.403
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	11.315	10.116	21.431
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	20.466	NA	1.089	21.555
		5C1 廢棄物焚化	20.466	NA	1.089	21.555
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2906.951	284.500	3191.450
		5D1 生活及住商污水	NA	2176.264	284.500	2460.763
5D2 工業廢水		NA	730.687	NA	730.687	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1991	5A	固體廢棄物處理	NA	5917.391	NA	5917.391
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	4308.724	NA	4308.724
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1608.667	NA	1608.667
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.548	0.489	1.037
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	8.279	NA	0.404	8.683
		5C1 廢棄物焚化	8.279	NA	0.404	8.683
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3061.734	283.785	3345.519
		5D1 生活及住商污水	NA	2198.081	283.785	2481.866
5D2 工業廢水		NA	863.653	NA	863.653	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1992	5A	固體廢棄物處理	NA	5928.205	NA	5928.205
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	4317.854	NA	4317.854
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1610.351	NA	1610.351
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.786	0.702	1.488
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	64.990	NA	3.577	68.567
		5C1 廢棄物焚化	64.990	NA	3.577	68.567
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3114.535	293.782	3408.317
		5D1 生活及住商污水	NA	2218.093	293.782	2511.875
5D2 工業廢水		NA	896.442	NA	896.442	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1993	5A	固體廢棄物處理	NA	6322.950	NA	6322.950
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	4654.831	NA	4654.831
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1668.118	NA	1668.118
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.461	0.412	0.874
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	63.094	NA	3.488	66.582
		5C1 廢棄物焚化	63.094	NA	3.488	66.582
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3099.712	307.407	3407.119
		5D1 生活及住商污水	NA	2237.660	307.407	2545.067
5D2 工業廢水		NA	862.052	NA	862.052	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1994	5A	固體廢棄物處理	NA	7060.799	NA	7060.799
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	5242.452	NA	5242.452
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1818.347	NA	1818.347
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.137	0.122	0.259
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	110.112	NA	5.778	115.890
		5C1 廢棄物焚化	110.112	NA	5.778	115.890
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3134.622	307.460	3442.082
		5D1 生活及住商污水	NA	2256.109	307.460	2563.569
5D2 工業廢水		NA	878.514	NA	878.514	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年 (單位：千公噸二氧化碳當量)			CO ₂ 排放量	CH ₄ 排放量	N ₂ O 排放量	總溫室氣體排放量
1995	5A	固體廢棄物處理	NA	7719.260	NA	7719.260
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	5814.465	NA	5814.465
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1904.795	NA	1904.795
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.628	0.562	1.190
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	397.878	NA	18.222	416.100
		5C1 廢棄物焚化	397.878	NA	18.222	416.100
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3179.310	315.524	3494.833
		5D1 生活及住商污水	NA	2274.231	315.524	2589.754
5D2 工業廢水		NA	905.079	NA	905.079	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1996	5A	固體廢棄物處理	NA	8080.111	NA	8080.111
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	6054.667	NA	6054.667
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	2025.443	NA	2025.443
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.252	0.225	0.477
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	386.607	NA	19.113	405.720
		5C1 廢棄物焚化	386.607	NA	19.113	405.720
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3248.985	318.094	3567.079
		5D1 生活及住商污水	NA	2288.063	318.094	2606.157
5D2 工業廢水		NA	960.922	NA	960.922	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1997	5A	固體廢棄物處理	NA	8212.338	NA	8212.338
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	6181.087	NA	6181.087
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	2031.251	NA	2031.251
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	1.417	1.267	2.684
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	104.902	NA	3.814	108.716
		5C1 廢棄物焚化	104.902	NA	3.814	108.716
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3240.653	331.700	3572.353
		5D1 生活及住商污水	NA	2302.974	331.700	2634.674
5D2 工業廢水		NA	937.679	NA	937.679	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1998	5A	固體廢棄物處理	NA	8371.784	NA	8371.784
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	6385.917	NA	6385.917
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1985.867	NA	1985.867
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.053	0.047	0.100
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	116.645	NA	5.683	122.328
		5C1 廢棄物焚化	116.645	NA	5.683	122.328
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3184.073	315.196	3499.269
		5D1 生活及住商污水	NA	2285.452	315.196	2600.648
5D2 工業廢水		NA	898.621	NA	898.621	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
1999	5A	固體廢棄物處理	NA	8596.214	NA	8596.214
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	6688.266	NA	6688.266
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1907.948	NA	1907.948
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	1.949	1.743	3.692
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	64.952	NA	3.243	68.194
		5C1 廢棄物焚化	64.952	NA	3.243	68.194
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	3042.324	324.196	3366.520
		5D1 生活及住商污水	NA	2174.700	324.196	2498.896
5D2 工業廢水		NA	867.624	NA	867.624	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年 (單位：千公噸二氧化碳當量)			CO ₂ 排放量	CH ₄ 排放量	N ₂ O 排放量	總溫室氣體排放量
2000	5A	固體廢棄物處理	NA	8512.429	NA	8512.429
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	6752.357	NA	6752.357
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1760.072	NA	1760.072
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.278	0.249	0.527
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	259.039	NA	7.985	267.023
		5C1 廢棄物焚化	259.039	NA	7.985	267.023
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2915.999	322.402	3238.402
		5D1 生活及住商污水	NA	2081.055	322.402	2403.458
5D2 工業廢水		NA	834.944	NA	834.944	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2001	5A	固體廢棄物處理	NA	7732.386	NA	7732.386
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	6140.258	NA	6140.258
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1592.128	NA	1592.128
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.022	0.019	0.041
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	539.896	NA	30.037	569.933
		5C1 廢棄物焚化	539.896	NA	30.037	569.933
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2891.269	310.049	3201.318
		5D1 生活及住商污水	NA	2054.809	310.049	2364.857
5D2 工業廢水		NA	836.460	NA	836.460	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2002	5A	固體廢棄物處理	NA	7214.145	NA	7214.145
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	5784.700	NA	5784.700
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1429.445	NA	1429.445
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	0.371	0.331	0.702
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	612.126	NA	26.316	638.442
		5C1 廢棄物焚化	612.126	NA	26.316	638.442
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2864.416	321.295	3185.711
		5D1 生活及住商污水	NA	2020.328	321.295	2341.623
5D2 工業廢水		NA	844.088	NA	844.088	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2003	5A	固體廢棄物處理	NA	6675.269	NA	6675.269
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	5419.761	NA	5419.761
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1255.508	NA	1255.508
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	2.229	1.993	4.222
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	417.298	NA	23.861	441.159
		5C1 廢棄物焚化	417.298	NA	23.861	441.159
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2929.578	326.868	3256.446
		5D1 生活及住商污水	NA	2000.617	326.868	2327.485
5D2 工業廢水		NA	928.961	NA	928.961	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2004	5A	固體廢棄物處理	NA	6100.887	NA	6100.887
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	5020.202	NA	5020.202
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1080.684	NA	1080.684
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	6.684	5.975	12.659
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	512.425	NA	23.086	535.511
		5C1 廢棄物焚化	512.425	NA	23.086	535.511
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2818.477	313.786	3132.263
		5D1 生活及住商污水	NA	1938.810	313.786	2252.596
5D2 工業廢水		NA	879.667	NA	879.667	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年(單位：千公噸二氧化碳當量)			CO ₂ 排放量	CH ₄ 排放量	N ₂ O 排放量	總溫室氣體排放量
2005	5A	固體廢棄物處理	NA	5525.168	NA	5525.168
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	4599.718	NA	4599.718
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	925.450	NA	925.450
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	9.754	8.720	18.473
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	347.781	NA	27.397	375.179
		5C1 廢棄物焚化	347.781	NA	27.397	375.179
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2814.575	313.596	3128.171
		5D1 生活及住商污水	NA	1879.514	313.596	2193.110
5D2 工業廢水		NA	935.062	NA	935.062	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2006	5A	固體廢棄物處理	NA	4930.214	NA	4930.214
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	4142.743	NA	4142.743
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	787.471	NA	787.471
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	11.267	10.072	21.339
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	469.619	NA	30.457	500.076
		5C1 廢棄物焚化	469.619	NA	30.457	500.076
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2757.079	309.967	3067.046
		5D1 生活及住商污水	NA	1820.898	309.967	2130.865
5D2 工業廢水		NA	936.181	NA	936.181	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2007	5A	固體廢棄物處理	NA	4378.798	NA	4378.798
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	3710.967	NA	3710.967
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	667.831	NA	667.831
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	14.463	12.930	27.392
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	562.055	NA	29.717	591.772
		5C1 廢棄物焚化	562.055	NA	29.717	591.772
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2798.334	317.793	3116.127
		5D1 生活及住商污水	NA	1750.663	317.793	2068.457
5D2 工業廢水		NA	1047.671	NA	1047.671	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2008	5A	固體廢棄物處理	NA	3813.532	NA	3813.532
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	3245.390	NA	3245.390
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	568.142	NA	568.142
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	16.459	14.714	31.173
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	443.218	NA	20.597	463.815
		5C1 廢棄物焚化	443.218	NA	20.597	463.815
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2704.648	292.870	2997.518
		5D1 生活及住商污水	NA	1693.847	292.870	1986.718
5D2 工業廢水		NA	1010.801	NA	1010.801	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	
2009	5A	固體廢棄物處理	NA	3246.132	NA	3246.132
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	2766.246	NA	2766.246
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	479.886	NA	479.886
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B	廢棄物生物處理	NA	17.931	16.030	33.961
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	154.290	NA	8.606	162.896
		5C1 廢棄物焚化	154.290	NA	8.606	162.896
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2641.650	302.020	2943.670
		5D1 生活及住商污水	NA	1619.449	302.020	1921.469
5D2 工業廢水		NA	1022.201	NA	1022.201	
5E	其他	NA	NA	NA	NA	

(單位：千公噸二氧化碳當量)

年(單位：千公噸二氧化碳當量)			CO ₂ 排放量	CH ₄ 排放量	N ₂ O 排放量	總溫室氣體排放量
2010	5A	固體廢棄物處理	NA	2748.946	NA	2748.946
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	2344.212	NA	2344.212
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	404.734	NA	404.734
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B 廢棄物生物處理	NA	20.888	18.674	39.562	
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	208.193	NA	10.827	219.020
		5C1 廢棄物焚化	208.193	NA	10.827	219.020
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2534.513	307.442	2841.955
		5D1 生活及住商污水	NA	1555.199	307.442	1862.640
5D2 工業廢水		NA	979.314	NA	979.314	
5E 其他	NA	NA	NA	NA		
2011	5A	固體廢棄物處理	NA	2352.494	NA	2352.494
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	2010.952	NA	2010.952
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	341.543	NA	341.543
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B 廢棄物生物處理	NA	26.153	23.381	49.534	
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	114.983	NA	7.153	122.136
		5C1 廢棄物焚化	114.983	NA	7.153	122.136
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2484.804	313.252	2798.056
		5D1 生活及住商污水	NA	1480.452	313.252	1793.703
5D2 工業廢水		NA	1004.353	NA	1004.353	
5E 其他	NA	NA	NA	NA		
2012	5A	固體廢棄物處理	NA	1997.287	NA	1997.287
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1709.308	NA	1709.308
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	287.978	NA	287.978
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B 廢棄物生物處理	NA	24.384	21.799	46.183	
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	60.972	NA	3.547	64.519
		5C1 廢棄物焚化	60.972	NA	3.547	64.519
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2486.326	314.094	2800.419
		5D1 生活及住商污水	NA	1408.011	314.094	1722.105
5D2 工業廢水		NA	1078.315	NA	1078.315	
5E 其他	NA	NA	NA	NA		
2013	5A	固體廢棄物處理	NA	1688.299	NA	1688.299
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1445.546	NA	1445.546
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	242.753	NA	242.753
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B 廢棄物生物處理	NA	22.607	20.211	42.818	
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	4.473	NA	0.257	4.730
		5C1 廢棄物焚化	4.473	NA	0.257	4.730
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2441.244	318.435	2759.679
		5D1 生活及住商污水	NA	1356.482	318.435	1674.917
5D2 工業廢水		NA	1084.762	NA	1084.762	
5E 其他	NA	NA	NA	NA		
2014	5A	固體廢棄物處理	NA	1427.733	NA	1427.733
		5A1 妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	1223.103	NA	1223.103
		5A2 未妥善管理之廢棄物掩埋場	NA	204.630	NA	204.630
		5A3 其他	NA	NA	NA	NA
	5B 廢棄物生物處理	NA	20.447	18.280	38.727	
	5C	廢棄物焚化與露天燃燒	146.273	NA	8.741	155.014
		5C1 廢棄物焚化	146.273	NA	8.741	155.014
		5C2 廢棄物露天燃燒	NA	NA	NA	NA
	5D	廢水處理及排放	NA	2386.676	314.910	2701.586
		5D1 生活及住商污水	NA	1310.930	314.910	1625.840
5D2 工業廢水		NA	1075.746	NA	1075.746	
5E 其他	NA	NA	NA	NA		



2016年中華民國 國家溫室氣體排放清冊報告



行政院環境保護署

Taiwan Environmental Protection Administration
<http://www.epa.gov.tw>